



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



RF  
1

A34





RF

1

P. 94

Index

31-40 - 1875



012629

# Cornell University Library

BOUGHT WITH THE INCOME  
FROM THE

SAGE ENDOWMENT FUND

THE GIFT OF

**Henry W. Sage**

1891

A 240216

27/12/09

6896-1

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



3 1924 069 243 370





9805 Ia



*Belk  
ms l*

# GENERAL-REGISTER

ZU

## ALBRECHT VON GRAEFKE'S

# ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON

PROF. E. FUCHS  
IN WIEN

PROF. TH. LEBER  
IN HEIDELBERG

UND

PROF. H. SATTLER  
IN LEIPZIG

PROF. A. WAGENMANN  
IN JENA

REDIGIERT VON

PROF. TH. LEBER

UND

PROF. A. WAGENMANN

---

BAND LXI—LXX

---

BEARBEITET

VON

DR. W. SCHLAEFKE  
IN CASSEL

LEIPZIG

VERLAG VON WILH. ENGELMANN  
1909

9805 Ia 7



# GENERAL-REGISTER

ZU

## ALBRECHT VON GRAEFES ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE

---

HERAUSGEGEBEN VON

PROF. E. FUCHS  
IN WIEN

PROF. TH. LEBER  
IN HEIDELBERG

UND

PROF. H. SATTLER  
IN LEIPZIG

PROF. A. WAGENMANN  
IN JENA

REDIGIERT VON

PROF. TH. LEBER

UND

PROF. A. WAGENMANN

---

BAND LXI—LXX

---

BEARBEITET

VON

DR. W. SCHLAEFKE  
IN CASSEL

---

LEIPZIG  
VERLAG VON WILH. ENGELMANN  
1909

T

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

# I. Sachregister.

## A.

**Abducenz-Lähmung** bei Erkrankung der hinteren Nebenhöhle der Nase LXV 453.  
**Abduktion**, Einfluß auf die Vertikalablenkung LXII 437.  
**Absorptionsbestimmungen**, photographische Methode LXIII 137, 150.  
**Abszeß**, subkonjunktivaler, durch Staphylokokken LXVII 65.  
**Acarus** s. Demodex.  
**Aceton**, Diffusion in die Linse LXII 121.  
**Acetylenlicht**, Spektrum LIX 55.  
**Achse** s. Augenachse.  
**Achsenzylinder**, Färbung LXIV 258.  
**Adaptation**, Einfluß auf die Verschmelzungsfrequenz LXVII 156, LXVIII 404.  
 — Reizwert und Flächengröße LXV 374.  
 — subcerebrale Leitung LXX 357.  
 — Untersuchungen über LXV 365.  
 — Verhalten bei Amblyop. cong. LXV 389.  
 — — — — — intox. LXV 386, 415.  
 — — — — — Atroph. n. opt. LXV 401, 416.  
 — — — — — glaucomatosa LXV 401, 416.  
 — — — — — Chorioiditis LXV 406, 416.  
 — — — — — Hemianopsie LXV 405, LXX 399.  
 — — — — — Macula-Defekten LXV 384, 415.  
 — — — — — Myopie LXV 411, 416.  
 — — — — — Netzhautablösung LXV 409, 416.  
 — — — — — Neuritis opt. LXV 398.  
 — — — — — Neuroretin. album. LXV 400.  
 — — — — — Pigmentatrophie der Retina LXV 409.  
 — — — — — Retinitis album. LXV 401, 416.  
 — s. auch Dunkel- und Hell-Adaptation, Lichtsinn.

**Adaptationsbreite**, Einfluß des Lebensalters LXI 542, LXV 377.  
**Adaptationskurve**, Einfluß der Ermüdung LXV 393.  
 — pathologische LXV 391.  
**Adaptationsstörungen** bei Erkrankungen des Augenhintergrundes LXV 383, 397.  
 — Fehlen bei kortikalen Leiden LXV 405.  
 — Pathogenese LXV 405.  
**Adaptationstypen** LXI 528, LXV 375, 396.  
**Adaptometer** v. Nagel LXV 381.  
**Adduktion**, Einfluß auf die Vertikalablenkung LXII 437.  
**Adenie**, hämorrhagische LXVII 71.  
**Adenoides Gewebe** d. Conjunct. LXII 144, LXI:1 51, 294, 296, 297.  
 — der Tränendrüse LXII 144.  
**Adenom** d. Ciliarepithels LXVIII 547.  
**Affen, anthropoide**, Auge der LXII 257.  
 — — — äußere Maße LXII 252.  
 — — — Pigmentierung LXII 256, 258, 260, 261.  
 — — — Bruch'sche Membran LXII 262, 265, 267, 270.  
 — — — Canal. Schlemmii LXII 272.  
 — — — Chorioidea LXII 260.  
 — — — Ciliarkörper und Iris LXII 260, LXVIII 29.  
 — — — Descemet'sche Membran LXII 257.  
 — — — Einteilung LXII 250.  
 — — — Fontana'scher Raum LXII 271.  
 — — — Hornhaut LXII 254.  
 — — — Ligament. pectin. LXII 271, LXIII 447.  
 — — — Nerv. optic. LXII 273.  
 — — — Retina LXII 272.  
 — — — Sklera LXII 257.  
 — — — Splinkter LXII 262.  
 — Zonulafasern, Ursprung der LXIX 152.



- Agglutinine** im Glaskörper beim chole-  
raimmunis. Tier LXIV 435.  
— im Kammerwasser bei aktiv im-  
munis. Tieren LXIV 423.  
— — — — — Vermehrung durch  
subconj. Kochsalzinj. LXIV 423.  
— — — — — bei passiv immunis. Tieren  
LXIV 424.  
— — — — — Vermehrung durch  
subconj. Kochsalzinj. LXIV 425.  
— in der Linse beim choleraimmunis.  
Tier LXIV 434.  
— im normalen Kammerwasser LXIV  
422.
- Agoraphobie** bei lat. Vertikalschielen  
LXII 419.
- Aggraphie**, cas. LXX 359, 360, 361.
- Agrypnie** bei lat. Vertikalschielen LXII  
419.
- Alchwerte** des Nernstlicht-Spektrums  
bei Blaublindheit LXII 473.
- Akkommodation**, abnorme LXV 42.  
— bei Aphakie LXV 1.  
— — — Auftreten LXV 41.  
— — — durch Erhöhung des Brech-  
ungsindex von Kammerwasser und  
Glaskörper LXV 35.  
— — — — — Jugendlicher LXV 3, 13, 25.  
— — — — — Mechanismus LXV 26.  
— — — — — durch partielle Regeneration  
der Linse LXV 39.  
— — — — — scheinbare LXV 13.  
— — — — — Einfluß des Astigmatismus  
LXV 13.  
— — — — — der Pupillenweite LXV  
24.  
— — — — — durch Sehen in Zerstreu-  
ungskreisen LXV 16, 40.  
— — — — — durch Verschiebung der  
Starbrille LXV 13.  
— — — — — durch Verlängerung der  
Augenachse LXV 27.  
— — — — — durch Vermehrung der Horn-  
hautwölbung LXV 29.  
— — — — — durch Vorwölbung der vord.  
Glaskörperfläche LXV 37.  
— — — — — durch Zunahme der Brech-  
kraft LXV 29.
- Akkommodation und Konvergenz**,  
Rolle bei der Entfernungsschätzung  
LXVI 488.
- Akkommodationslähmung** bei Paro-  
titis LXX 269.  
— s. auch Ophthalmopleg. int.
- Akkommodationslinie** LXV 16.
- Akkommodationsmechanismus** LXV  
27, 29, LXVII 44.
- Akkommodationsrollung**, physiolog.  
LXII 460.
- Aktinien**, Bruch'sche Membran bei den  
LXII 557.
- Alauntrübung** der Hornhaut durch Alu-  
miniumhydroxid LXIII 341.  
— — — — — Aluminiummukoid LXIII  
341.  
— — — — — Aufhellung durch Ammonium-  
tartrat LXIII 356, 359, 364, 385.  
— — — — — Experimentelles LXIII 340.  
— — — — — Kasuistik LXIII 342.  
— — — — — mechanische Abkratzung  
LXIII 385.
- Alaunverbindungen**, Auflösung im  
Reagenzglas LVIII, 356.
- Albinismus**, Verwandtschaft mit Iri-  
deremie LXX 81.
- Albuminate**, metallische, Auflösungs-  
mittel der LXIII 348, 359.
- Albuminarie** bei Parotitis epid. LXX  
267, 271.
- Alexie**, cas. LXX 359, 360, 361.  
— geheilte LXII 369.
- Alkoholfixierung** d. Retina LXIV 241.
- Alkoholhärtung** LXVII 309.
- Altersveränderungen** der Linse LXII  
117.  
— der Zentralgefäße LXI 13.
- Amaurosis** nach Blutverlust LXI 53.  
— bei doppelseitiger Hemianopsie LXII  
366, LXX 364.  
— — — — — Restitution der zentr.  
Sehschärfe LXII, 346, 371.  
— einseitige, bei Erkrankungen der  
Keilbeinhöhle LXV 441.  
— — — — — Simulation der, Entlarvung  
LXIV 502.  
— bei Orbitalphlegmone LXI 467,  
468, 482.  
— nach Thyreoidinfütterung LXI 513.  
— bei Verschluß der Art. ophthalm.  
LXI 71, 77.  
— — — — — der Zentralarterie LXI 67,  
68, 77.
- Amblyopia**, einseitige, bei Hyperopie.  
LXX 174, 177.  
— — — — — Besserung nach der Schiel-  
operat. LXX 178.  
— — — — — durch Übung LXX 179.  
— — — — — Erklärung LXV 390, LXX  
176, 180.  
— — bei hyperopischer Anisometropie  
LXX 183.  
— — bei Irideremie LXX 77.  
— — — — — Ursache LXX 79.  
— — — — — Simulation der, Entlarvung LXIV  
502.  
— bei Hyperphorie LXII 418.  
— Sehschärfestimmung bei LXIV  
559.  
— Ursache von Myopie LXX 163.

**Amblyopia ex anopsia**, Ausbleiben LXVIII 410.  
 — mit Amblyop. cong. LXVIII 409.  
 — bei Hemianopsie, Entstehung LXX 380, 399.  
 — bei Strabismus LXIX 552, LXX 180.  
 — — — Behandlung LXIX 558.  
**Amblyopia congenita**, Adaptation bei LXV 389.  
 — anatomische Grundlage LXVI: I 407.  
 — Erklärung LXV 390, 415.  
 — Lichtsinn bei LXVIII 409.  
 — Sehvermögen, Besserung durch Übung LXI 284.  
 — Verschmelzungsfrequenz bei LXVIII 409.  
 — zentrales Skotom bei LXI 283.  
**Amblyopia intoxicatoria**, Adaptation bei LXV 386, 415.  
 — durch Nikotin, Adaptation bei LXV 386.  
 — Pathogenese LXI 506, 520, LXV 478.  
 — durch Thyreoidin LXI 499.  
 — — — Experimentelles LXI 502.  
 — — — Häufigkeit LXI 499.  
 — — — beim Hund LXI 500, 503.  
 — — — mikr. Befund LXI 507, 513, 521.  
 — — — ophthalm. Befund LXI 512, 518.  
 — — — Pathogenese LXI 513.  
 — — — Unterschied von Alkohol-Tabaksamblyopie LXI 501, 518.  
 — — — von Chininamblyopie LXI 519.  
 — — — von Filixamblyopie LXI 519.  
 — — — von Methylalkoholamblyopie LXI 519.  
**Ameisensäure**, Wirkung auf das Sehnervenende LXIX 430.  
**Ammoniumacetat** zur Aufhellung von Kupfertrübungen der Hornhaut LXIII 355, 363, 365.  
 — — — von Zinktrübungen der Hornhaut LXIII 355, 364, 365, 384.  
**Ammoniumchlorid** s. Chlorammon.  
**Ammoniumkupfersulfat-Lösung**, Lichtabsorption der LXII 12.  
**Ammoniumsalze** zur Aufhellung von metallischen Hornhauttrübungen LXIII 349.  
**Ammoniumtartrat** zur Aufhellung von Alauntrübungen der Hht. LXIII 356, 359, 364, 385.  
 — — — von Bleitrübungen der Hht. LXIII 352, 359, 362, 378.  
 — — — von Kalktrübungen der Hht. LXIII 351, 358, 361, 367, 373.

**Ammoniumtartrat** zur Aufhellung von Kupfertrübungen der Hht. LXIII 355, 363, 383.  
 — — — von Zinktrübungen der Hht. LXIII 355, 364, 384.  
**Amnionanomalien** und Cyklopie LXV 272.  
 — — und Liddefekte LXV 349, 354  
**AmnionEinstülpung** in die Linsengrube LXX 238.  
**Amniotische** Verwachsungen an der Nase und Wange LXIII 39, 43.  
**Amphibien**, Entwicklung der Tränenröhrchen bei LXII 380.  
**Ampulle** der Optikuscheiden bei Staunungspapille LXIX 333, 336, 414.  
 — — — Vorkommen LXIX 414.  
**Amylodextrin**, Diffusionsfähigkeit LXII 104.  
 — — Diffusion in die Linse LXII 104.  
**Amyloid**, Arten LXVII 146.  
 — — Diagnose LXVII 141.  
 — — Entstehung durch Abscheidung aus Blut- und Lymphgefäßen LXVII 131.  
 — — aus Hyalin LXVII 137.  
 — — — durch Metamorphose des Bindegewebes LXVII 130.  
 — — in Plasmazellen LXVII 133.  
 — — Theorien LXVII 136.  
 — Färbung LXVII 124.  
 — — Einfluß der Härtingsflüssigkeit LXVII 141.  
 — Gehalt an Chondroitinschwefelsäure LXVII 136.  
 — und Glykogen LXVII 142.  
 — Rolle der Riesenzellen LXVII 134.  
**Amyloiderkrankung** der Conjunct. und Trachom LXVII 127.  
**Amyloidkörperchen** im Optikus LXX 70.  
**Amyloidtumoren**, Metastasen der LXVII 128.  
**Anämie** bei Hirndruck LXIX 406.  
**Analphabeten**, Sehproben für LXIV 550.  
**Anencephalie** bei Diprosopie LXVIII 259, 266.  
 — Fehlen von Nervenfasern in Optikus und Retina bei LXVIII 267.  
**Angelucci'sche Symptome** bei Hydroceph. cong. LXIII 231.  
**Angioneurose**, Ursache von Hydrophthalm. LXIII 208, 230.  
**Anilin**, Diffusion in die Linse LXII 121.  
 — Reaktion auf LXII 161.  
**Anilinfarbstoffe**, grüne, Lichtabsorption der LXII 18.  
**Aniridie** s. Irideremie.  
**Anisokorie** s. Pupillendifferenz.

**Anisometropie** bei Hyperopie, Amblyopie bei LXX 183.

— — — Formen LXX 183.

**Ankyloblepharon** nach Kalkverletzung LXII 82.

**Anophthalmus** cong. bilateral. mit Encephalocele d. Orbita, Befund LXIII 18.

— — — — — Entstehung LXIII 21.

— — mit Cyste, Ein- und Doppelseitigkeit LXVII 225.

— — — — Kasuistik LXVII 217.

— — — — Komplikationen LXVII 225.

— — — — Pathogenese LXVII 249, 261, LXX 321.

— — — — patholog. Anatomie LXVII 230.

— — Entstehung LXIII 23.

— — und Sehbahnen bei der Ratte LXV 101, LXVII 81.

**Anthropoide Affen** s. Affen.

**Antigene**, lokale Wirkung LXIV 435.

**Antikörper**, Auftreten im A. LXIV 413.

— bei sympathischer Ophthalmie LXII 200.

— Übergang ins Kammerwasser LXIV 414, 419.

— — — — Reizeinflüsse LXIV 419.

**Antikörperbindung**, lokale LXIV 435.

— im subkonjunktival. Gewebe LXIV 437.

— in der Vorderkammer LXIV 438.

**Antitoxin**, Einwirkung von ultraviol. Strahlen auf LXVI 280.

**Aphakie**, Akkommodat. bei LXV 1.

— Durchmesser der Zerstreuungskreise, Berechnung LXV 20.

— Größe der Netzhautbilder, Berechnung LXV 21.

— bei Skleralruptur LXVIII 487.

— Tiefe der Vorderkammer LXV 37.

**Aphakisches Auge**, dioptrisches System LXV 19.

**Aphasie**, amnestische LXII 287.

**Apparat** zur Bestimmung von Brillenweiten LXV 176.

**Arbeitsfähigkeit**, Beurteilung der LXIV 576.

**Area Martegiani** LXVII 61, 62, 373.

**Argyrose** s. Silbertrübung.

**Arteria calcarina**, Verschuß LXII 290, 297, 308, 325.

**Arteria centralis ret.**, Adventitia LXI 13.

— Altersveränderungen LXI 13.

— Durchmesser LXI 14.

— Elastica interna LXI 12.

— elastische Fasern LXI 13.

**Arteria centralis ret.**, elastische Fasern bei Sklerose LXI 19, 59, 131, 270.

— Embolie, Amaurose bei und Chinin-amaurose LXIII 608.

— — — Ursachen LXIII 608.

— — — anatomische Diagnose LXI 29, 55.

— — experimentelle LXIII 394, 396.

— — — mikr. Befund LXIII 399, 403.

— — Farbe der Macula LXV 506, 507, LXVI 157.

— — klinisch. Begriff und anatom. Grundlage LXI 2, 73.

— — Nekrose der Netzhautschichten LXIII 411.

— — Netzhauttrübung bei LXIII 399, 403, 408.

— — — Ursache LXIII 410.

— — ophthalm. Befund LXIII 398, 399, 400, 401, 402, 403.

— — Optikusatrophie nach LXVIII 134, 143.

— — bei Paraffininjektionen LXI 75.

— — Pupillenreaktion LXV 115.

— — Sehstörung bei LXIII 408.

— — sogenannte, ohne Arterienverschuß LXI 46, 71.

— — — bei Erkrankung beider Zentralgefäße mit vorwiegend. Venenerkrankung LXI 246.

— — und Thrombose, Diff.-Diagn. LXI 15, 50, 55.

— — venöse Stauung bei, Ursache LXIII 410.

— — Endarteriitis LXI 58, 116, 131, 140, 270, 278, 300, LXIV 317, 320, LXVIII 192, 235.

— — bei Atrophie der Retina LXIV 318.

— — Endothelzellen LXI 13.

— — bei Sklerose LXI 19.

— — bei Thrombose LXI 20, 25, 54.

— — Entwicklungsgeschichte LXX 460, 463.

— — Histologie bei Erwachsenen LXI 12.

— — Intima LXI 12.

— — Lumen LXI 84, 116, 131.

— — mikr. Befund bei Thrombose der Zentralvene LXI 83.

— — Muskularis LXI 13.

— — Sklerose LXI 16, 19, 72, 272.

— — Arten LXI 322.

— — Prädisposition LXI 322.

— — Verschuß bei Chininvergiftung LXX 249, 250.

— — — durch Einlagerung LXI 15.

— — — — anatom. Fälle LXI 30.

— — — — Thrombus LXI 16, 19, 20.

— — — — — Pathogenese LXI 27.



- Arteria centralis ret.**, Verschuß durch Einlagerung, Verhalten der Retinazirkulation LXI 23, 29.  
 — — — durch Endarteriit. prolif. LXI 55.  
 — — — — anat. Fälle LXI 36.  
 — — — — Erklärung des plötzl. Eintritts LXI 67, 68.  
 — — — — mikr. Befund LXI 58.  
 — — — — ophthalm. Befund LXI 57.  
 — — Glaukom bei LXI 15, 16, 57.  
 — — Herzbefund LXI 17.  
 — — durch Kalkkrement mit Endarteriitis LXI 70.  
 — — — — anat. Fälle LXI 44.  
 — — mikr. Befund LXI 18.  
 — — Netzhautblutungen infolge LXI 256, 298, 304.  
 — — plötzliche Sehstörung bei, Erklärung LXI 67, 68, 77.  
 — — durch Thrombose bei prim. Endarteriitis LXI, 68, 271.  
 — — — — anat. Fälle LXI 40.  
 — — Ursachen LXI 14, 76.  
 — — Veränderungen der Retina LXI 73.
- Arteria fossae Sylvii**, Versorgungsgebiet LXII 312.
- Arteria hyaloida** LXIII 495, LXIV 229, LXV 239, LXVI, 222 LXVIII 448.  
 — Entwicklungsgeschichte LXX 449, 462.  
 — glöse Hülle LXVIII 341, LXX 450.  
 — — — Ansatz am Optikus LXVIII 342.  
 — glöse Hülle, Bildung LXVIII 343.  
 — Persistenz LXVIII 344.  
 — Rolle bei der Kolobombildung LXVIII 329, 448.  
 — beim Zentralkanal des Glaskörpers LXVII 64.
- Arteria macularis**, Thrombose LXI 16.  
 — — mikr. Befund LXI 24.  
 — — ophthalm. Befund LXI 17.  
 — — Therapie LXI 17.  
 — Verschuß, zentrales Skotom bei LXI 16, 17.
- Arteria occipitalis**, Anastomosen LXII 326.  
 — thrombotischer Verschuß LXII 306, 326.
- Arteria ophthalmica**, Verschuß, Sehstörungen bei LXI 71, 77.
- Arterien**, kleinere, Verengerung durch Hypertrophie der Muskularis bei Cyanosis LXVIII 208.  
 — — — — Entstehung LXVIII 209.
- Arterienverschuß**, Ursachen LXI 14.  
 — Wirkung auf die Gefäßwand LXI 319.
- Arteriosklerose** und Verschuß der Vena centr. ret. LXI 150, LXVIII 202.
- Aspergillus fumigatus** LXV 419.  
 — Bildung von Fruktifikationsorganen in der Hornhaut LXV 422.  
 — Impfung der Hornhaut mit LXVI 447.
- Associationsfasern**, Myelinisation LXII 340.
- Associative Verbindungen** der kortikalen Macula LXII 348, 368.  
 — — der Netzhautperipherie LXII 348, 369.
- Asthenopie**, muskuläre, Beschwerden bei LXII 417.  
 — — bei Hyperopie LXX 195.  
 — — bei latenten Gleichgewichtsstörungen LXII 426.  
 — — Ursachen LXII 417.
- Astigmatismus** im Alter LXX 197.  
 — Änderung der sphärischen Refraktion bei LXX 197.  
 — einfacher, Häufigkeit LXX 198.  
 — Einfluß auf die scheinb. Akkommodat. bei Aphakie LXV 13.  
 — bei Hornhauttrübungen LXX 155.  
 — nach Myopieoperation LXX 59.  
 — perverser, bei Hydrophth. cong. LXIII 220.  
 — und Sehschärfe LXX 60.  
 — skioskopische Schattendrehung bei LXII 275, LXIII 388, LXV 150.  
 — Ursache von Myopie LXX 155, 162, 198.
- Atrophia n. optici** bei Ablatio retin. LXX 528.  
 — Adaptation bei LXV 401, 416.  
 — bei Basistumor LXVIII 137.  
 — descendierende, bei Hemianopsie LXX 378.  
 — — — — durchschlagende LXX 382.  
 — — nach Neuritis LXX 380.  
 — bei disseminierter Herdsklerose LXVIII 135.  
 — Drusen der Papille bei LXIX 381.  
 — einfache, Begriff LXVIII 127.  
 — — Gliawucherung bei LXVIII 146, 383.  
 — — Häufigkeit LXVIII 130.  
 — — mikr. Befund LXVIII 130, 132, 134, 138, 146.  
 — — ophthalm. Befund LXVIII 130, 132, 134, 150.  
 — — Topographie des Optikuseintritts LXVIII 126.  
 — — bei den versch. Typen von physiolog. Exkavat. LXVIII 147.  
 — nach Embolie der Zentralarterie LXVIII 134, 143.

- Atrophia n. optici** bei Endophthalm. traumat. LXX 479.  
 — mit Exkavation LXIV 399.  
 — Farbe der Mac. lut. LXV 508.  
 — und Glaukoma simpl., Diff. - Diagnose LXVI 504.  
 — glaukomatöse, mikr. Befund LXVIII 144.  
 — — Verhalten der Adaptation bei LXV 401, 416.  
 — — Verziehen der Retina über die Papille bei LXVIII 154.  
 — bei Hypophysistumor LXX 343.  
 — nach Influenza LXVIII 134.  
 — bei Lues LXX 342, 344, 346, 366.  
 — nach Meningitis LXVIII 140.  
 — bei Mikrophthalmus LXVII 192, 200, 217.  
 — mikr. Befund LXI 22, 60, 84, 117, 121, 131, 141, 285, LXV 196, LXVII 12, 27, LXVIII 234.  
 — Miosis bei elektrischer Belichtung LXV 113.  
 — neuritische LXVIII 141, 153.  
 — — Verziehen der Retina über die Papille bei LXVIII 153.  
 — ophthalmoskop. Befund bei Untersuchung mit Tageslicht LXV 501.  
 — bei Orbitalphlegmone LXI 482.  
 — bei Paranoia LXVIII 130.  
 — Pupillenreaktion bei LXV 113, 114.  
 — bei Sarkom der Chorioidea LXVIII 234.  
 — bei Skorbut LXIV 175.  
 — bei Tabes dors. LXVIII 132.  
 — durch Thyreoidin LXI 502.  
 — bei Turmschädel LXVIII 412, 417, 418.  
 — bei Verschluß der Zentralgefäße LXI 22, 60, 121, 273.  
 — — — der Zentralvene LXI 84, 109, 117, 131, 141, 281.  
 — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 273, LXX 234.  
 — s. auch Optikus, Degenerat.
- Atropin**, Anwendung bei Hornhautgeschwüren LXIX 271.  
 — Wirkung beim experiment. Glaukom LXVI 417.
- Atropinmydriasis** beim Kaninchen LXV 111.  
 — bei der Katze LXV 111.  
 — bei Negern und Indianern LXV 503.
- Auge** s. auch Bulbus.  
 — der anthropoiden Affen LXII 250.  
 — Bersten bei hämorrhag. Glaukom LXVIII 182.  
 — Depigmentierung LXX 570.  
 — elektrische Leitfähigkeit LXIX 126, 139.
- Auge**, elektrische Leitfähigkeit, Einfluß des Glaskörpers LXIX 142.  
 — — — — des Kokains LXIX 140.  
 — — — — der Sklera LXIX 142.  
 — Größenwachstum LXVIII 335.  
 — Kontusion, s. d.  
 — lymphomatöse Geschwulstbildungen LXII 130.  
 — rudimentäres, im Teratom der Orbita LXIII 3.
- Augenabstandsmesser** LXV 176.
- Augenachse**, Länge der, und Linsenbrechung. Wechselwirkung LXX 132.  
 — Verlängerung durch Muskeldruck LXV 27.  
 — — bei Refraktionsänderung LXX 56.
- Augenanlage**, Einfluß auf die Entwicklung der Nebenorgane LXIII 24.
- Augenbäder** LXIII 372, 375.
- Augenblase**, Einstülpung der LXIII 42, LXV 235.  
 — — und Einstülpung des Ektoderms LXVII 250, LXVIII 314.
- Augenbrauen**, Entwicklungsgeschichte LXVI 567.
- Augeneinstellungsbewegung**, unbe- wußte, Reflexbogen der LXX 372, 375, 400.
- Augenentzündung der Neugeborenen** s. Conj. bleun.
- Augenentzündungen**, fötale LXIV 224.
- Augenform**, Veränderung durch den intraokul. Druck LXIV 126.
- Augenhintergrund**, Erkrankungen. Adaptationsstörungen bei LXV 383, 397.  
 — — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 272, LXX 233.  
 — Farbe bei Leukämie LXII 189.
- Augenhöhle** s. Orbita.
- Augenmaße** bei Aniridie LXX 65.  
 — beim Fötus LXIV 225, 230, LXVI 205.  
 — beim Hydrophthalm. cong. LXIII 482, 491, 496, 505, 514, 525, 526.  
 — beim Kaninchen LXVI 344, 357.
- Augenmuskel** s. Muskel.
- Augenspalte**, fötale, atypische LXVII 257.
- Augenveränderungen** bei hämorrhag. Diathesen LXIV 175.  
 — bei Purpura hämorrh. LXIV 176.  
 — bei Skorbut LXIV 175.
- Augenvolumen**, Veränderung durch den intraokul. Druck LXIV 124.
- Ausgleichsinnervation** LXII 402.  
 — Erschlaffung durch Prismen LXII 409.

- Ausgleichsinnervation** bei Gleichgewichtsstörungen LXII 428.  
 — schädigende Wirkung LXII 427.  
**Autophagen** LXIII 306.  
**Avulsio bulbi** LXVII 360.  
 — cas. LXVII 361.  
 — Entstehung LXVII 362.  
 — mikr. Befund LXVII 363.  
**Axishirsch**, parenchymat. Kerat., pathol. Anat. LXII 488.

## B.

- Bacillus typhi**, Impfung der vord. Kammer mit LXVI 448.  
 — — Toxinwirkung auf die Conj. LXVIII 82.  
**Bäck'scher Schlagapparat** LXII 233.  
**Bär**, Keratit parenchym., pathol. Anatom. bei LXII 488.  
**Baktericide Eigenschaft** des Blutes LXII 198.  
**Baktericide Substanzen** der Cornea nicht immunis. Menschen LXV 287.  
 — des Glaskörpers nicht immunis. Kaninchen LXV 281.  
 — — — — — Einfluß der Blutstauung LXV 284.  
 — — — — — entzündl. Reize LXV 284.  
 — — — — — der Kammerpunktion LXV 284.  
 — — — — — der Punktion LXV 283.  
 — — — — — subkonj. Kochsalzinj. LXV 284.  
 — — beim Menschen LXV 286.  
 — des Kammerwassers nicht immunis. Kaninchen LXV 272.  
 — — — — — Einfluß der Blutstauung LXV 278.  
 — — — — — entzündl. Reize LXV 277.  
 — — — — — der Glaskörperpunktion LXV 276.  
 — — — — — subkonj. Kochsalzinj. LXV 276.  
 — — — — — der Temperatur LXV 273.  
 — — — — — wiederholter Punktion LXV 274.  
 — — — — — beim Menschen LXV 278.  
**Bakterien**, Wirkung der Lichtstrahlen auf LXVI 278.  
**Bakteriolyse** des normal. Kammerwassers LXIV 427.  
 — des Kammerwassers in loco LXIV 429.  
 — — in vitro, vgl. Versuche LXIV 432.  
**Bakteriolyse** des Kammerwassers normaler und immunis. Kaninchen im Tierkörper LXIV 428.  
**Bakterium coli** comm., Erkrankungen der Conj. durch LXVIII 104.  
 — — — — — Inkubationszeit LXVIII 106.  
 — bei lymphomatöser Erkrankung der Conj. LXII 186.  
 — bei Ulcus corneae LXII 187.  
 — Bakterioprotein des LXVIII 105, 162.  
 — Toxiprotein des LXVIII 105, 162.  
**Bakterium dysentericum**, Toxinwirkung auf die Conj. LXVIII 82, 107.  
 — — — — — endogene LXVIII 159.  
**Balkenstich** LXIX 346.  
**Basalkegel** s. Linsenkegel  
**Basedow'sche Krankheit** bei lat. Vertikalschielen LXII 419  
**Becherzellen** im Ektrop. sarkomat. LXIII 315.  
 — in Epithel einsenkungen i. A. LXVIII 532.  
 — bei Trachom LXIII 298, 301.  
 — im Tumor der leeren Orbita LXI 224.  
**Beleuchtung**, künstliche, hygien. Wert der Bogenlampen LXIX 73.  
 — — — — — der elekt. Glühlampe LXIX 73.  
 — — — — — des Gasglühlichts LXIX 73.  
 — — — — — der Petroleumlampe LXIX 74.  
 — und Sehschärfe LXIV 131, 134, 138, 567, LXVI 455, 461, 501.  
**Beleuchtungsgläser**, Absorptionsfähigkeit für ultraviolette Strahlen LXIX 65.  
**Berlin'sche Trübung** LXII 229, 235, 241, 244.  
 — Pathogenese LXII 231, 236.  
**Bestrahlung** s. Lichtstrahlen.  
**Bilderbetrachtung** bei Bewegung, psychische Momente für die LXIII 460.  
**Bindegewebe**, endothelogenes, an der Hinterfläche der Cornea LXVI 369, 415.  
 — Entstehung LXIII 308.  
 — aus Epithelzellen LXII 535.  
 — aus Fibrin LXII 534.  
 — Zusammenhang mit den Epithelien LXVII 320.  
**Bindegewebsneubildung** aus epitheloiden Zellen LXI 412.  
 — präretinale LXI 53, 132, LXIV 167.  
 — — Entstehung LXIV 169.  
 — retrochorioideale LXVI 387.  
 — retroretinale LXI 274, LXIV 165.



**Bindegewebswucherung** im Sarkom LXIII 477.  
**Binokularsehen** bei Hyperopie LXX 187.  
 — kongenitale Schwäche des LXX 180.  
 — — Ursache von einseitiger Amblyopie LXX 181.  
 — — — von Anisometropie LXX 184.  
 — — — — von Hyperopie LXX 195.  
 — — — — von Strabismus LXX 185.  
 — bei Strabismus LXX 188.  
**Birch-Hirschfeld'sches Fixierungsgemisch** LXIV 214, 247.  
**Bismarckbraun**, Diffusion in die Linse LXII 117.  
**Blasenzellen** LXV 189.  
**Blastomeren**theorie LXIII 11.  
**Blaublindheit**, Achswerte des Nernst-Licht-Spektrums LXII 473.  
 — Fall von LXII 461, LXVI 185.  
 — Häufigkeit LXII 479.  
 — Kasuistik LXII 475.  
 — neutrale Punkte LXII 473.  
 — praktische Bedeutung LXII 479.  
 — Prüfung mit farbigen Schatten LXII 469.  
 — — mit Holmgren's Wollproben LXII 467.  
 — — mit Nagel's Tafeln LXII 467.  
 — — am objektiven Spektrum LXII 468.  
 — — mit spektralen Mischungs-  
gleichungen LXII 469.  
 — — mit Stilling's Tafeln LXII 466.  
 — Verhalten der entoptischen Macula LXVI 185.  
**Bleinkrustation** der Conj. LXIII 380.  
**Bleiintoxikation**, Amblyopie bei LXV 387.  
**Bleikarbonat**, Entstehung aus organischen Bleiverbindungen LXIII 331.  
**Bleitrübung** der Hornhaut, Abkratzung LXIII 382.  
 — — — — Aufhellung durch Ammoniumtartrat LXIII 352, 358, 362, 378.  
 — — — — — Ektasie der Hornhaut nach LXIII 378.  
 — — — — — durch Chlorammonium LXIII 377.  
 — — — — — durch Jodkalium LXIII 359, 377.  
 — — — — — durch Bleichlorid LXIII 331.  
 — — — — — durch Bleikarbonat LXIII 330.  
 — — — — — durch Bleimukoid LXIII 330.  
 — — — — — durch Bleiphosphat LXIII 331.  
 — — — — — Entzündungen bei LXIII 331.  
 — — — — — Experimentelles LXIII 330.  
 — — — — — Iritis bei LXIII 331.  
 — — — — — Rolle des Eiweiß LXIII 330.

**Bleitrübung** der Hornhaut, Aufhellung des Mukoid LXIII 330.  
 — — — — Verlauf LXIII 331.  
 — — — — Wesen LXIII 329.  
**Bleiverbindungen**, Auflösung im Reagenzglas LXIII 351.  
**Blendung** bei Mydriasis LXV 395.  
 — bei Nyktalopie LXV 389.  
**Blennorrhoe** s. Conj. blenn.  
**Blessig'sche Hohlräume** LXI 63, 134.  
**Bley**, Graufärbung der Retina im Zwischenstadium der Sehpurpurbleichung beim LXIII 155.  
**Blickfeld**, Ausdehnung LXII 436.  
 — Prüfung bei Muskelinsuffizienz LXII 435.  
**Blinder Fleck**, Vergrößerung bei Neurit. opt. LXV 398, 400.  
 — — bei Retinit. album. LXV 401.  
**Blut**, bakterielle Eigenschaft LXII 198.  
 — Fettgehalt LXX 218.  
**Blutbefund** bei Chlorom LXII 152.  
**Blutdruck**, Einfluß auf die Kammerwassersekretion LXIV 451, 468, 471.  
 — und intraokularer Druck LXIV 465, 470, 475.  
**Blutgeleextrakt**, Einfluß auf die Kammerwassersekretion LXIV 456.  
**Bluterguß**, präretinaler LXI 133.  
**Blutfarbstoff**, Diffusion in die Gefäßwand LXI 115.  
**Blutkörperchenzählung** LXII 151.  
**Blutserum**, Fluoreszenz LXII 45.  
**Blutungen** bei hämorrhag. Diathese, Ursache LXIV 182.  
 — bei Hydrophthalmus nach Einschnürung des Kammerwinkels LXIII 238.  
 — intraokulare, nach Sklerotomie bei Glauk. absol. LXIV 320.  
 — bei Iridektomie LXI 304.  
 — der Lidhaut bei Skorbut LXIV 175.  
 — präretinale, Abkapselung LXIII 421, LXX 287, 293.  
 — — Berstung der Limit. int. LXX 292.  
 — — Durchbruch in den Glaskörper LXIII 428, LXX 275, 304, 312.  
 — — Entstehung LXX 297.  
 — — Form LXIII 427, LXX 275, 297.  
 — — Kasuistik LXIII 418, LXX 277, 299.  
 — — vor und hinter der Limitans int. LXX 294.  
 — — Merkmale LXIII 418.  
 — — mikr. Befund LXI 133, 300, LXIII 420, LXIV 168, LXX 279, 285, 290, 300, 304.  
 — — faltenförmige Netzhautablösung bei LXIII 425, LXX 292, 300, 310.

**Blutungen** präretinale. ophthal. Befund LXIII 419, LXX 275, 277, 284, 290, 293, 311.  
 — — reine Fälle LXX 275.  
 — — Sedimentierung LXX 292.  
 — — Sitz LXIII 418, 428, LXX 291, 307.  
 — — Ursprung LXX 297. •  
 — — retinale s. Retina.  
 — — subkonjunktivale bei Skorbut LXIV 175.  
 — — subhyaloideale s. präretinale.  
 — — subretinale LXIV 166, LXX 301.  
 — — Gewebsneubildung nach LXX 504.  
 — — bei Kontusion des A. LXII 241.  
**Blutuntersuchung**, bakteriologische, bei metastat. Augenerkrankungen LXII 226.  
 — — bei sympath. Entzündung LXII 193, 226.  
 — — bei Leukämie LXII 190.  
**Blutveränderungen** bei Aderhaut-tuberkulose LXI 205.  
**Blutverlust**, Amaurose nach LXI 53.  
**Bogenfaserung**, Beziehung zum Pupillarreflex LXX 550, 561.  
**Bogenlampe**, Temperatur der LXV 111.  
**Bowman's Nachstaroperation** LXIII 561.  
**Brechungsindex**, Erhöhung bei der Akkommodat. Aphakischer LXV 35.  
 — — des Glaskörpers LXV 38.  
 — — des Kammerwassers LXV 38.  
 — — der Retina LXII 40, 42.  
**Brillenweite**, Apparat zur Bestimmung der LXV 176.  
**Bruch-Henle'sche Membran** LXII 263, 568, LXIV 141, 144, 595, LXV 362, 429.  
 — — bei den Aktinien LXII 557.  
 — — bei anthropoid. Affen LXII 262, 265.  
 — — bei enger und weiter Pupille LXII 267.  
 — — Kerne LXII 555, LXIV 144, 145, 151, 595.  
 — — Wesen LXII 270.  
 — — Zusammensetzung LXII 555.  
 — — s. auch Dilator oder Muskelepithelblatt.  
**Bruchn.** Dosis LXV 309.  
 — — Wirkung auf's Auge LXV 303.  
 — — auf die Dunkeladaptation LXV 308.  
 — — auf den Farbensinn LXV 305.  
 — — auf das Gesichtsfeld LXV 305.  
 — — auf den Lichtsinn LXV 304.  
 — — auf die Sehschärfe LXV 305, 318.

**Bulbarzentrum**, Reizung, Verengung der Gefäße nach LXVIII 215.  
**Bulbusruptur**, subkonj., sympath. Entzündung nach LXI 449, LXIX 573.  
**Buphthalmus** s. Hydrophth.

## C.

**Cajal'sche Methode** LXIV 249.  
**Calcarinaregion** als Sitz des optischen Zentrums LXII 343, 350, 358.  
**Calcarinarinde**, abweichende Schichtung der Zellelemente LXII 339.  
 — — Läsion. Störungen nach LXII 360, 362.  
**Calcium**, Affinität zu Eiweiß LXIII 323.  
 — — zu Kohlensäure LXIII 324.  
 — — zu Kollagen LXII 326.  
**Calciumkarbonat**, Auflösung durch Ammoniumacetat LXIII 358.  
 — — durch Ammoniumchlorid LXIII 357.  
 — — durch Ammoniumtartrat LXIII 351, 358.  
 — — durch Glycerin LXIII 351.  
 — — in Kalktrübungen der Hornhaut LXIII 325.  
**Calciumphosphat** bei Kalktrübungen der Hornhaut LXIII 326.  
**Calciumverbindungen**, Auflösung im Reagenzglas LXIII 351.  
**Canalis Cloquetii s. hyaloidens** s. Glaskörper. Zentralkanal.  
**Canalis Schlemmii** bei anthropoid. Affen LXII 272.  
 — — Arterien am LXIV 227.  
 — — Druck im LXIV 4.  
 — — Entwicklungsgesch. LXIII 438, 441, 445, 450, 454, LXIV 227.  
 — — Fehlen des, Ursache von Hydrophthalmus cong. LXIII 554.  
 — — bei Hydrophth. cong. LXIII 238, 486, 492, 495, 500, 508, 517, 522.  
 — — bei idiopath. Iridochoioid. LXIX 174, 180.  
 — — bei Iritis serosa LXI 441, 442, 444.  
 — — bei Keratitis parenchym. LXII 509, 514.  
 — — bei Keratoglobus LXVII 9.  
 — — Lumen LXIV 5.  
 — — Verlagerung und Verengung, Ursache v. Hydrophth. cong. LXIII 353.  
**Campanula Halleri**, Entstehung LXV 165.  
 — — im Fischauge LXV 165.  
 — — Lage LXV 165.  
**Capsula perilenticularis** LXV 223, 235.

- Carotis communis**, Aneurysma, Stauungspapille bei LXV 98.  
 — doppelseitige Unterbindung, Einfluß auf die Kammerwassersekretion LXIV 477.
- Cephalothoracopagus** LXVIII 243.  
 — Entstehung LXVIII 247.
- Chalazion**, Tuberkelbazillen im LXVI 90.  
 — tuberkulöses LXI 182.  
 — und Tuberkulose LXVI 90.
- Chamois**, Definition LXIII 114.
- Chemosis** bei Skleritis post. LXIV 383, 384.
- Chiasma**, Atrophie bei Mikrophthalmie LXVII 200, 217.  
 — Kreuzung, Beziehung zum gemeinschaftl. Gesichtsfeld LXV 102.  
 — — bei Nagetieren LXV 102.  
 — Verhältnis der gekreuzten und ungekreuzten Fasern LXV 102.
- Chininvergiftung**, Experimentelles LXX 241.  
 — Ischämie der Retina, Ursache LXX 248, 250.  
 — mikr. Befund LXX 242, 243, 245, 246, 247, 249.  
 — ophthalm. Befund LXX 248.  
 — Pathogenese LXI 519, 520.  
 — Thrombose der Art. centr. LXX 249, 250.  
 — Veränderungen der Zentralgefäße LXX 249, 251.
- Chlamydozoen** s. Prowazek'sche Körper.
- Chlorammonium** zur Aufhellung von Kalktrübungen der Hornhaut LXIII 361, 367, 368, 377.
- Chlorkalium**, Diffusionsfähigkeit LXI 92.
- Chlorlithium**, Diffusionsfähigkeit LXII 92.  
 — Nachweis LXII 88.  
 — Übergang in die einzelnen Körperteile LXII 89, 91.  
 — — in die Linse vom Kaninchen LXII 91.  
 — — — — Meerschweinchen LXII 90.  
 — — — — vom Ochsen LXII 89.
- Chlornatrium**, Diffusionsfähigkeit LXI 92.  
 — Gehalt der Hornhaut an LXIII 324.
- Chloroform**, Diffusion in die Linse LXII 121.
- Chlorom** LXII 132, 150.  
 — Blutbefund bei LXII 152.  
 — Grünfärbung bei LXII 159.  
 — histolog. Befund LXXXII 157.  
 — Krankheitsbild LXII 154.  
 — Leukämie bei LXII 155.
- Chlorom**, lymphomatöse Erkrankung der Conj. bei LXXXII 188.  
 — — Geschwulst der Orbita bei LXII 158.  
 — Periosterkrankung bei LXII 156.  
 — Verlauf LXII 155.
- Choleravibrionen**, Impfung der vord. Kammer mit LXIV 431.
- Cholestearinkristalle** in Bindegewebsschwarten zw. Ret. und Chorioid. LXIV 166, LXX 114.  
 — im Granulationsgewebe der leeren Orbita LXI 225.  
 — in der Linse LXII 117.  
 — — — — bei Katarakt LXII 118.  
 — in Nekrosen von Aderhautsarkom LXIII 78.  
 — in der Retina LXIV 167.  
 — in der Vorderkammer LXIV 500.
- Cholin** im Blut nach Röntgenbestrahlung LXV 356.
- Cholininjektion**, angeborene Katarakt bei Kaninchen nach LXV 335, 350.  
 — Einfluß auf die Gravidität LXV 328.
- Chondroitinschwefelsäure** in Amyloid LXVII 136.
- Chorea** beiläufig. Vertikalschielen LXII 418, 419.
- Chorioepillaris** s. Chorioidea, Kapselschicht.
- Chorioiden**, Ablösung, artifizielle LXI 106, 128.  
 — — durch Bluterguß LXI 80, LXIV 287, 303, LXVI 387, 405, 426.  
 — — — — mikr. Befund LXI 86.  
 — — — — Abkapselung durch Bindegewebsentwicklung LXVI 387.  
 — — nach Cyklodialyse LXVII 501, 514.  
 — — nach Entzündungen LXIII 502, 503, LXX 476.  
 — — nach Glaukomiridektomie LXI 90, LXVII 514.  
 — — bei Kupfersplitter i. A. LXIV 298.  
 — — und Netzhautablösung LXI 80, LXVI 406, LXVIII 59, 68.  
 — — nach Perforation eines Ulcus corn. LXX 471.  
 — — postoperative, nach Aufhebung der vord. Kammer LXX 471.  
 — — — — Diagnose LXVII 502.  
 — — — — Druckherabsetzung bei LXVII 501.  
 — — — — nach Punktion der vord. Kammer LXVI 386.  
 — Abszeß LXV 157.  
 — Anatomie und Histologie LXVII 307—359.  
 — Atrophie nach Entzündung und Drucksteigerung LXIII 541.

**Chorioidea**, Ablösung, postoperative, bei Glaukom LXI 64, 282, LXVI 416, LXX 97.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 504, 509, 518, 540.  
 — bei Myopie LXVII 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 410, 411, 419, 420, 423.  
 — atrophische Herde bei Hydrophthalm. cong. LXIII 279.  
 — Basalmembran LXVII 317.  
 — — Durchtritt von Leukocyten durch die LXVII 328.  
 — — Endigung am Optikus LXVII 334.  
 — — Entwicklung LXVII 322, 353.  
 — — Färbungsmethode LXVII 318.  
 — — histolog. Charakter LXVII 319.  
 — — Struktur LXVII 319.  
 — — Verbindung mit der Lamina elast. LXVII 323, 328.  
 — — Verhalten im Bereich des Ciliarmuskels LXVII 337.  
 — — Zugehörigkeit LXVII 319.  
 — Blutung aus der LXIII 504.  
 — bei Myopie LXVII 411, 414.  
 — Dicke LXVII 310, 313.  
 — — Abnahme im Alter LXVII 315.  
 — — bei anthropoid. Affen LXII 259.  
 — — Messungsmethode LXVII 311.  
 — — bei Neugeborenen LXVII 312.  
 — Drusen LXI 301, LXIII 477, LXIV 316, LXV 192, 210, LXVIII 233, LXX 117.  
 — elastische Fasern, Entwicklung LXVII 355.  
 — Embolie der Arterien, experimentelle LXIII 397.  
 — — — Veränderungen der Retina bei LXIII 399, 406.  
 — Endarteriitis LXI 160, 163.  
 — epithelial-glöse Verbindung m. der Ret. LXIII 510, 513, 524.  
 — Gefäße, Fettröpfchen in den, bei Retinit. album. LXX 217.  
 — — Neubildung bei sympathischer Entzdg. LXII 477.  
 — — Verhalten bei sympathisierend. Entzdg. LXI 399.  
 — Glashaut s. Lamina elast.  
 — Herde bei Myopie, Entstehung LXVII 423.  
 — — — mikr. Befund LXVII 404, 407, 408, 411, 414, 415, 419, 420, 421.  
 — — — ophthalmoskop. Formen LXVII 430, 433.  
 — Histologie beim Fötus LXVI 221.  
 — Kapillarschicht LXVII 343.  
 — — Arteriosklerose bei Albuminurie LXV 400.

**Chorioidea**, Kapillarschicht, Entwicklung LXVII 353.  
 — — bei Tieren mit Tapetum LXVII 348.  
 — Knochenneubildung LXIV 316, 317, 325, 326, LXVIII 305, LXIX 28, LXX 114.  
 — kollagene Fasern, Entwicklung LXVII 354.  
 — Kolobom s. Colob. chorioid.  
 — Lamina elastica LXVII 324, 423.  
 — — Dehiszenzen LXV 192.  
 — — Durchgängigkeit für Lymphocyten LXI 404.  
 — — elastische und kollagene Fasern LXVII 325.  
 — — Endigung am Optikus LXVII 324.  
 — — — — — elastischer Membranring LXVII 424.  
 — — — — — Entwicklung LXVII 355.  
 — — — — — Färbungsmethoden LXVII 325.  
 — — — — — Faserfilz LXVII 324.  
 — — — — — Festigkeit LXVI 334.  
 — — Risse LXVII 329.  
 — — — bei Hydrophth. cong. LXIII 523.  
 — — — bei hochgrad. Myopie LXVII 386, 406, 407, 411, 414, 419, 420.  
 — — — — — Struktur LXVII 324.  
 — — — — — Verbindung mit der Basalmembran LXVII 323, 328.  
 — — — — — mit der Kapillarschicht LXVII 325.  
 — — — Verhalten im Bereich des Ciliarmuskels LXVII 337.  
 — — — — — im myopischen Auge LXVII 385, 386, 393, 396, 398, 399, 402, 404, 406, 407, 410, 413, 418, 424.  
 — — — — — relative Retraktionen LXVII 386, 400.  
 — — — — — bei sympathisierend. Entzündung LXV 144.  
 — — — — — Widerstandsfähigkeit LXI 402.  
 — — — — — leukämische Infiltration LXI 402, LXII 160.  
 — — — Leukosarkom LXVIII 232.  
 — — — lymphadenoides Gewebe der LXII 165.  
 — — — lymphomatöse Geschwulstbildung LXII 159.  
 — — — — — Aggressivität LXII 167, 177.  
 — — — — — mikr. Befund LXII 172.  
 — — — — — Pathogenese LXII 161.  
 — — — Muskelzellen in der LXVII 350.  
 — — — bei Maus und Ratte LXVII 351.  
 — — — Papillarbildungen der LXVIII 71.  
 — — — pathol. Anatomie bei Cyanosis retin. LXVIII 198.  
 — — — — — bei Eisensplitterverletzung LXV 63.

**Chorioidea**, pathol. Anatomie bei Glaukom LXI 64, 275, 282, LXVI 349, 386, 398, 405.  
 — — — bei Hydrophth. cong. LXVII 489, 494, 503, 509, 518, 523.  
 — — — bei Iridocyclitis spont. LXIX 175, 180, 181.  
 — — — — traumatisch LXI 403.  
 — — — bei Kerat. parench. LXII 486, 510.  
 — — — bei Kolobom LXV 192, 210.  
 — — — bei Lymphomatose LXII 137.  
 — — — bei Mikrophthalmus LXVII 192, 196, 199, 203, 204, 213, LXVIII 305.  
 — — — bei Pseudogliom LXX 117, 119, 120.  
 — — — bei Retinit album. LXX 227.  
 — — — — septica LXX 281.  
 — — — bei sympathisier. Entzündung LXI 394, 403, 415, LXV 63, 65, LXX 477.  
 — — — bei Tuberkulose LXVI 39.  
 — Ruptur, anatom. Grundlage LXVII 324.  
 — — Mechanik LXII 241, 244, 247.  
 — — ophthalm. Befund LXII 244, 246.  
 — — traumatische LXX 469.  
 — Sarkom. s. d.  
 — Schichten LXVII 317.  
 — Spaltraum zw. Basalmembran und Lamina elast. LXVII 323, 328.  
 — subkapillares Fibrillennetz LXVII 345.  
 — subkapillare Zellenlage LXVII 346.  
 — — — Bedeutung LXVII 347.  
 — Supratraktion bei Myopie LXVII 393, 396, 398, 400, 402, 404, 410, 413, 418, 423, 427.  
 — Tuberkel LXX 68.  
 — Tuberkulose, akute Miliar- LXI 184.  
 — — — — Anzahl der Tuberkel LXI 185.  
 — — — — hämatogene LXI 184.  
 — — — — lymphogene LXI 184.  
 — — — — Pathogenese LXI 184.  
 — — — — Sitz LXI 185.  
 — — — — Ausbreitung LXI 186.  
 — — — — Blutveränderungen bei LXI 205.  
 — — — — chronische Lokal- LXI 185.  
 — — — — diffuse LXI 185.  
 — — — — knötchenförmige LXI 186.  
 — — — — tumorartige LXI 186.  
 — — — Glaskörpertrübungen bei LXI 187.  
 — — Katarakt bei LXI 187, 214.  
 — — Komplikationen LXI 187.  
 — — Veränderungen der Retina bei LXI 186.

**Chorioidea**, Tuberkulose, der Haustiere, akute Miliar- LXI 200.  
 — — — — Ausbreitung auf die Gefäße LXI 163, 164, 166, 168, 169, 202.  
 — — — — chronische LXI 201.  
 — — — — Ausbreitung LXI 202.  
 — — — — Sitz LXI 201.  
 — — — — klinische Symptome LXI 215.  
 — — — — tumorartige LXI 203.  
 — — — — Größe LXI 203.  
 — — — — histolog. Eigentümlichkeit LXI 203.  
 — — — — Sitz LXI 203.  
 — — — — Wachstum LXI 203.  
 — — — — Verkäsung und Verkalkung LXI 165, 169, 171, 173, 203.  
 — — — beim Kaninchen LXV 136.  
 — — — — Ausgänge LXVI 43.  
 — — — — Ausheilung LXVI 41.  
 — — — — pathol. Anatomie LXVI 39.  
 — — — beim Rind LXI 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167.  
 — — — — Bedeutung des Tapetum fibros. LXI 202.  
 — — — beim Schwein LXI 157, 161, 168, 171.  
 — — — — Pathogenese LXI 172.  
 — — — Verbindung mit der Pigmentschicht LXVII 320.  
**Chorioiditis**, anatom. Veränderungen bei LXI 275.  
 — — — — Farbenfeld LXV 408.  
 — — — — Gesichtsfeld bei LXV 408.  
 — — — — bei Retinit. hämorrhag. LXI 275, 277.  
 — — — — bei Skleritis post. LXIV 381, 390.  
 — — — — durch Staphyloc. alb. LXII 225.  
 — — — — Verhalten der Adaptation bei LXV 406, 416.  
**Chorioiditis dissem.**, Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 277.  
**Chorioiditis plastica**, mikr. Befund LXIV 165.  
**Chorioiditis sympathica** LXI 377, 405, LXV 142, LXX 466.  
**Chorioretinitis**, diagnostische Bedeutung des Licht- und Farbensinns LXVI 504.  
**Chorioretinitis disseminata**, Ätiologie LXVI 47.  
 — — — — Farbe der Herde LXII 3.  
 — — — — Tuberkulinprobe bei LXVI 70.  
 — — — — Tuberkulintherapie bei LXV 193.  
 — — — — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 276.  
**Chorioretinitis syphilitica**, Drusen der Papille bei LXIX 381.

- Chromatin-Veränderung** der Ganglienzellen bei Helladaptation LXIII 104.
- Chromatolyse** der Ganglienzellen der Retina LXI 514, LXIV 238, 287, 289, 291, 295, 297, 299, 301, 303, 309, 311, 314, 316, LXX 527.
- Chrysarobin-Applikation** auf die Haut, Erkrankungen des A. bei LXVI 249.
- Ciliarepithel**, äußere Lage, Wucherung nach außen LXVIII 540.
- — — nach innen LXVIII 540.
  - blutige Abhebung nach Punktion der vord. Kammer LXIII 488, LXVI 405.
  - Geschwülste, bösartige LXVIII 548.
  - — Ähnlichkeit mit Gliom LXVIII 555.
  - — — Bezeichnung LXVIII 555.
  - — — Diktyome (embryonale Netzhaut), Kasuistik LXVIII 548.
  - — — Lebensalter LXVIII 549.
  - — — Entstehung LXVIII 553.
  - — — Formen, regellose Aneinanderlagerung der Zellen LXVIII 572.
  - — — Typus des einreihigen Ciliarepithels LXVIII 557.
  - — — Zellschläuche LXVIII 559.
  - — — Histologie LXVIII 550.
  - — — patholog. Anatomie LXVIII 549.
  - — — Vakuolen LXVIII 564, 574.
  - — — Einteilung LXVIII 513.
  - — — gutartige, Adenome LXVIII 517.
  - — — Entstehung LXVIII 547.
  - — — Größe LXVIII 544.
  - — — Kasuistik LXVIII 543.
  - — — klin. Erscheinungen LXVIII 543.
  - — — Lebensalter LXVIII 543.
  - — — pathol. Anatomie LXVIII 545.
  - — — Vakuolen LXVIII 546.
  - — — Histologie LXIX 149.
  - innere Lage, histologische Stellung LXIX 156.
  - — — Wucherung, entzündliche LXVIII 536.
  - — — — Formveränderung LXVIII 536.
  - — — — Pigmentierung LXVIII 536.
  - — — — Vakuolen LXVIII 536.
  - — — — Zellmembran LXVIII 538.
  - — — — Zellstränge LXVIII 537.
  - — — — senile LXVIII 535.
- Ciliarfortsätze**, Entwicklungsgesch. LXIII 436, 438, 446, 450, LXVIII 8, 9, 17.
- nach hinten verlagerte LXVIII 324.
- Ciliarfortsätze**, hyaline Degeneration LXI 111, 118, 275, 282, 301.
- Hyperämie bei experiment. Glaukom LXVI 421.
  - klinischer Nachweis LXX 74.
  - Quelle des Kammerwassers LXIV 448.
  - rückwärts gerichtete LXV 156, 210.
  - Verhalten bei Hydrophthalm. conj. LXIII 488, 493, 502, 509.
  - — bei Irideremie LXX 68.
  - — — mangelhafte Entwicklung LXX 73.
  - — — Wesen LXIV 453.
- Ciliargefäße**, Durchschneidung beim Hund, Methode LXIV 275.
- — — Veränderungen des A. nach LXIV 276.
  - — — beim Kaninchen, Veränderungen des A. nach LXIV 266.
  - — — beim Hund LXIV 274.
  - — — Thrombose LXI 118, 302.
- Ciliarinjektion** bei Kaninchen LXV 130.
- bei sympathischer Entzündung und Reizung LXI 433.
- Ciliarkörper**, Ablösung LXI 80, 86, LXIII 502, LXV 191, LXVI 61, LXVIII 59, 294, LXX 476.
- — artefizielle LXI 134.
  - — durch Bluterguß LXIV 303.
  - — Anatomie beim Schaf LXX 411.
  - — bei anthropoiden Affen LXII 260.
  - — Atrophie LXI 25, LXIV 111, 134, 142, 275, 282, 288, LXIV 315, 319, 320.
  - — Blutung im LXI 301, LXVI 257.
  - — Cyste LXVIII 8.
  - — Entwicklungsgesch. LXVIII 8, 17.
  - — Faltenbildung der Pars plana beim Kolobom LXV 191, 199, 210, LXVIII 324.
  - — Klumpenzellen LXVIII 17.
  - — Kolobom s. Coloboma.
  - — leukämische Infiltration LXII 173.
  - — lymphocytäre Infiltration LXIV 312.
  - — patholog. Anatomie bei Endophthalmitis LXI 394, 415.
  - — — bei Glaukom LXI 25, 64, 111, 134, 142, 275, 282, 288, 301, LXIII 476, LXVII 498.
  - — — — experiment. LXVI 348, 398, 405, 421.
  - — — — bei Hornhautfistel LXX 96.
  - — — — bei Irideremie LXX 68, 73.
  - — — — bei Iridochorioidit. serosa LXI 415, 441, 442, 444.
  - — — — bei Iridocyklitis chron. LXVI 53, 54, 56, 57, 58, 61, LXIX 175, 180, 182.



**Ciliarkörper**, patholog. Anatomie bei Kolobom LXV 191, 199, 210.  
 — — — bei Mikrophthalmus LXVII 203, 213.  
 — — — bei sympathis. Entzdg. LXI 390, 414.  
 — Sarkom LXV 492.  
 — Tuberkulose LXI 187.  
 — — Formen LXI 187.  
 — — Glaskörperblutungen bei LXI 187, 197.  
 — — als Granulationsgeschwulst LXI 187.  
 — — klin. Bild LXI 187.  
 — — mit Knötchenbildung LXI 187.  
 — — bei den Haustieren, Häufigkeit LXI 205.  
 — — — — Pathogenese LXI 205.  
 — — beim Kaninchen LXVI 35.  
 — — beim Rind LXI 176, 178, 180.  
 — — beim Schwein LXI 175.  
**Ciliarmuskel**, Antagonist des LXX 133.  
 — bei anthropoiden Affen LXII 261.  
 — Einriß bei Hydrophth. cong. LXIII 517.  
 — Entwicklungsgeschichte LXIII 438, 439, 445, 446, 447, 448, LXVI 221, LXVIII 257.  
 — bei Myopie LXIII 509, LXVII 9.  
 — pathol. Anatomie bei Hydrophth. cong. LXIII 488, 493, 501, 509, 518, 523.  
 — — — bei Mikrophthalmus LXVII 192, LXVIII 304.  
 — — — bei sympathisierend. Entzünd. LXI 415.  
 — Pigmentierung im Affenauge LXII 261.  
 — radiäre Partie LXVII 341.  
 — Verbindung mit der Lamina elast. LXVII 341.  
 — Verhalten bei Irideremie LXX 68.  
 — Zugwirkung auf die Chorioidea LXVII 342.  
**Ciliarrand** der Lider LXVI 507.  
**Ciliarstaphylom** bei experiment. Glaukom LXVI 377.  
 — mikr. Befund LXVI 359.  
**Cilien**, Altersstadien LXVI 529.  
 — Ampulle LXVI 527, 531.  
 — Anordnung LXVI 507.  
 — Anzahl LXVI 507.  
 — ausgewachsene LXVI 525.  
 — Austauschknospe LXVI 527, 532.  
 — Balg LXVI 513, 525.  
 — — Ausführungsabschnitt LXVI 514, 525.  
 — — — Hornschicht LXVI 514.  
 — — — Bindegewebsscheide LXVI 528.

**Cilien**, Balg, Glasmembran LXVI 517, 529, 530.  
 — — — Entwicklungsgeschichte LXVI 562.  
 — — — innere Epithelmembran LXVI 516, 518.  
 — — — — Cuticula LXVI 518, 520.  
 — — — — Henle'sche Schicht LXVI 518, 519.  
 — — — — Huxley'sche Schicht LXVI 518, 519.  
 — — — Keim- oder Wurzelabschnitt LXVI 515, 525.  
 — — — äußere Epithelmembran LXVI 515, 526.  
 — — — Vakuolen LXVI 562, 563.  
 — — — Bulbusamphore LXVI 519.  
 — — — Elimination LXVI 529.  
 — — — Entwicklungsgesch. LXVI 556, 558, 561, 567.  
 — — — Funktion LXVI 553.  
 — — — bei Greisen LXVI 507.  
 — — — Haarzwiebel od. Bulbus LXVI 519, 526.  
 — — — jugendliche LXVI 512.  
 — — — Lebenszyklus LXVI 529.  
 — — — Matrix LXVI 527.  
 — — — Nerven LXVI 552.  
 — — — bei Neugeborenen LXVI 507.  
 — — — Papille LXVI 524, 528.  
 — — — Gefäße LXVI 525, 528.  
 — — — Nerven LXVI 525, 528, 553.  
 — — — Schaft LXVI 511.  
 — — — Epidermicula LXVI 520.  
 — — — Grundzellen LXVI 523.  
 — — — Keimzellen LXVI 522.  
 — — — Markschicht LXVI 522.  
 — — — Markzellen LXVI 523.  
 — — — Pigmentzellen LXVI 522.  
 — — — Rinden- oder Grundsubstanz LXVI 522.  
 — — — Wechsel, fötaler LXVI 568.  
 — — — Mechanismus LXVI 532.  
**Cilioretinales Gefäß**, Histogenese LXX 460, 464.  
 — im Konus myop. LXVII 425.  
**Circul. venos. Schlem.** s. Canal. Schl.  
**Coloboma chorioideae** LXV 187, 210, LXVIII 293, 306.  
 — Duplikatur und Faltung der Retina LXV 162, 186, 204, LXVII 247, LXVIII 285, 296, 323, 325.  
 — Ektasie der Sklera LXV 193.  
 — ektatisches und Mikrophthalmus mit Cyste LXVII 240, LXX 315.  
 — Entstehung LXVII 245, LXVIII 258, 288, 446, LXX 319, 322.  
 — Fältelung der Pars cil. ret. LXV 199, 210 LXVIII 294.  
 — Gesichtsfeld LXV 187.

- Coloboma chorioideae**, beim Katzen-embryo LXVIII 282.  
 — Mesodermleiste LXV 210, LXVII 252, LXVIII 294, 319, 452.  
 — mikr. Befund LXV 192, 210, LXVIII 294, 326.  
 — Refraktion LXV 187, 212.  
 — Rosettenbildung LXVIII 287.  
 — Skleralzapfen LXV 193.  
 — Vermengung von retinalem und skleralem Gewebe LXVIII 295, 297, 300.  
**Coloboma corporis ciliaris** LXIII 40.  
 — beim Katzenembryo LXVIII 283.  
**Coloboma fundi**, atypisches, mit Cystenbildung LXVIII 277.  
 — — Entstehung LXVIII 281, 321.  
 — — mikr. Befund LXVIII 278.  
 — — ophthalm. Befund LXVIII 282.  
 — bei Cyklopie LXVIII 251, 254.  
**Coloboma iridis** LXV 187, 208, LXVIII 293.  
 — atypisches LXVI 270.  
 — — Entstehung LXVI 273, LXVIII 347.  
 — bei Cyklopie LXVIII 250, 253.  
 — Entstehung LXV 216, LXVI 272, 273, LXVIII 257, 335, 447.  
 — bei Hydrophth. cong. LXVIII 447.  
 — mikr. Befund LXV 191, 209.  
 — traumat. LXVIII 485.  
**Coloboma lentis**, Entstehung LXVIII 451.  
**Coloboma maculae** LXV 384.  
**Coloboma n. optici** LXV 200, LXVIII 296, 299.  
 — und Aplasie LXV 214, LXVIII 296, 298.  
 — Häufigkeit LXV 201.  
 — und Mikrophthalmus LXV 198.  
 — mikr. Befund LXV 194, 200.  
 — am Optikuseintritt LXV 215.  
 — Pathogenese LXV 186, 204.  
 — Schrägstellung der Papille LXV 194, 205, 211.  
 — Zentralgefäße, Lage der LXV 207.  
**Coloboma oculi**, Defekt der Aderhaut und des Pigmentepithels LXVIII 327.  
 — Grenze zw. innerem und äußerem Blatt LXVIII 326.  
 — Mesodermleiste und Größe des Koloboms LXVIII 326.  
 — bei Mikrophthalmus LXI 362, LXIII 40, LXV 389, LXVIII 429, 435.  
 — Pathogenese LXIII 44, LXV 185, 216, LXVIII 318, 329, 426, 446, LXX 319, 322, 323.  
 — Verhalten der Retina im LXVIII 279, 288, 295, 328.

Schlaefke, General-Register.

- Coloboma oculi**, Verhalten der Retina. Einlagerung in Optikus und Chorioid. LXVIII 332.  
 — — der Sklera LXVIII 279, 296.  
**Coloboma palpebrae sup.** LXIII 38.  
 — Pathogenese LXIII 43.  
**Colobomcyste**, Entstehung LXVII 235, 241, 246, LXX 319.  
**Commissura inferior** s. Gudden'sche Kommiss.  
**Commotio retinae**, Affektion der Macula LXII 230.  
 — Berlin'sche Trübung bei LXII 229, 235, 241, 244.  
 — — — Pathogenese LXII 231, 236.  
 — keulenförmige Gebilde in der Retina LXII 232, LXIV 246.  
 — klinisches Bild LXII 227.  
 — Lichtsinn LXII 229, 241.  
 — Linsenastigmatismus, traumatischer, bei LXII 230.  
 — Mechanik LXII 237.  
 — Sehschärfe LXII 228, 229.  
 — Sehstörung, Ursache LXII 230, 236.  
 — Skotom, peripheres bei LXII 228, 229, 242.  
 — — — Ursache LXII 231.  
**Conjunctiva**, Abszeß durch Staphylokokken LXVII 65.  
 — — Entstehung LXVII 65.  
 — — mikr. Befund LXVII 67.  
 — adenoides Gewebe LXII 144, LXIII 51, 294, 296, 297.  
 — — — Entstehung LXIII 296.  
 — — — beim Fötus LXIII 291.  
 — — — beim Neugeborenen LXIII 291.  
 — Amyloidgeschwulst, Charakter LXVII 128.  
 — — lokale Erkrankung LXVII 129.  
 — — Metastasen LXVII 128.  
 — — operative Therapie LXVII 128.  
 — — und Trachom LXVII 127.  
 — Becherzellen LXIII 298, 301, LXVI 208, LXIX 532, LXX 66.  
 — Bleinkrustation der LXIII 380.  
 — Cylinderepithel LXVIII 532.  
 — Drüsen LXIII 296.  
 — Entwicklungsgesch. LXIX 213.  
 — Epithel, Doppelkörnchen im LXIX 534.  
 — — Mitosen LXIX 535.  
 — — Pigmentzellen LXVII 68.  
 — — Untersuchungstechnik LXIX 531.  
 — — Vakuolen LXIX 534.  
 — — Veränderungen bei Conjunctivalerkrankn. LXIX 532.  
 — — — bei Frühjahrskatarrh LXIX 532.  
 — — — beim Pterygium LXIX 532.



**Conjunctivitis diphtherica**, Anämie bei, Ursache der LXVII 168.  
 — Mikroorganismen LXVII 165, 167, 168.  
 — patholog. Anatomie LXVII 162, 166.  
**Conjunctivitis infectiosa Parinaudi** s. Parin.  
**Conjunctivitis** bei Gonorrhoe, toxische Ursache LXVIII 155.  
 — bei Infektionskrankheiten, toxische Ursache LXVIII 157.  
 — nach Injektion von Hefezellen LXVIII 173.  
 — — von Trypanosomen LXVIII 173.  
 — durch Toxine, ektogene LXVIII 77.  
 — — endogene LXVIII 155, 171, 173.  
 — durch ultraviolette Strahlen LXIX 458.  
**Cornua**, Abflachung bei Glaukom LXVI 385, 400, 402.  
 — nach Keratit parenchym. LXII 482.  
 — Absorptionsvermögen für ultraviol. Strahlen LXIX 454, 455, 462.  
 — — — des Kadmium-Zinkbogenlichtes LXVI 292.  
 — — — des Magnesiumfunkens LXVI 287, 288.  
 — Ausbuchtung und Verdünnung bei Lentiglob. ant. LXV 321.  
 — baktericide Substanzen in der, bei nicht immunis. Menschen LXV 287.  
 — Bindegewebsbildung auf der Hinterfläche LXVII 6, 28.  
 — — — bei Kerat. disciformis LXVIII 367.  
 — — — — bei Kerat. parenchym. LXVIII 357, 361, 365.  
 — bläschenförmige Hohlräume bei Kerat. parenchym. LXII 508.  
 — Bowman'sche Membran, Dicke beim Fötus LXIV 227, LXVI 210.  
 — — — Drusen LXIII 506.  
 — — — Kalkablagerung LXIV 326.  
 — — — Regeneration LXVII 21.  
 — — — Risse bei Hydrophth. cong. LXIII 498, 506, 516.  
 — — — und Fehlen bei Keratokon. LXVII 3, 5, 21.  
 — — — Verhalten bei Kerat. bullosa LXIX 32.  
 — — — — bei Kerat. parenchym. LXII 505, 507, 511, 516, 530, LXVI 210, LXVIII 356.  
 — Braunfärbung durch Jodsäure LXIII 377.  
 — chemische Bestandteile LXIII 321.

**Cornua**, Dermoid, Diff.-Diagn. von Dakryops LXI 347.  
 — Descemet'sche Membran, Anatomie bei anthropoid. Affen LXII 257.  
 — — — Beschläge, mikr. Befund LXI 440, 442, 443.  
 — — — — Ursache der Dreiecksanordnung LXIV 449.  
 — — — — Vorkommen LXI 445.  
 — — — — Entwicklungsgesch. LXIII 436, 437, 439.  
 — — — — Faltenbildung bei Skleralraptur LXII 240.  
 — — — — glashäutige Neubildung LXIII 486, 498, 507, 516.  
 — — — — — Pigmenteinschlüsse LXIII 507, 516.  
 — — — — Lamellierung, färberisch. Verhalten LXVI 407.  
 — — — — mikr. Befund bei Hydrophth. cong. LXIII 485, 491, 498, 507, 516, 521.  
 — — — — Neubildung LXIII 545.  
 — — — — Pigmentbeschläge, Bedeutung LXIII 545.  
 — — — — Risse bei experiment. Glaukom LXVI 386, 391, 410.  
 — — — — — bei Hydrophth. cong. LXIII 247, 248, 249, 252, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 272, 273, 274, 275, 280, 485, 492, 498, 507, 516, 521, 530, 531, LXVI 409, LXVII 172, 176.  
 — — — — — bei Keratokonus LXVII 4, 24.  
 — — — — — klin. Bild LXVI 412.  
 — — — — — bei Myopie LXIII 531.  
 — — — — Spaltung und Defektbildung bei experm. Glaukom LXVI 347, 396, 403, 407.  
 — — — — Verbindung mit der Iriswurzel LXIII 449, 508, LXX 85.  
 — — — — Verdickung und Verdoppelung im Mikrophth. cong. LXI 353.  
 — — — — Verhalten bei Kerat. parenchym. LXII 486, 513, LXVIII 357, 366.  
 — — — — — bei Ulcus corn. intern. LXVIII 377.  
 — Dicke bei anthropoid. Affen LXII 255.  
 — — beim Fötus LXVI 211.  
 — — bei Hydrophth. cong. LXIII 483, 492, 495, 499, 516.  
 — — bei Kerat. parenchym. LXII 504, 510, LXVI 211.  
 — — bei Keratokonus LXVII 2, 18.  
 — — bei Myopie LXIII 533.  
 — — im Zentrum und in der Peripherie LXVII 35.

**Cornea, doppelte, bei Cyklopie LXVIII 250.**

- Durchblutung LXII 526.
- Durchmesser bei Aniridie LXX 66.
- — bei anthropoid. Affen LXII 254.
- — bei Iriskolobom LXV 187, LXVI 270.
- Durchmesser bei Mikrophthalmus LXV 389.
- Einwanderungsring s. Infiltrationsring.
- Eiweißgehalt LXIII 321.
- Ektasie, nach Aufhellung von Bleitürbungen LXIII 378.
- elastische Fasern LXVII 22.
- Endothel, Bedeutung für das Hornhautparenchym LXII 520, 527, 529, 530, 538.
- — Eisenhämatoxilininfärbung LXVII 7.
- — Entwicklungsgesch. LXIII 436, 438, 439.
- — Erkrankung bei Kerat. parenchym, LXII 493, 497, 499, 519, 529.
- — Fehlen bei Glaukom LXI 118.
- — glashäutige Neubildung LXVI 369, 409.
- — Verhalten bei Iridocyklitis luetica LXII 522.
- — — — — traumat. LXII 529.
- — — — — tuberculosa LXII 526.
- — — bei Keratit. neuroparalyt. LXII 538
- — — — — parenchymat. LXII 508, 514, LXVI 254.
- — — — — purulent. LXII 521.
- — Wucherung LXVI 369, 409.
- — — bei Iristuberkulose LXI 180, 210.
- — — und Pigmentierung LXI 446, LXIII 485, 507, 546.
- Epithel bei anthropoid. Affen LXII 256.
- — — — — Pigmentierung LXII 256.
- — blasige Abhebung LXIII 515.
- — Degeneration bei Keratitis bullosa, hyaline LXIX 36.
- — — — — schleimige LXIX 36.
- — beim Fötus LXIV 226.
- — Hohlräume im LXIX 21, 26, 29.
- — Entstehung LXIX 34.
- — Mitosen LXVIII 356.
- — papillenartige Wucherung bei Iristuberkulose LXI 180, 181.
- — Verhalten bei Hydrophth. cong. LXIII 483.
- — — bei Keratit. bullosa LXIX 5, 20, 26, 33.
- — — — — parenchymat. LXII 505, 506, 507, 511, LXVI 209, 252, LXVIII 356.

**Cornea, Epithel. Verhalten bei Keratit. vesiculosa LXIX 27, 28, 33.**

- Erkrankungen bei Iridocyklitis luetica, Pathogenese LXII 523.
- — — — — tuberculosa LXII 524.
- Ernährung LXIV 587.
- Exsudat auf der Hinterfläche LXI 445.
- Faltenbildung bei Keratit. parenchymat. LXII 482.
- Fistel. Entstehung LXX 88.
- — pathol. Anatomie LXX 89, 92.
- — bei Tuberkulose LXI 175, 211.
- — Verhalten der Augenkammern LXX 96.
- Flecken s. Trübungen.
- fötale, Leukocyten in der LXIV 232.
- Gefäßneubildung bei Kerat. parenchymat. LXII 503, 506, 512, 516.
- — bei Regeneration der Hornhaut LXII 540.
- globosa und Hydrophthalmus LXIII 241, 530, 532, 533.
- Grenzzug, vorderer LXVII 6.
- Größe bei Myopie LXIII 530.
- — normale LXIII 532.
- Grundsubstanz, neugebildete LXIII 499.
- Hohlräume, mikroskopische, bei Kerat. parench. LXVI 218.
- Impfung mit Aspergillus fumigat LXVI 447.
- Infiltrationsring, doppelter LXV 418.
- — Entstehung LXV 236, LXVIII 369.
- Infiltratum parenchymatosum anulare cong. LXVI 204.
- Körper (Zellen), Beteiligung an der Regeneration der Hornhaut LXII 531, 533, 540
- — Proliferation, Ursache LXVI 243.
- — Verhalten bei arteziellen Traumen LXII 534.
- — — bei Iridocyklitis LXII 528.
- — — bei Keratitis neuroparalyt. LXII 536.
- — — — — parenchymat. LXII 501, 515, 531, LXVI 215, 231, 243, 254.
- — — bei Ulcus corn. LXII 539.
- — Vermehrung bei fötaler Keratoiritis LXIV 227, 232.
- Krümmungsradius bei Hydrophthalm. cong. LXIII 216.
- Lamellen, Anzahl und Dicke LXVII 20.
- Leukom, Entstehung LXVIII 379.
- und Linse, Entwicklungsgesch. LXIII 443.
- Lymphzirkulation LXII 543.

**Cornea**, lymphomatöse Erkrankung LXII 184, 186.  
 — Mukoid in der LXIII 327.  
 — Narben, Aufhellung LXII 541.  
 — Tätowierungsmethode LXII 376.  
 — Narbenbildung, Einfluß des intra-  
 okul. Druckes auf die LXII 541.  
 — Nekrose bei Keratitis. neuroparalyt.  
 LXII 537, LXIII 2.  
 — — — parenchym. LXII 502, 505,  
 LXVI 217, LXVIII 357, 359.  
 — — — — Ursachen LXII 518.  
 — Ödem bei Iridocyel. LXII 528.  
 — — bei Status glaukomat. LXIII 475.  
 — patholog. Anatomie bei: Eisen-  
 splitterverletzung LXV 61.  
 — — — Fistel LXX 92.  
 — — — Glaukom LXIII 475, LXIV  
 319, LXIX 3, 20.  
 — — — — experiment. LXVI 345,  
 385, 395, 403.  
 — — — — Hydrophthalm. cong. LXIII  
 483, 491, 495, 497, 507, 515, 521.  
 — — — Iridocyklitis luetica LXII 522.  
 — — — — spontanea LXIX 173, 177,  
 180.  
 — — — — tuberculosa LXII 524,  
 LXVI 54, 55, 57, 58, 60.  
 — — — — Irístuberkulose LXI 180, 216.  
 — — — Keratitis bullosa LXIX 3,  
 10, 19, 25.  
 — — — — neuroparalyt. LXII 536.  
 — — — — parenchymat. LXII 484,  
 517, LXVI 252, LXVIII 355.  
 — — — — e lue heredit. LXII  
 501, 510, LXVI 209.  
 — — — Keratokonus LXVII 2.  
 — — — Keratoiritis beim Fötus LXIV  
 226.  
 — — — Mikrophthalm. cong. LXI 353  
 LXVII 203, 213, LXVIII 303, 433.  
 — — — Operationsnarben LXIII 484.  
 — — — Pannus degenerat. LXIX 4, 20.  
 — — — — glaukomat. LXIV 319.  
 — — — Ulcus LXI 143, LXIII 521,  
 LXVI 445  
 — — — — internum. LXVIII 376.  
 — — — — perforat. LXVI 440, 442,  
 443.  
 — — Plasmom der LXVIII 119.  
 — — Quellungstrübung LXVI 255.  
 — Radius bei anthropoid. Affen LXII  
 255.  
 — — bei Emmetropie LXX 138.  
 — — — Hyperopie LXX 138.  
 — — — Myopie LXX 138.  
 — — — Neugeborenen LXX 132.  
 — — — und Linsenradius LXX 138.  
 — Regeneration, Einfluß des Lebens-  
 alters LXII 540.

**Cornea**, Regeneration, Gefäßneubil-  
 dung bei LXII 540.  
 — — bei Keratitis. parenchym. LXII  
 531.  
 — — — — suppurat. LXII 532, 533.  
 — — — oberflächenparallele Lagerung  
 der neugebildeten Lamellen LXII  
 541.  
 — Ringabszeß LXVI 237.  
 — Ringinfiltrat LXVI 248.  
 — — bei Chrysarobinanwendung LXVI  
 249.  
 — — s. auch Kerat. centr. und paren-  
 chym. annul.  
 — Ruptur LXI 432.  
 — Salzgehalt LXIII 324.  
 — Sensibilität bei Glaukom LXVI 386,  
 393, 400.  
 — Staphylom, Abtragung, sympath.  
 Entzündg nach LXI 372.  
 — — anat. Befund LXIV 314, 815,  
 LXIX 24.  
 — — Entstehung LXVIII 379.  
 — — Sekundärglaukom bei, Iridek-  
 tomie LXIV 402, 411.  
 — Temperatur LXIV 485.  
 — Transplantation, bei ektatischer  
 Hornhautnarbe LXVII 93.  
 — — totale LXIV 580.  
 — — — Bedeutung der Beschaffen-  
 heit des zu operierenden Auges  
 LXIV 589.  
 — — — — der Operationsmethode  
 LXIV 588.  
 — — — — des Pfropfmateriells LXIV  
 587.  
 — — — — Indikation LXIV 590.  
 — — — — Methode LXIV 581.  
 — — — — nachträgliche Trübung LXIV  
 584.  
 — — — — — durch das Kammer-  
 wasser LXIV 584.  
 — — — — — durch mangelhafte Er-  
 nährung LXIV 586.  
 — — — — Vaskularisation LXIV 585.  
 — — — — Voroperation LXIV 591.  
 — Trübungen durch Alaun s. Alaun-  
 trübung.  
 — — angeborene, Ätiologie LXIV 235,  
 LXV 324, LXVI 245, LXVIII 379.  
 — — — bei Hydrophtham. LXVI 256.  
 — — — — nach Zangenentbindung LXVI  
 255.  
 — — — — durch Blei s. Bleitrübung.  
 — — — — nach der Geburt LXIV 225,  
 230.  
 — — — — — Aufhellung LXIV 235.  
 — — bei Glaukom, Einfluß von Eserin  
 und Skopolamin LXVI 401.  
 — — bei Irideremie LXX 84.



**Cornea**, Trübungen, durch Kalk s. Kalktrübung.  
 — — — durch Kupfer s. Kupfertrübung.  
 — — — metallische, Aufhellungsmittel LXIII 348, 386.  
 — — — Entstehungsweise LXIII 319.  
 — — — Zusammensetzung LXIII 346, 385.  
 — — — parenchymatöse, nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 267.  
 — — — nach elektrolyt. Zerlegung des Kammerwassers LXVI 342, 363.  
 — — — bei Glaukom LXVI 386, 411.  
 — — — nach Injektion von elektrolyt. dargestellt. Eisen in die vordere Kammer LXVI 375, 393, 399.  
 — — — Wiederaufhellung LXII 531, 541.  
 — — — durch Quecksilber s. Quecksilbertrübung.  
 — — — nach Röntgenbestrahlung LXVI 111, 112.  
 — — — und Sehschärfe, Mißverhältnis zwischen, Ursache LXIV 308.  
 — — — durch Silber s. Silbertrübung.  
 — — — nach Thyreoidinfütterung LXI 503.  
 — — — Ursache von Astigmatismus LXX 155.  
 — — — — Myopie LXX 154, 162.  
 — — — durch Zink s. Zinktrübung.  
 — — — Tuberkulose LXI 191, LXII 491, LXIX 241, 242, 243.  
 — — — Formen LXI 191.  
 — — — Häufigkeit der LXI 193.  
 — — — bei Haustieren LXI 210.  
 — — — — Formen LXI 210.  
 — — — — Pathogenese LXI 210.  
 — — — knötchenförmige LXI 192, LXII 525.  
 — — — parenchymatöse LXI 191, LXIX 244.  
 — — — primäre LXI 193.  
 — — — sklerosierende LXI 192.  
 — — — Tuberkulinkur LXIX 241, 242, 243, 248.  
 — — — Ulcus intern. bei Hydrophthalm. cong., mikr. Befund LXVIII 376.  
 — — — e Lagophthalmo LXII 127.  
 — — — lymphomatöses LXII 184, 187.  
 — — — perforierendes, Neuritis optie. bei LXVI 440.  
 — — — — patholog. Anatomie LXVI 440, 442, 443.  
 — — — — sympath. Entzdg. nach LXI 372, 435.  
 — — — Ursache von Polarkatarakt LXVI 437.  
 — — — serpens, Fälle LXVI 298.

**Cornea**, Ulcus serpens. Glaukom nach perforiertem LXIII 549, LXVI 329.  
 — — — Mikroorganismen LXII 219, LXIV 289, LXVI 317.  
 — — — patholog. Anatomie LXIV 288.  
 — — — Phagoeytose bei LXV 292, 293.  
 — — — durch Pneumokokken. Veränderungen nach Keratotomie LXV 292.  
 — — — Selbstheilung LXV 288.  
 — — — Therapie: Kauterisation LXVI 296, 314, 319.  
 — — — — Resultate LXVI 321.  
 — — — — Lichttherapie LXVI 295, 298.  
 — — — — Anwendungsweise LXVI 318.  
 — — — — Indikation LXVI 297.  
 — — — — — und Kauterisation LXVI 310, 317.  
 — — — — — Narbenbildung nach LXVI 315.  
 — — — — — bei Perforation LXVI 307, 317.  
 — — — — — mit Querspaltung LXVI 307.  
 — — — — — Resultate LXVI 321.  
 — — — — — Vorteile LXVI 315.  
 — — — — — Wirkungsweise LXVI 314.  
 — — — — — mit Sonnenlicht LXVI 323.  
 — — — — — Spaltung nach Sämisch LXV 291.  
 — — — — — Heilwirkung LXV 292, 296.  
 — — — — — wechselnder Charakter LXVI 296.  
 — — — — — tuberculosum LXI 193.  
 — — — Verdickung bei Glaukom LXVI 385.  
 — — — Verhalten bei Iristuberkulose LXI 216.  
 — — — Wachstum LXVII 35.  
 — — — Wirkung von Röntgenstrahlen auf die LXVI 111, 112.  
 — — — Wölbung, Vermehrung durch Muskel- druck LXV 30.  
 — — — Wunden, Klaffung der LXVIII 529.  
 — — — Wundheilung LXII 534.  
**Corpora amylacea** s. Amyloidkörper- chen.  
**Corpus genicul.** s. Kniehöcker.  
**Corpus quadrigem** s. Vierhügel.  
**Corynebakterien**, Pathogenität LXII 217.  
**Cox'sches Gemisch**, Fixierung der Retina im LXIV 243.  
**Cuneusstiel**, Sehstörung nach Verlet- zung des LXII 346.

**Cuneusstiel**, Sitz des Makulazentrums LXII 345.

**Cuticula**, Begriff LXVII 331.

**Cyanosis**, blaue Färbung bei, Erklärung LXVIII 224.

— Hyperglobulie LXVIII 225.

— Krankheitsbild LXVIII 177, 184.

— Pathogenese LXVIII 208.

— Sektionsbefund LXVIII 188.

**Cyanosis oculi** LXVIII 227.

**Cyanosis retinae**, Änderung der Irisfarbe bei LXVIII 181, 187, 218.

— — cas. LXVIII 185.

— — Exophthalmus bei LXVIII 185.

— — Glaukom bei LXVIII 180, 219.

— — Häufigkeit LXVIII 178.

— — Herzfehler LXVIII 182, 189, 224.

— — Kasuistik LXVIII 178.

— — mikr. Befund LXVIII 192.

— — ophthalm. Befund LXVIII 183, 186, 227.

— — Pathogenese LXVIII 214, 227.

**Cyklitis** mit Knötchenbildung LXI 187.

**Cyklodialyse**, Ablösung der Chorioidea nach LXVII 501, 514.

— Erfolge LXVII 487, 504.

— bei Glaukoma absolutum LXVII 489, 519.

— — acutum LXVII 507.

— — hämorrhag. LXVII 517.

— — inflammat. chron. LXVII 511.

— — secund. LXVII 531.

— Heilung nach LXVII 501.

— bei Hydrophthalm. cong. LXIII 239, 245, LXVII 528.

— Indikationen LXVII 490.

— — Drucksteigerung nach Staroperation LXVII 493.

— — Linsenluxation in den Glaskörper LXVII 492.

— — Primärglaukom LXVII 493.

— — Sekundärglaukom LXVII 491.

— intraokularer Druck nach LXVII 487.

— — Komplikationen LXVII 479.

— — Abfluß des Kammerwassers LXVII 485, 514.

— — Ablösung der Descemetis LXVII 480, 498, 509.

— — Glaskörperprolaps LXVII 485, 530.

— — Iridodialyse LXVII 482, 507.

— — Kammerblutung LXVII 479, 508, 513, 517, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 535.

— — Netzhautblutungen LXVII 489, 511, 513.

— — Verletzung des Canal. Schlemmii LXVII 483.

— — — der Iris LXVII 485.

— — mikr. Befund LXVII 496, 498, 500.

**Cyklodialyse**, Miotika nach LXVII 488.

— Nachbehandlung LXVII 486.

— — narbige Verwachsung nach LXVII 502.

— — Operationsmethode LXVII 476.

— — Schmerzhaftigkeit LXVII 480, 536.

— — Wirkungsweise LXVII 487, 500.

— — Kommunikation zwischen vord. Kammer und Suprachorioidealraum LXVII 501.

**Cyklophorie** s. Rollung.

**Cyklopie**, atypische LXVIII 271.

— Exkavation der Papille bei LXVIII 246, 264.

— Experimentelles LXVIII 272.

— mikr. Befund LXVIII 244, 251, 260, 263.

— Pathogenese LXVIII 268.

— patholog. Anatomie LXVIII 242.

**Cysten** des A., Einteilung LXVIII 494.

— — s. auch Endothel-, Epithel- und Pseudocysten.

— des Ciliarkörpers LXVIII 8.

— der Iris LXVI 53.

— der Oberlider, Entstehung LXVII 256.

— der Retina LXIII 73, 82.

— der Tränendrüse s. Dakryops.

— des Tränensacks, Therapie LXVII 110.

## D.

**Dakryocystitis** mit Fistel, permanente Drainage LXVII 110.

**Dakryops**, Arten LXI 342.

— Charakter LXI 349.

— Differentialdiagnose LXI 347.

— doppelseitiger LXI 350.

— fistulöser LXI 346.

— Größe LXI 346.

— Häufigkeit LXI 339.

— Inhalt LXI 340, 343, 346.

— Kasuistik LXI 342.

— klin. Befund LXI 339, 346.

— mikr. Befund LXI 340, 347.

— Operation LXI 340.

— Pathogenese LXI 348.

— Sitz LXI 346.

— Tränensekretion bei LXI 346.

— Veränderungen der Tränendrüse bei LXI 341, 348.

**Dämmerungsapparat** LXV 365, 414.

— Prüfungsmethode LXV 366.

**Dämmerungssehen**, exzentrische Fixation im LXV 379.

— bei über- und unterschwelligem Reizen LXV 382.

**Demodexmilben**, Nachweis und Darstellung LXIX 501.

**Demodexmilben**, pathogene Bedeutung LXIX 494.  
 — und Trachom LXIX 496, 517.  
 — Veränderungen der Lidhaut und des Lidrandes durch LXIX 497.  
 — — — — — circumskripte LXIX 498.  
 — — — — — diffuse LXIX 504.  
 — — — — — Unterschied von Sykosis LXIX 497.  
**Demodexräude** der Hunde LXIX 518.  
 — — — pustulöse LXIX 520.  
 — — — squamöse LXIX 519.  
**Depigmentierung** LXII 265.  
**Dermoid** der Cornea, Diff.-Diagn. von Dakryops LXI 347.  
 — epibulbäres LXIII 38.  
 — und Teratom, Unterschied LXIII 14, 16.  
**Dermoidbildung** in einer epibulbären Mißbildung LXIV 195.  
**Dermoidcyste** der Orbita, Erklärung LXIII 16.  
 — der Ovarien, Erklärung LXIII 14.  
**Dermolampe** LXVI 290.  
**Dezentrierung** des Auges LXX 570.  
**Diabetes insipidus** bei Hypophysistumor LXX 343.  
 — — bei Parotitis epidem. LXX 259.  
**Diabetes mellitus**, Myopie bei LXV 35.  
 — — bei Parotitis epidem. LXX 271.  
**Diaschisis** LXII 366.  
**Diffusionsfähigkeit** von Amylodextrin LXII 104.  
 — von Glykogen LXII 103.  
 — der Haloidsalze von Alkalimetallen LXII 92.  
**Diktyome** LXVIII 548.  
**Dilatator pupillae** LXII 263, 547, LXIV 141, 143, 150, 594, LXV 172, 362, 429.  
 — bei anthropoid. Affen LXII 265.  
 — Entwicklungsgesch. LXIV 149, LXV 430, LXVIII 2.  
 — beim Schwein LXVIII 22.  
 — epithelialer Ursprung LXIV 152, LXV 430.  
 — Fehlen bei Irideremie LXX 68.  
 — Myogliafibrillen LXIV 154.  
 — beim Schaf LXX 419, 434, 439, 483.  
 — und Sphinkter, Vergleich der Leistung LXIV 363.  
 — vasomotorische Wirkung LXIV 349.  
 — Verstärkungen LXX 408.  
 — Zusammensetzung LXIV 152.  
 — s. auch Bruch-Henle'sche Membran und Muskelepithelblatt.  
**Dioptrik** des aphakischen Auges LXV 19.  
 — der Retina LXII 41.

**Diphtheriebazillen** bei Conj. diphth. LXVII 168.  
**Diphtherietoxin**, Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 80, 81, 82, 83, 85.  
 — — — — — Hornhautkomplikationen LXVIII 92.  
 — — — — — Inkubationszeit LXVIII 91.  
 — — — — — Instillationszeit LXVIII 89.  
**Diplobacillus** Morax-Axenfeld, Toxinwirkung auf die Conjunct. LXVIII 81.  
**Diprosopus**, Anencephalie bei LXVIII 259, 266.  
 — Entstehung LXVIII 265.  
 — tetraphthalmus LXVIII 262.  
 — triophthalmus LXVIII 258.  
**Dissection** der Katarakt bei Hydrophthalm. cong. LXIII 246.  
**Dispersion** der Retina LXII 40.  
**Distichiasis**, Entstehung LXVI 528.  
**Distraktionssichel** LXVII 423.  
**Divergenz**, absolute, bei Orthophorie LXII 412.  
**Doppelbilder**, paradoxe LXVII 453, 462.  
**Doppelmesser** von Manolescu LXIII 561.  
**Doppeltsehen**, monokulares LXVII 452, 468.  
**Drainage**, permanente, der Tränenabflußwege LXVII 87.  
 — — — — — Gefahren LXVII 116.  
 — — — — — Indikationen LXVII 110.  
 — — — — — Methode LXVII 93, 104, 112.  
**Dreifachsehen**, binokulares LXVII 449, 453, 466.  
**Druck** im Canal. Schlem. LXIV 4.  
 — im Intervaginalraum und Ventrikelsystem LXV 97.  
**Druck, intraokularer**, Antagonist des Ciliarmuskels LXX 134.  
 — — und Blutdruck LXIV 465, 470, 475.  
 — — Einfluß der Cyklodialyse LXVII 487.  
 — — — der Miotika, Erklärung LXVI 419.  
 — — — der Mydriatika, Erklärung LXVI 419.  
 — — — des Sympathikus LXIV 454, 472.  
 — — — des Trigeminus LXIV 451, 454, 472.  
 — — — auf die Kammerwassersekretion LXIV 468.  
 — — — auf die Narbenbildung der Hornhaut LXII 541.

**Druck, intraokularer, Einfluß auf die Netzhautzirkulation LXI 297.**

- — — auf die Volumszunahme und Formveränderung d. A. LXIV 124.
- — — auf das Wachstum intraokul. Tumoren LXIII 478.
- — — Herabsetzung bei Ablösung der Chorioidea LXVII 501.
- — — nach Cyklodialyse LXVII 507, 517, 532.
- — — nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 268.
- — — bei Keratokonus LXVII 31.
- — — Meßmethode LXIV 13.
- — — bei Pseudogliom LXX 122.
- — — Steigerung, infolge Epithelauskleidung der vord. Kammer LXVIII 530.
- — — Fehlen bei Obliteration des Kammerwinkels LXIX 266.
- — — bei Hornhautnarben LXIX 254.
- — — nach langdauernder Hornhautentzündung LXIX 257.
- — — bei Linsenluxation LXX 469.
- — — bei Myopie LXIII 536.
- — — bei Obliteration des Kammerwinkels, Entstehung LXIX 267.
- — — bei Phakokele LXVII 43.
- — — bei vorderer Synechie LXIX 254.
- — — nach Unterbindung des Optikus LXIV 516, 525.
- — — in der Schädelhöhle und Rückgrathöhle LXV 90.
- — — Steigerung ohne Liquor LXV 93.
- — — s. auch Hirndruck.
- — — in der vorderen Kammer und im Glaskörper LXIV 29.
- — — in den Vortexvenen LXIV 5.

**Druckblindheit, Einfluß auf die Verschmelzungsfrequenz LXVII 157.****Druckdifferenz zwischen Vorderkammer und Glaskörper LXV 37.**

- — — und Venen LXIV 4.

**Druckexkavation s. Exkav.****Druckgesetz für Kapillarröhren LXIX 403.**

- für kommuniz. Röhren LXIX 398.

**Druckschwankungen des A., elastische Nachwirkung bei LXIV 87, 126.****Drusen der Bowman'schen Membran LXIII 506.**

- der Chorioidea LXI 301, LXIII 477, LXIV 182, LXV 192, 210, LXX 117.
- — — Entstehungsarten LXIII 477.
- der Macula LXIX 376.
- der Papille LXIX 353.

**Drusen der Papille, diagnost. Bedeutung LXIX 379, 385.**

- — — Doppelseitigkeit LXIX 378.
  - — — Entwicklungsstadien LXIX 374.
  - — — Geschlecht LXIX 385.
  - — — Gesichtsfeld LXIX 357, 359, 386.
  - — — hereditäre Disposition LXIX 384.
  - — — Kasuistik LXIX 362.
  - — — klin. Bild LXIX 373.
  - — — Lebensalter LXIX 384.
  - — — mikr. Befund LXIX 362, 363, 367, 368, 369, 372.
  - — — ophthalm. Befund LXIX 356, 357, 359, 361, 374, 377.
  - — — Pathogenese LXIX 379, 382, 385.
  - — — primäre und sekundäre LXIX 374.
  - — — Prognose LXIX 387.
  - — — Sehvermögen bei LXIX 385.
  - — — Verhalten der Zentralgefäße LXIX 387.
  - — — Vorkommen bei: Atroph. n. opt. LXIX 381.
  - — — Chorioretinit. LXIX 380.
  - — — — syphil. LXIX 381.
  - — — — glaukomatöser Exkavation LXIX 381.
  - — — — Iridochorioidit. suppurat. LXIX 381.
  - — — — Läsion d. A. LXIX 381.
  - — — — Neuritis optica LXIX 381.
  - — — — Retinit. albumin. LXIX 381.
  - — — — Retinit. pigment. LXIX 380.
  - — — — Schädelverletzungen LXIX 381.
  - — — — Stauungspapille LXIX 381.
  - — — — Wachstum LXIX 378.
  - der Retina LXIX 376.
  - — — — Pigmentschicht LXIII 504.
- Drüsen, acino-tubulöse, in einer epibulbären Mißbildung LXIV 197, 203, 212, 217.**
- Entwicklungsgesch. LXIV 210.
  - histologische Prüfung der Funktionstätigkeit von LXIV 205.
- Dunkeladaptation LXV 367.**
- Befund an den Nervenzellen der Ret. bei LXIII 95.
  - Einfluß des Brucins LXV 308.
  - — des Santonins LXI 531, LXV 312.
  - — des Strychnins LXV 307.
  - Empfindlichkeitszuwachs LXV 368.
  - foveale und parafoveale LXV 369, 380, 415.

- Dunkeladaptation** Kurve LXV 369.  
 — — monokulare und binokulare LXV 371.  
 — — Lichtreizschwelle, Gleichheit auf beiden Augen LXV 313.  
 — — Intervall. zw. Auftreten und Verschwinden LXV 315.  
 — — Lokalisation LXI 529.  
 — — räumliche Verschiedenheit LXV 371.  
 — — Reizaddition, binokulare LXI 529, 544, LXV 314, 371, 414.  
 — — — Erklärung LXV 372.  
 — — bei Schielenden LXV 372, 373, 414.  
 — — bei Strabismus LXV 372.  
 — — Typen LXI 528, LXV 375.  
 — — — Einfluß der Pigmentierung LXI 543, LXV 376.  
 — — Unabhängigkeit des einzelnen A. LXI 530.  
 — — zeitlicher Verlauf LXI 526.  
 — — Zusammenhang mit den Typendifferenzen des Farbensinnes LXI 528.  
**Duplizitätstheorie** LXV 365, 370, 414.  
**Dura**, Trägerin des Hirndrucks LXV 92.  
**Dysenterie**, Erreger der LXVIII 159.  
**Dysenterieinjektion** beim Kaniichen, Wirkung LXVIII 168.  
 — — — Conjunctivit. LXVIII 170.  
 — — — Epiphora LXV II 168.  
 — — bei der Katze, Wirkung LXVIII 165.  
 — — — Conjunctivit. LXVIII 82, 159, 165.  
 — — — Epiphora LXVIII 162, 165.  
**Dysenterietoxin**, Herstellung LXVIII 163.

## E.

- Echinococcus** im Seiten- und 4. Ventrikel LXV 82.  
 — — Stauungspapille bei LXIX 443.  
**Edinger-Westphal'scher Kern** s. Mediantkern, kleinzellig.  
**Ehrlich'sche Fluoresceinlinie** LXIV 481, 495.  
 — — Einfluß der Hornhauttemperatur LXIV 496.  
 — — Erklärung LXIV 483, 492.  
 — — postmortale LXIV 492.  
 — — bei verschiedenen Tieren LXIV 498.  
**Eichhörnchen**, Gudden'sche Kommissur beim LXVII 79.  
**Einbettungsmethode** des hochgrad. myopischen Auges LXVII 389.  
 — — der Retina LXIII 93, LXIV 240.  
**Einüben** neuer Bahnen und Rindenteile LXII 369.

- Eisenbahnbedienstete**, Bedeutung der Hyperopie für LXIX 108, 124.  
 — — Sehschärfe LXIX 106.  
**Eisenbogenlicht** zur lokalen Lichttherapie LXVI 290.  
**Eisenhämatoxilin**färbung des Hornhautendothels LXVII 7.  
**Eisenreaktion** XVI 377.  
 — — des Pigments LXI 225.  
**Eisensplitter**-Verletzung LXII 201, LXIV 290, 294, 302, 312, 316, 581, LXV 58, LXVI 124, 127, LXIX 2 LXX 482.  
**Eiweiß**, Diffusion in die Linse LXII 108.  
 — — Rolle bei Hornhauttrübung durch Blei LXIII 330.  
 — — — — — Kalk LXIII 323.  
 — — — — — Kupfer LXIII 336.  
 — — — — — Quecksilber LXIII 344.  
 — — — — — Silber LXIII 333.  
 — — — — — Zink LXIII 339.  
**Ektoderm**, Verbindung mit dem Mesoderm LXV 251.  
**Ektropium** des Pupillarrandes (Uveae) LXI 25, 64, 87, 111, 118, 124, 135, 275, 282, 288, LXIV 160, 164, LXV 187, 190, 197, LXX 118, 119.  
 — — bei anthropoid. Affen LXII 262, 551.  
 — — physiologisches LXIV 352.  
 — — — Abnahme in Mydriasis LXIV 361.  
 — — — Bedeutung LXIV 352.  
 — — — Entwicklungsgesch. LXVIII 23.  
 — — — Erklärung LXIX 355.  
 — — — Verhalten des Sphinkters LXIV 352.  
 — — — Zunahme in Miosis LXIV 361, LXVIII 28.  
 — — sarkomatös u. s. luxurians LXIII 314.  
**Elastische Fasern** der Cornea LXVII 22.  
 — — in der Iris LXIV 340, 346.  
 — — in den Irisgefäßen LXIV 344.  
 — — im Lidrand LXVI 548.  
 — — und Muskelfasern. Unterschied in der Kontraktion LXIV 374.  
 — — im Narbengewebe des Keratokonus LXVII 3.  
**Elastisches Gewebe**, Entwicklung LXV 260, LXVII 354, 356.  
 — — Färbemethode LXI 229, 230, 242, LXVII 356.  
 — — im Kammerwinkel, Entwicklungsgesch. LXIII 441, 445, 446, 448, LXVII 355.  
 — — in Orbitopalpebralcyste LXVIII 308.  
 — — in den Optikuscheiden LXV 87.

**Elastisches Gewebe** in den Optikuscheiden, Vermehrung bei Glaukom LXVI 384.

— der Sklera LXI 238.

— — — bei Emmetropie LXI 231.

— — — bei Myopie LXI 227, 231, 235, 237.

— bei Sklerose der Arter. centr. ret. LXI 19.

— der Zentralgefäße der Retina LXI 13.

**Elastische Nachdehnung** LXIV 8.

**Elastische Nachwirkung** bei Druckschwankungen LXIV 87, 126.

**Elastoide Fasern** LXVII 23.

**Elektrische Bogenlampen** zur künstlichen Beleuchtung LXIX 73.

— — Spektrum der LXIX 57.

— Glühlampen zur künstlichen Beleuchtung LXIX 73.

— — Spektrum der LXIX 56.

— Leitfähigkeit des Auges LXIX 126, 139.

— — und Dissoziation der Elektrolyten LXIX 127.

— — des Kammerwassers LXIX 131.

— — — Einfluß des Eiweißgehaltes LXIX 138.

— — — des Kokains LXIX 132.

— — — der Temperatur LXIX 136.

— — des Serums LXIX 137.

— — — Einfluß des Eiweißgehaltes LXIX 137.

**Elektrischer Strom**, Ort der Reizwirkung auf d. A. LXVII 158.

— Wirkung auf das Sehnervenende LXIX 428.

**Elektrolyse** des Kammerwassers, Glaukom nach LXVI 341, 356.

— — — Obliteration des Kammerwinkels nach LXVI 362.

— Wirkung auf das Kaninchenauge LXVI 360, 372.

**Embolie** der Chorioidealarterien s. Chorioid.

— der Zentralarterie s. Art. centr. ret.

**Embryonale Zellvermehrung**, Gesetz der LXVIII 542.

**Embryonen**, Härtung und Färbung LXIX 195.

**Embryontoxon** LXX 66.

**Emmetropie**, elastische Fasern der Sklera bei LXI 231.

— Entstehung LXX 132, 199.

— Hornhautradius LXX 138.

— Kammertiefe LXX 140.

— Zerstreuungskreise bei LXV 22.

**Emmetropisierung** LXX 131, 169, 195.

**Encephalocoele** der Orbita LXIII 17.

**Endarteriitis** der Arter. centr. ret. LXI 58, 116, 131, 140, 270, 278, 300, LXIV 159, 162, 167, LXVII 192.

— der Chorioideal-Arterien LXI 160, 163.

— obliterans bei Mikrophthalmus LXI 353, LXIII 41.

**Endophthalmitis** LXI 365, 394, 415, 437, LXX 473, 477.

— Mikroorganismen LXI 449.

— und sympathisierende Entzdg. LXI 427, LXV 135, LXX 467, 470, 476.

— Ursachen LXI 427, 430.

**Endothel** und fibrilläres Bindegewebe LXVI 371.

— und Thrombus LXI 25, LXVI 371.

— der Vorderkammer, Phagocytose LXVI 363, 366.

— — Proliferation LXVI 366, 409.

**Endothelcysten** des A., Begriff LXVIII 495.

**Endotheliom** der Iris LXIX 81, LXX 332.

— des groß. Keilbeinflügels LXV 449.

— Prognose LXX 336.

**Endothelogene Bindegewebsneubildung** LXVI 369, 412.

**Ente**, Glaskörperentwicklung LXV 228.

**Entfernungsschätzung**, Rolle der Akkommod. und Konverg. bei der LXVI 488.

**Entfernungsunterschiede**, Wahrnehmung und Vorstellung LXI 484, LXIII 460, LXVI 487.

**Entoptische Fovea** LXII 17, 52, LXV 521, 530.

— Macula LXII 17, 54, LXV 513, 521.

— — Nachbilder der LXII 17, LXV 531.

— Schatten LXII 54.

**Entropium** des Pupillarrandes LXIV 360, LXVI 386, 415.

**Entropium spasticum**, Rolle des Riolan'schen Muskels bei LXVI 546.

**Entwicklungsgeschichte** des Auges LXIII 24, LXV 168, LXVI 207, 219, LXVIII 4, LXIX 196.

— — beim Kaninchen LXV 168.

— — bei der Katze LXV 168, LXVIII 18.

— — beim Schwein LXV 230, 235, LXVIII 21.

— der Augenbrauen LXVI 567.

— der Basalmembran der Chorioidea LXVII 322, 352.

— des Ciliarkörpers LXVIII 8, 17.

— der Cilien LXVI 556, 558, 561, 567.

— der Conjunctiva LXIX 213.

— des Dilator pupill. LXIV 149.

**Entwicklungsgeschichte der Drüsen** LXIV 209.

- der Fovea centralis LXV 167, 168.
  - des Glaskörpers LXV 221, LXVI 222.
  - Größenwachstum des A. LXVIII 335.
  - der Iris LXIII 437, 438, LXVIII 5, 33.
  - der Kapillarschicht der Chorioidea LXVII 353.
  - der kollagenen und elastischen Substanz LXVII 354.
  - der Lider LXIX 213.
  - des Lidrandes LXVI 555, 567.
  - der Linse LXV 236, 239, 248.
  - des Linsendurchmessers LXVIII 337.
  - der Meibom'schen Drüsen LXVI 559, 560, 562, 563, 564, 565, 568.
  - der Moll'schen Drüsen LXVI 560, 562, 564, 565, 566, 567.
  - des Musc. levat. palpebr. LXIX 201, 205, 206, 207, 209, 211, 218.
  - — orbicularis LXVI 567, LXIX 201, 205.
  - — — rect. sup. LXIX 205, 211.
  - — — Rioli LXVI 559.
  - der Netzhautgefäße LXX 448.
  - der Optikus-Nervenfasern LXV 214.
  - der knöchernen Orbita LXIV 211.
  - der Pars cil. ret. LXIX 156.
  - des Pupillarrandes LXVIII 23.
  - der Pupillenweite LXVIII 337.
  - des Retinapigmentblattes LXVIII 4.
  - des Sphinkter pupill. LXIII 437, 438, 440, LXV 430, LXVIII 1, 5.
  - der Tenon'schen Kapsel LXIX 205, 206, 207, 218.
  - der Tränendrüse LXIV 209, LXIX 193.
  - — bindegewebiger Teil LXIX 218.
  - — Drüenschläuche LXIX 212.
  - — erstes Auftreten LXIX 213.
  - — interglanduläre Membran LXIX 206, 219.
  - — Lidpartien LXIX 209, 222.
  - — Orbitalpartie LXIX 209, 222.
  - Tränenröhrchen bei Säugetieren LXII 379.
  - der Vorderkammer LXIII 430.
  - der Zeiß'schen Drüsen LXVI 560, 567.
  - der Zonula Zinnii LXV 169, 259, LXVIII 8.
- Entzündung**, intrauterine, Ursache von Mißbildungen LXIV 215, 219.
- durch Lymphstauung LXIX 344.
  - Rolle der Plasmazellen bei d. LXIII 47.

**Entzündungstheorie** LXI 424.**Enucleatio bulbi**, Geschichtliches LXVIII 475.**Enucleatio bulbi**, bei Irissarkom LXIX 99.

- Nachblutung LXI 58.
- — Gelatine bei LXII 169.
- bei sympathischer Entzündung LXI 433, 451, LXII 200.
- — — Reizung LXI 432.

**Enzym** im Kammerwasser LXII 108.**Epignathus**, Einteilung LXIII 11.

## — Erklärung LXIII 11.

**Epilepsie**, Entstehung durch Refraktions- und Gleichgewichtsstörungen LXII 418, 419, 424, 429.**Epiphora** nach Injektion von Dysenterietoxin Celli bei der Katze LXVIII 162.

## — — — — — Kruse beim Kaninchen LXVIII 168.

## — — — — — bei der Katze LXVIII 166.

**Epithelcyste** d. A. Begriff LXVIII 494.

- — kongenitale LXVIII 494.
- — traumatische LXVIII 494.
- — sklerokorneale LXVIII 513, 516.
- der Vorderkammer, Entstehung LXVIII 315.
- — mikr. Befund LXVIII 512, 517.

**Epithelinsenkung** und Cystenbildung i. A. LXVIII 495.

- Folgen LXVIII 530.
- — Drucksteigerung LXVIII 530.
- — bis auf die Hinterfläche der Iris LXVIII 521, 522.
- — — — — der Linse LXVIII 526.
- in das Irisgewebe LXVIII 531.
- ins Parenchym der Cornea, mikr. Befund LXVIII 500.
- Umwandlung in Bindegewebe LXII 535.
- Ursachen LXVIII 527.
- Veränderungen des Epithels LXVIII 531.

## — — — Becherzellen LXVIII 532.

## — — — Nekrose und Degeneration LXVIII 532.

## — — — Pigmentierung LXVIII 532.

## — Vorbedingungen LXVIII 528.

## — in die Vorderkammer, mikr. Befund LXVIII 505.

## — an den Wundrändern, mikr. Befund LXVIII 496.

## — Zusammenhang mit d. Bindegewebe LXVII 320.

**Epitheloide Zellen**, Entstehung LXI 380, 390.

## — in hämorrhag. Lymphomen LXVII 74.

## — bei idiopath. Iridochorioiditis LXIX 176, 180.



**Epitheloide Zellen** bei Iristuberkeln LXVI 33.  
 — bei Iritis LXIII 547.  
 — Pigmentbildung in LXI 383.  
 — und Plasmazellen LXIII 65.  
 — bei proliferierend. Chorioiditis LXI 437.  
 — bei sympathisierend. Entzdg. LXI 380, 388, 390, 397, LXV 139.  
 — Umwandlung in Bindegewebe LXI 412.  
 — in Riesenzellen LXI 384.  
 — Wanderfähigkeit LXI 391.  
**Epithelzellen**, Sitz von Protozoen LXIX 541.  
**Erde**, Verletzung des A. durch LXVI 305.  
**Ermüdung**, Einfluß auf die Adaptation LXV 393.  
**Erythroopsie**, Rolle der Fluoreszenz der Netzhaut LXV 538.  
 — — der ultravioletten Strahlen LXV 59, 60, 62, 457.  
**Eserin**, Wirkung bei experiment. Glaukom LXVI 401, 407.  
**Enle**, Sehgelb im lebenden Auge der LXIII 148.  
**Euphosglas** LXIX 69.  
**Eversio** n. optici LXVII 365.  
**Exkavation der Papille**, atrophische LXVIII 126, 150, 381.  
 — — Begriff LXIV 330, LXVIII 389.  
 — — mikr. Befund LXIV 328.  
 — bei Cyklopie, durch Fehlen der Nervenfasern LXVIII 246, 264.  
 — glaukomatöse, Drusen der Papille bei LXIX 381.  
 — — Entstehung LXIV 310, 322, LXVI 389, LXX 103.  
 — — frühzeitige LXIV 292.  
 — — mikr. Befund LXI 23, 62, 109, 117, 131, 141, 273, 281, LXXXIV 168, 292, 311, 315, 316, 317, 319, 320, LXVI 349, 388, 398, 407, LXX 97.  
 — — bei Optikusatrophie, mikr. Befund LXI 285, LXIV 313.  
 — — röhrenförmige Vertiefung LXX 98.  
 — — Verschwinden LXIII 534, LXVII 516.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 489, 494, 513, 519, 524, 534, LXVI 173, 175, 178.  
 — bei Myopie LXV 529, 536, LXVII 403.  
 — bei intraokul. Tumoren LXIII 78.  
 — physiologische, Bindegewebswucherung in der LXVIII 141, 151, 153, 194.

**Exkavation der Papille**, physiologische, mikr. Befund LXVIII 130, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144.  
 — — Typen: große LXVIII 148.  
 — — — kleine trichterförmige LXVIII 147.  
 — — — zylindrische der lateralen Papillenhälfte LXVIII 147.  
 — — Verlauf der Optikusfasern LXVIII 128.  
 — — Zustandekommen LXVIII 128.  
**Exenteratio bulbialis** Prophylaxe gegen sympath. Entzdg. LXI 450.  
**Exophthalmus**, Beziehung zum Hirndruck LXIX 409.  
 — bei Chlorom LXII 132, 150.  
 — bei Cyanosis retinae LXVIII 185.  
 — bei Druck auf das Sehnervenende LXIX 422.  
 — bei Drucksteigerung im Tenon'schen Raum LXIX 408.  
 — bei Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 452, 455, 460.  
 — bei Optikustuberkulose LXI 216.  
 — bei Orbitalphlegmone LXI 461.  
 — bei Orbitaltumoren LXIII 9.  
 — bei Parotitis epidem. LXX 270.  
 — nach Schieloperation LXVIII 473, 478, 479.  
 — bei Skleritis poster. LXIV 381, 382.  
 — nach Thyreoidinfütterung LXI 503.  
**Experimentelles**: Alauntrübung der Hornhaut LXIII 340.  
 — Bleitrübung der Hornhaut LXIII 330.  
 — Conjunctivitis durch Diphtherietoxin LXVIII 87.  
 — — durch Gonokokkentoxin LXVIII 95.  
 — — durch Staphylokokkentoxin LXVIII 100.  
 — — durch Toxin von Bakterium coli commune LXVIII 105.  
 — Cyklopie LXVIII 272.  
 — Degeneration der Netzhaut und des Sehnerven LXIV 249.  
 — elektrische Leitfähigkeit des A. LXIX 128.  
 — Embolie der Art. centr. ret. LXIII 394, 396.  
 — endogene Augentuberkulose LXVI 9, 28.  
 — Flüssigkeitswechsel LXIV 456.  
 — Glaukom LXVI 325.  
 — Kalktrübung der Hornhaut LXIII 323.  
 — Kammerwasserfiltration LXIV 9.  
 — Keratitis parenchym. LXII 493.  
 — Keratomyces aspergill. LXV 420.

**Experimentelles: Knötcheniritis** LXVI 81.

- Lichttherapie bei Augenerkrankungen LXVI 276.
- Naphthalinstar LXVII 275.
- Netzhautablösung LXX 487.
- periodische Netzhautreizung durch elektr. Ströme LXVII 151.
- — — durch Licht LXVII 158.
- Pupillenverengung auf Lichtreiz LXV 108.
- Star, angeb., bei Kaninchen LXV 326.
- Stauungspapille, Pathogenese der LXVI 502, LXIX 410, 417.
- Strömung in der vorderen Kammer LXIV 486.
- sympathische Entzündung LXIII 95.
- — — Blutinjektion LXII 204, 210.
- — — Implantation von Gewebstückchen LXII 203, 210.
- — — Injektion von Reinkulturen LXII 212.
- Tränenabfuhr LXIII 201.
- Zinktrübung der Hornhaut LXIII 340.

**F.****Facialislähmung** bei Parotitis LXX 258, 263, 265.**Färbung: Achsenzylinder** LXIV 258.

- Amyloid LXVII 124.
- elastische Fasern LXI 7, 230, LXVII 356.
- Embryonen LXIX 195.
- Ganglienzellen der Retina LXI 504, LXIV 247.
- Gehirnmarkläsionen LXII 312.
- Gehirnschnitte LXII 288.
- Hyalin LXVII 124.
- hyaline Kugeln (Rüssel'sche Körperchen) LXVIII 122.
- Kollagen LXVII 319, 326.
- Lamina elast. chorioid. LXVII 325.
- Marksheiden LXI 7, LXIV 285, 309.
- myopische Augen LXVII 389.
- Nervenzellen der Retina LXIII 85.
- Plasmazellen LXIII 59, LXVIII 116.
- Protoplasma LXVII 318.
- Serienschnitte d. A. LXI 6.
- Thromben LXI 20.
- Tränendrüse LXII 77.

**Färbungsmethode** nach: van Gieson, modif. von Weigert LXIV 248.

- Held LXVII 318.
- Mallory LXVII 319.
- Marchi LXI 506, LXIV 265.

**Färbungsmethode, Nissl** LXI 504, LXIII 85.

- Unna-Pappenheim LXIII 59.

**Farbe** der untergehenden Sonne LXII 42.**Farbenblindheit**, totale, amnestische LXII 288.

- — anatom. Grundlage LXII 372.
- Spektrum LXII 61.

**Farbenfeld** bei Chorioiditis LXV 408.**Farbenhaploskopie** LXII 405.**Farbenhemianopsie** LXX 392.

- Erklärung LXX 393.

**Farbenlichtsinn**, diagnost. Bedeutung LXVI 500.

- Prüfungsmethode LXVI 500.

**Farbenmischungen** im direkten und indirekt. Sehen LXII 60.**Farbenmischungsapparat** von Gullstrand LXII 27.**Farbenmischungsgesetz** für terminales Licht, lokale Unterschiede LXII 25, 72.**Farbenschätzung** im Augenhintergrund, Einfluß der Lichtquelle LXII 2.**Farbensinn**, Begriff LXV 365.

- Einfluß des Brucins LXV 305.
- bei Hydrophthalm. cong. LXIII 220.
- zentraler und parazentraler LXVI 177.

**Farbentheorien** LXII 477.**Farbenwahrnehmung**, Einfluß der Beleuchtung LXV 538.**Farbenzentrum** LXX 394, 399.**Farbige Schatten** zur Prüfung von Blaublindheit LXII 469.**Farbstoff** in der Retina, Bedeutung für den Sehakt LXIII 112.**Farbstoffe**, Diffusion in die Linse LXII 113.**Febris uveo-parotidea subchronica**, Allgemeinerscheinungen LXX 261.

- cas. LXX 254.
- Fieber LXX 261.
- Infektiosität LXX 273.
- Krankheitsbild LXX 273.
- Nasenbluten bei LXX 259.
- Neuritis opt. bei LXX 255.
- Paresen bei LXX 257, 258.
- Parotitis, Dauer der LXX 261.
- Prodrome LXX 261.
- Vergleich mit Parotitis epidem. LXX 260, 273.

**Fensterglas**, Schutzmittel gegen ultraviol. Strahlen LXIX 59.**Fernwirkungen** bei Gehirnläsionen LXII 366.**Ferrieyankallium**, Diffusion in die Linse LXII 98.

- Ferrocyankalium**, Diffusion in die Linse LXII 96.
- Fettdegeneration** der Ganglienzellen der Ret. LXIV 252.  
— Wesen LXX 206.
- Fettgehalt** des Blutes LXX 218.  
— der Pigmentepithelzellen der Ret. LXX 219.  
— der Retina LXX 219.
- Fettinfiltration** bei Niereninfarkten LXX 220.  
— der Retina bei Nephritis LXX 209, 214.  
— — bei Stauungspapille LXX 222.
- Fettkörnchenzellen** LXIV 332, LXX 205, 208, 223.  
— in Gefäßen LXX 217.
- Fetttröpfchen** in Gefäßen LXX 216.
- Fibrin** in Thromben LXI 20.  
— Umwandlung in Bindegewebe LXII 534.
- Fibrinbildung** im Kammerwasser, nach Elektrolyse LXVI 361.  
— — Ursachen LXIV 451.
- Fixalextrakt**-Vergiftung, Neuritis opt. durch LXV 470.  
— — — mikr. Befund LXV 471.
- Filtration** durch die Cornea LXIV 90.  
— durch Membranen, Einfluß vorübergehender Entspannung oder Druckerhöhung LXIV 77.  
— durch Tonfilter, Einfluß vorübergehender Entlastung oder Druckerhöhung LXIV 83.
- Filtrationsmanometer** LXIV 6.  
— Beschreibung LXIV 13.  
— Genauigkeit LXIV 23.  
— Vorbereitung LXIV 16.
- Filtrationsversuche** am Auge, Abnahme des Einlaufs LXIV 7, 72.  
— — — Einfluß vorübergehender Entspannung oder Druckerhöhung LXIV 73.  
— — — der benutzten Flüssigkeit LXIV 58.  
— — — des Orts der Injektion auf die Größe des Einlaufs und der Filtration LXIV 38.  
— — — der Temperatur LXIV 60, 450.  
— — — bei Körpertemperatur am vorher nicht entspannten LXIV 120.  
— — — Verhältnis von Einlauf, Filtrationsmenge und Volumszunahme LXIV 99.
- Fisch**, Graufärbung der Retina im Zwischenstadium der Sehpurpurbleichung LXIII 155.  
— Sehgelb im lebenden Auge vom LXIII 144.
- Flschauge**, Campanula Halleri LXV 165.  
— Faltenbildung der Retina LXV 166.  
— Fehlen der Fovea LXV 166.
- Fixierung** durch Sublimat LXIV 239.
- Fixierungsmethode** der Augen von Föten LXIII 431.  
— der Ganglienzellen der Retina LXIV 239.  
— des Glaskörpers LXX 491.  
— der Iris LXX 410.  
— des Optikus LXIV 281.  
— der Retina LXIII 93, LXIV 239.  
— — in 96% Alkohol LXIV 241.  
— in Birch-Hirschfeld'schem Gemisch LXIV 244, 247.  
— — in Cox'schem Gemisch LXIV 243.  
— — in Flemming'scher Lösung LXIV 242.  
— — in Formol LXIV 242.  
— — in Hermann'scher Flüssigkeit LXIV 243.  
— — nach Marchi LXIV 244.  
— — in Salpetersäure LXIV 242.  
— — mit Sublimat-Kochsalz LXIV 240.
- Flächensarkom** s. Sark., flächenh.
- Flemming'sche Lösung** zur Fixierung d. Retina LXIV 242.
- Flimmerphotometer** LXIX 483.
- Flüssigkeitswechsel** d. A. LXII 520, LXIV 1—127.  
— Einfluß von Eiweiß im Kammerwasser LXIII 549.  
— — des Ligament. pectinat. LXII 271, LXIV 474.  
— — des Skleralsporns LXIII 553.  
— — des Sympathikus LXIV 454.  
— — des Trigemini LXIV 451, 454.  
— bei experiment. Glaukom LXVI 420.  
— s. auch Kammerwasser, Filtration.
- Fluorescein**, Diffusion in die Linse LXII 113, 115.  
— Injektion in den Glaskörper LXII 116.  
— Übertritt ins Kammerwasser bei experiment. Glaukom LXVI 420.
- Fluoresceinhypopyon** LXIV 483.
- Fluoresceinlinie** von Ehrlich LXIV 481.
- Fluoresceinmethode** bei Keratitis parenchym. LXII 482.
- Fluorescenz** von Blutserum LXII 45.  
— der Linse LXII 44.  
— — — bei Einwirkung von ultraviolett. Strahlen LXIX 61, 62, 453.  
— — — — Vorgang LXIX 456.  
— der Retina LXII 43, 72, LXIII 118, LXV 532.  
— des Sehpurpurs LXII 48, 55.  
— des Stäbcheninhalts LXVI 186.

**Fluoreszenzlicht**, Zusammensetzung LXII 57.

**Förster's Photometer** LXV 378, 414.  
— modif. von Koster LXVI 497.

**Fötus**, Anomalien im Bereiche des Sehnerven und der Netzhaut LXIX 463.

— Augenmaße LXIV 225, 230, LXVI 205.

— Conjunctiva, Histologie LXIII 291.

— Iris, Histologie LXVI 219.

— Keratitis und Iritis beim LXIV 224.

— Pupillarmembran LXVI 219.

**Follikel** in der Conjunctiva LXIII 296.

**Fontana'scher Raum** bei anthropoid. Affen LXII 271.

— Funktion LXII 271.

— bei Glaukom LXI 25, 64, 87, 111, 118, 124, 135, 275, 282, 288, 302, LXVI 345, 396, 404.

**Formollösung** als Härtungsmittel LXI 5.

**Fovea centralis**, Abstand von der Papille LXII 273.

— Adaptation LXI 526, LXV 369, 380.

— Dicke der Retina in der LXV 511.

— Differenzierung und Sehschärfe LXX 80.

— entoptische LXII 17, 52, LXV 521, 530, LXVI 156, 162, 180.

— — physiolog. Bedeutung LXVI 187.

— Entwicklungsgesch. LXV 167.

— Farbe LXV 486, 487, LXVI 152.

— Fehlen der LXV 158.

— — im Fischauge LXV 166.

— — bei einem Herero-Albino LXX 80.

— — bei Irideremie LXX 69, 75.

— Größe LXV 486, 504.

— Hemeralopie LXV 370.

— Lichtsinn der LXI 526.

— Lochbildung in der, Befund LXIV 172.

— — Ursachen LXIV 174.

— Nachbild der LXII 17.

— Verschiedenheit des anatom. Baues LXV 523.

— Zapfen. Anordnung LXIV 551.

— — Querschnitt LXIV 552, 565.

**Foveareflex** LXV 504, LXVI 157.

**Foveola** LXV 531, LXVI 157.

**Fremdkörperriesenzellen** LXI 224, LXIV 167, 169.

**Frosch**, Linsenkapselepitheel LXVII 288.

— Sehgelb in der lebenden Retina LXIII 144.

**Fuchs**, Gudden'sche Kommissur beim LXVII 79.

**Fuchsin**, Diffusion in die Linse LXII 115.

**Fusinkristalle** im Auge LXIV 166, 170.

— in den Pigmentepithelzellen der Netzhaut LXX 211.

**Fusionsbestreben**, Innervation beim LXII 412.

**Fusionsbreite**, Bestimmung LXII 411.

— Einfluß der Übung LXII 414.

— Veränderlichkeit LXII 413.

**Fusionszwang**, Ausschaltung LXII 405.

— Einfluß auf die Gleichgewichtslage LXII 402.

## G.

**da Gama-Pinto's Nachstaroperation** LXIII 560.

**Ganglienzellen**, Färbungsmethode LXI 504.

— Fixierungsmethode LXI 504.

**Ganglion ciliare**, Exstirpation bei Glauk. absol. LXIV 453.

— Sekretionszentrum LXIV 453.

**Gasbrenner**, Temperatur des LXVI 11.

**Gaslampe**, Spektrum der LXIX 54.

**Gaumen**, harter, bei Turmschädel LXVIII 422.

**Gammenspritz** bei Hydrophth. cong. LXIII 228.

**Gefäßeinscheidung**, hämorrhagische LXI 264.

**Gefäßerkrankungen** bei Syphilis LXVI 233.

**Gefäßneubildung** LXI 413.

**Gefäßuntersuchungen**, Bedeutung des Querschnitts LXI 7.

**Gehirn**, Kompressionskoeffizient LXIX 397.

— Restitution bei Rinden- und Faserdefekten des LXII 365, 369.

— s. auch Hirn-

**Gehirnbefund** bei doppelseitiger Zerstörung der Optici LXVII 81.

**Gehirnzentren**, Lokalisation der LXII 333.

**Gelatineinjektion** bei Nachblutungen LXII 169.

— Tetanus nach LXII 169.

**Gelbsehen** nach Santonin LXI 531.

**Geschwulstbildungen**, lymphomatöse, in der Orbita und im A. LXIII 30.

**Gesichtsabszeß** bei Orbitalphlegmonen LXI 472.

**Gesichtsfeld** bei Chorioiditis LXV 408.

— Einfluß des Brucins LXV 305.

— — des Strychnins LXV 303, 305.

— gemeinschaftliches, Beziehung zur Kreuzung im Chiasma LXV 102.

— bei Hemeralopie LXV 394.

- Schlaefke, General-Register.

- **Glaskörper, Absorptionsvermögen für ultraviolett. Strahlen LXIX 455.**
- — — — — **des Magnesiumfunken LXVI 287.**
- **Agglutinine im, beim choleraimmunisiert. Tier LXIV 435.**
- **Area Martegiani LXVII 61, 62, 373.**
- **baktericide Substanzen bei nicht immunisiert. Kaninchen LXV 281.**
- — — — — **Einfluß der Blutstauung LXV 284.**
- — — — — **entzündliche Reize LXV 284.**
- — — — — **der Kammerpunktion LXV 284.**
- — — — — **der Punction des A. LXV 283.**
- — — — — **subkonjunkt. Kochsalzinjekt. LXV 284.**
- — **bei nichtimmunisiert. Menschen LXV 286.**
- **Blutungen bei Glaukoma absolut. LXIV 319.**
- — **organisierte LXIV 167.**
- — **bei Tuberkulose des Ciliarkörpers LXI 187, 197.**
- — **bei Verschluß der Zentralvene LXI 110, 118, 133, 274.**
- **Brechungsindex LXV 38.**
- **Druck im Verhältnis zu dem der vord. Kammer LXIV 29, 37.**
- — — — — **Meßmethode LXIV 30.**
- **Einfluß auf die elektr. Leitfähigkeit d. A. LXIX 142.**
- **Eiweißgehalt, Einfluß von Punction und Reizung LXV 287.**
- **Entwicklungsgeschichte LXV 220, LXVI 222.**
- — **Faserentwicklung LXV 244, 248, 256.**
- — **Fasern und Gefäße LXV 249.**
- — **Gefäßentwicklung LXV 247, 249.**
- — **Gerüst LXX 517.**
- — **Regeneration LXX 517.**
- — **Linse LXV 239, 246.**
- — **Protoplasmafäden LXV 225, 228, 232, 239, 246.**
- — **bei der Ente LXV 228.**
- — **beim Kaninchen LXV 245.**
- — **beim Schwein LXV 230, 236, 242.**
- — **beim Triton LXV 228.**
- **Faltung bei Netzhautablösung LXVIII 67.**
- **Fehlen im Mikrophthalm. LXIII 41.**
- **fibrilläre Entartung LXVIII 38.**
- **Fibrillen, neugebildete aus den Zellen der Pars cil. ret. LXX 117.**
- **Ursprung aus dem Ciliarepithel LXIX 149.**

**Glaskörper**, Fibrillen, Ursprung aus dem Gliarung am Papillenrande LXIX 150.  
 — Fixierungsmethode LXX 491.  
 — Gewebsscharakter LXV 252, 283.  
 — Gerinnung und Schrumpfung durch Härtung LXVIII 44, 392.  
 — Grenzhaut LXV 257, LXVIII 72, LXX 281, 296, 303, 312, 496.  
 — — Elastizität LXX 503, 518.  
 — — Rolle bei der Ablat. retin. LXX 516.  
 — Hernie im exkavat. Sehnerven LXX 98, 102.  
 — Kalkkonkrement bei Tuberkulose d. A. LXI 215.  
 — Kern LXVII 371.  
 — Lymphraum LXVII 63.  
 — Membrana hyaloidea LXV 256, 263.  
 — patholog. Anatomie bei: Glaskörperverlust LXX 493, 497, 501, 517.  
 — — — Hydrophthalm. cong. LXIII 489.  
 — — — Mikrophthalm. LXVII 205, 207.  
 — — — Netzhautablösung LXVIII 38, 60, LXX 502.  
 — — — Tuberkulose d. A. LXI 197, 214.  
 — — — Punktion, Einfluß auf die baktericide Kraft des Glaskörpers LXV 283.  
 — — — — — des Kammerwassers LXV 276.  
 — — — Rindenschicht LXVII 370.  
 — — — Rolle bei Augenbewegungen LXVIII 57.  
 — — — Schrumpfung LXI 80, 118, 134, 137, 142, 215, LXX 472.  
 — — — Abreißung der Retina bei LXVIII 50.  
 — — — in Härtungsflüssigkeiten LXVIII 43.  
 — — — bei Netzhautablösung LXVIII 38, 60, 69, 74.  
 — — — — Ursache LXVIII 49.  
 — — — Struktur, normale LXV 220, LXVII 370.  
 — — — beim Fötus LXVI 222.  
 — — — Trübungen bei Retino-chorioid. juxtapapill. LXIX 46.  
 — — — bei Tuberkulose d. A. LXI 187, 197.  
 — — — Tuberkulose LXI 197.  
 — — — bei Haustieren LXI 214.  
 — — — Ursprung aus dem Ciliarepithel LXIX 149.  
 — — — Verbindung mit der Ora serrata LXVII 371.  
 — — — mit der Papille LXVII 371.

**Glaskörper**, Verbindung mit der Retina LXV 243, 248, 254, LXVIII 49, LXX 496.  
 — Verdichtung LXVIII 45, 46.  
 — Verflüssigung LXI 299.  
 — — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 222.  
 — — bei Irideremie LXX 06.  
 — — bei Myopie LXVII 395, 401, 403, 409, 416, 417, LXVIII 47.  
 — — Verlust ohne Ablat. retin., mikr. Befund LXX 493.  
 — — Faltenbildung der Retina nach LXX 494.  
 — — Keulenbildung auf der Innenfläche der Ret. nach LXX 493, 495.  
 — — — bei Myopieoperation LXX 53.  
 — — — Netzhautablösung nach LXX 488.  
 — — — präretinale Pseudomembran nach LXX 493.  
 — — Vorfall bei Cyklo dialyse LXVII 485, 530.  
 — — — und Verlust, Einfluß auf Ablat. retin. nach Myopieoperation LXX 53.  
 — — Zellen, Herkunft LXIX 160, 162.  
 — — — rudimentäre, im vord. Abschnitt LXV 258.  
 — — — Zentralkanal, Arteria hyaloid. bei LXVII 64, 375.  
 — — — — — persistierende LXVII 64.  
 — — — Darstellungsmethoden LXV 261, LXVII 58, 372, 374.  
 — — — Durchmesser LXVII 62.  
 — — — physiolog. Bedeutung LXVII 58.  
 — — — Verlauf LXVII 63.  
 — — — Vorkommen LXV 261, LXVII 59, 375, LXIX 151, 192, LXX 236, 309.  
 — — — Wandungen LXVII 63.  
 — — — beim Kaninchen LXVII 64.  
 — — — beim Rind LXV 261, LXVII 61.  
 — — — beim Schaf LXV 262, LXVII 61.  
 — — — beim Schwein LXV 261, LXVII 61, 374, LXIX 192.  
**Glasmacher**, Katarakt der LXIX 61, 63.  
**Glaukom**, Ätiologie und Pathogenese LXVIII 219, LXIX 9.  
 — — Canal. Schlemmii, Obliteration LXIX 9.  
 — — — vermehrter Eiweißgehalt des Kammerwassers LXIII 549, LXVI 422, LXVIII 220.  
 — — — Kammerwinkel, Verschuß des LXVII 484, LXVIII 220.  
 — — — bei Sarkoma chorioid. LXVI 108.  
 — — — bei Verschuß der Art. centr. ret. LXI 15, 16, 57.  
 — — — — — der Retinagesäße LXI 299.  
 — — — — — der Retinalvenen LXI 120, 284.



**Glaukom**, Ätiologie bei Verschuß der Vena centr. ret. LXI 79, 89, 104, 114, 126, 186, 149, 278, LXIII 420.  
 — — — der Zentralgefäße LXI 269.  
 — — Verwachsung der Pupille LXVI 326.  
 — — Vortexvenen-Erkrankung LXIII 478.  
 — — Zahndurchbruch LXIII 550.  
 — bei Ablatio retinae LXIV 381.  
 — Adaptation, Verhalten der LXV 401.  
 — Bedeutung für den Verschuß der Retinalarterien LXI 289.  
 — Cornea, Abflachung LXVI 385, 400, 402.  
 — — Sensibilität LXVI 386, 393, 400.  
 — — Trübungen LXVI 386, 411, LXIX 32.  
 — experimentelles LXVI 325.  
 — — Bedeutung LXVI 416.  
 — — nach elektrolyt. Zerlegung des Kammerwassers LXVI 341, 356, LXIX 9.  
 — — nach Injektion elektrolyt. dargestellt. Eisens in die vord. Kammer LXVI 373.  
 — — nach Injektion von Tusche in die vord. Kammer LXVI 379.  
 — — sekretorische Vorgänge LXVI 420.  
 — — Übertritt von Hämolsinen in das Kammerwasser LXVI 424.  
 — — nach Unterbindung des Optikus LXVI 326.  
 — — — der Vortexvenen LXVI 325.  
 — — Vergleich mit dem menschlichen LXVI 413.  
 — — nach Verlegung des Kammerwinkels LXVI 327, 330, 413, 415.  
 — — nach Verschuß der vord. Ciliarvenen LXVI 334.  
 — — nach Verwachsung der Pupille LXVI 326.  
 — — Wirkung der Mydriatika und Miotika LXVI 416.  
 — bei Gefäßerkrankungen und Blutungen der Retina LXIV 158, 164.  
 — Geschlecht LXIII 214.  
 — Gesichtsfelddefekt, sektorenförmiger LXIX 47.  
 — bei hämorrhag. Retinitis im myopischen Auge LXI 120.  
 — Hyphäma bei LXI 79, 87, 105, 299.  
 — bei intraokularen Tumoren LXIII 472, 478, LXVIII 232.  
 — bei Irideremie LXX 86.  
 — Kammerwasser, Eiweißgehalt bei LXVI 421.  
 — — Fibringehalt bei LXVI 422.

**Glaukom**, beim Kaninchen, Folgezustände LXVI 380.  
 — — — Buphthalmus LXVI 381, 393, 400, 414.  
 — — bei Linsenluxation LXVII 531.  
 — — bei hochgrad. Myopie LXIII 536.  
 — — patholog. Anatomie LXIII 475, LXVII 498, 500.  
 — — bei experimentellem LXVI 344, 357, 380, 395, 403.  
 — — Chorioides LXI 64, 275, 282, LXVI 349, 386, 398, 405.  
 — — Ciliarkörper LXI 25, 64, 111, 134, 142, 275, 282, 288, 301, LXIII 476, LXVI 348, 398, 405, 421, LXVII 498.  
 — — Cornea LXIII 475, LXIV 319, LXVI 345, 385, 395, 403, LXIX 4, 20.  
 — — — Descemetis LXVI 346, 396, 403, 407.  
 — — — Risse LXVI 347, 386, 391, 396, 401.  
 — — Fontana'scher Raum LXI 25, 64, 87, 111, 118, 124, 135, 275, 282, 288, 302, LXVI 345, 396, 404, LXIX 3, 19.  
 — — Iris LXI 25, 57, 64, 87, 111, 124, 134, 142, 275, 282, 288, 302, LXIII 476, LXIV 319, LXVI 348, 386, 397, 405, LXVII 500.  
 — — Optikus LXVI 349, 388, 399, 407, LXX 105.  
 — — Papille, Exkavation LXI 23, 62, 109, 131, 141, 273, 281, 288, LXVI 349, 388, 398, 407.  
 — — Retina LXIV 311, 313, 315, 316, 317, 319, LXVI 349, 387, 398.  
 — — nach Staroperation LXVII 531, 532.  
 — — nach Ulcus corneae serp. LXIII 549, LXVI 329.  
 — — Therapie, Cyklodialyse LXVII 490.  
 — — Heilungstermin LXIV 393.  
 — — Iridektomie, Ausführung LXIV 407.  
 — — — Austritt der Contenta bulbi nach LXVII 528.  
 — — — blutige Ablösung der Aderhaut nach LXI 90.  
 — — — Dauererfolge LXIV 395, 396.  
 — — Lösung der Iris im Kammerwinkel LXIV 408.  
 — — Miotika LXIV 391, 408.  
 — — operative, Dauererfolge LXIV 391.  
 — — Sklerotomie LXI 57.  
 — — — Ausführung LXIV 407.  
 — — — Dauererfolge LXIV 396, 397, 398.  
**Glaukoma absolutum**, Cyklodialyse bei LXVII 489, 519.

- Glaukoma absolutum**, Exstirpation des Ganglion cil. LXIV 453.  
 — Hyphäma bei LXIV 319.  
 — bei intraokul. leukäm. Tumor LXII 176.  
 — Iridektomie. Dauererfolge LXIV 396, 397.  
 — Keratitis bullosa bei LXIX 3, 10, 19, 25.  
 — — vesiculosa bei LXIX 26.  
 — mikr. Befund LXI 25, LXIV 158, 165, 315, 319, LXIX 3, 19, 25.  
 — Netzhautablösung bei LXIV 158.  
 — Neurektomia optico-cil. bei LXIV 407.  
 — Sklerotomia anterior, Dauererfolge LXIV 396.  
 — — posterior LXIV 407.  
 — Staphyloma sklerae bei LXI 18, 25.  
 — bei Verschuß der Zentralarterie LXI 17.  
**Glaukoma hämorrhagicum**, Bersten des Bulbus bei LXVIII 182.  
 — bei Cyanosis retin. LXVIII 219.  
 — Cyklodialyse bei LXVII 517.  
 — Iris- und Vorderkammerblutung bei LXI 299, 302, 303.  
 — mikr. Befund LXI 300.  
 — Pathogenese LXI 292.  
**Glaukoma inflamm. acut.**, Cyklodialyse bei LXVII 507.  
 — — Dauererfolg der Iridektomie LXIV 395, 410.  
 — — — der vord. Sklerotomie LXIV 396.  
**Glaukoma inflamm. chronic.**, Cyklodialyse bei LXVII 511.  
 — — Dauererfolg der Iridektomie LXIV 396, 406, 410.  
 — — — der vord. Sklerotomie LXIV 397, 406.  
 — — — der Sympathektomie LXIV 397.  
**Glaukoma secundarium**, Cyklodialyse bei LXVII 491, 531.  
 — imminens bei hinteren Synechien, Iridektomie LXIV 404.  
 — Iridektomie. Dauererfolge LXIV 401.  
 — bei Leukoma adhärens und Staphyloma corneae, Iridektomie bei LXIV 402.  
 — nach Linsenextraktion, Punktion der vord. Kammer LXIV 403.  
 — bei Linsenluxation LXI 232.  
 — durch Linsenquellung LXIV 292.  
 — mikr. Befund LXIX 25.  
 — nach perforierend. Hornhautwunden LXI 436.  
 — durch seclusio pupill., Iridektomie bei LXIV 401.

- Glaukoma simplex** und *Atrophia n. opt.*, Diff.-Diagnose LXVI 504.  
 — Dauererfolg der Iridektomie LXIV 398, 406, 410.  
 — — der vord. Sklerotomie LXIV 399, 406, 410.  
**Gleichgewichtslage**, Einfluß des Allgemeinbefindens LXIX 187.  
 — — des Fusionszwanges LXII 402.  
 — — des Zustandes des Akkommodationsapparates LXIX 189.  
 — — — der äußeren Augenmuskeln LXIX 190.  
 — Prüfung, Methoden LXII 405, LXIX 184, 390, 577.  
 — — bei Myopie LXII 402.  
**Gleichgewichtsstörungen**, Einfluß der Ermüdung LXII 404.  
 — latente, Bedeutung für das Allgemeinbefinden LXII 417.  
 — — der verschiedenen Arten LXII 418.  
 — — Häufigkeit LXII 427.  
 — — — bei Asthenop. muscul. LXII 422.  
 — — — bei Neurasthenikern LXII 422.  
 — — — bei Normalen LXII 422.  
 — — Prüfungsmethode LXII 407.  
 — — Ursache von Amblyopie LXII 418.  
 — — — von Asthenop. muscul. LXII 426.  
 — — — von Epilepsie LXII 419, 429.  
 — — — von Migräne LXII 418.  
 — — — von Neurasthenie LXII 428.  
 — — — von Neurosen LXII 418.  
 — scheinbare und wirkliche LXII 401.  
 — strabotische und parastische, Unterscheidung LXII 415.  
 — s. auch Rollung und Vertikalabweichung.  
**Gliedgewebe** und mesodermales Bindegewebe, Färbungsunterschiede LXVIII 295.  
 — in Orbitaleysten LXVII 189, 206, 211, 226.  
**Gliazellen**, Wanderung LXIX 163.  
 — Wucherung im Optikus LXIV 332.  
 — — in der Retina LXIII 3.  
**Gliöse Wucherung** der abgelösten Retina LXIII 503.  
 — im atrophischen Optikus LXVIII 146, 383.  
 — in der atrophischen Retina LXIV 317.  
 — im Mikrophthalmus LXVIII 306, 309.  
**Glioma cerebri** LXV 75.  
**Glioma orbitae**, primäres LXIII 13.

**Gloma retinae**, Heredität LXIX 475.  
 — — im Mikrophth. cong. LXI 352, 360. LXIX 474.  
 — — Pathogenese LXIX 474.  
 — — familiäre Disposition LXIX 475.  
 — — Trauma während der Geburt LXIX 476.  
**Gliosis retinae** LXI 358, 359.  
**Glycerin** zur Aufhellung von Kalktrübungen der Hornhaut LXIII 351.  
**Glykogen** und Amyloid LXVII 142.  
 — Verhalten der Linse gegen LXII 103.  
**Gonokokken**, Nährboden LXVIII 94.  
**Gonokokkentoxin**, Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 81, 82, 92.  
**Gonorrhoe**, toxische Conjunctivitis bei LXVIII 155.  
 — — Dakryoadenitis bei LXVIII 157.  
**Gorilla**, äußere Augenmaße LXII 253.  
 — Chorioidea, Dicke der LXII 259.  
 — Ciliarmuskel LXII 261.  
 — Dilator LXII 265.  
 — Duralscheide, Dicke der LXII 274.  
 — Eintrittsstelle der Zentralgefäße LXII 274.  
 — Fovea-Abstand von der Papille LXII 273.  
 — Hornhaut, Dicke der LXII 255.  
 — — Durchmesser der LXII 254.  
 — — Radius der LXII 255.  
 — Papille, Durchmesser LXII 273.  
 — Retina, Dicke LXII 273.  
 — Sklera, Dicke LXII 257.  
**v. Graefe's Nachstaroperation** LXIII 560.  
**Granolyse** LXIX 499, 507.  
**Gratama's Röhren** zur Entdeckung der Simulation einseitiger Amaurose oder Amblyopie LXIV 502.  
 — verbesserte LXIV 507.  
**Gratiolet'sche Strahlung**, Läsion der LXII 354.  
**Greisenalter**, Miosis im, Erklärung LXIV 366.  
**Größenschätzung**, Lokalisation LXIX 548.  
**Größesehen** LXVI 487.  
**Grünfärbung** bei Chlorom LXII 159.  
**Gudden'sche Kommissur** LXVII 79.  
 — Faserverlauf LXVII 81.  
 — physiolog. Bedeutung LXVII 85.  
 — bei der Ratte LXVII 81.  
 — bei Tieren LXVII 79.  
**Guillery**, Sehprüfung nach LXIV 129, 570, 599.  
**Gullstrand's Farbmischungsapparat** LXII 27.  
 — Photometer LXII 30.

## H.

**Haab'sche Maculadegeneration** LXV 385.  
**Hämoglobin**, Diffusion in die Linse LXII 109, 110.  
**Hämoglobingehalt** bei akuter Lymphomatose LXII 134, 135.  
 — bei Chlorom LXII 153.  
**Hämolyse**, Übergang ins Kammerwasser LXVI 423.  
 — — — bei experiment. Glaukom LXVI 424.  
**Hämolyseinspritzung**, Iridocyklitis nach LXII 528.  
**Hämophthalmus** LXV 208.  
**Hämorrhagie** s. Blutung.  
**Hämorrhagische Diathese**, Augenveränderungen bei LXIV 175.  
 — Ursache der Blutungen LXIV 182.  
**Härtungsmethode** von Embryonen LXIX 195.  
 — zur Entwicklungsgesch. der vord. Kammer LXIII 432.  
 — in Formollösung LXI 5.  
 — der Linse LXV 357.  
 — in steigendem Alkohol LXVII 309.  
 — s. auch Fixierungsmethode.  
**Härtungsmittel**, Veränderungen des Glaskörpers durch LXVIII 44.  
**Haidinger'sche Polarisationsbündel** LXII 20, 56, LXV 539, LXVI 159.  
 — Beobachtung LXII 20.  
 — Durchmesser LXII 21, LXV 541, 543.  
 — Entstehung LXII 21, LXV 540.  
**Hakenfiguren** zur Sehprüfung LXIV 550.  
**Halo glaukomatosus**, Wesen LXVII 384.  
 — senilis, Wesen LXVII 384.  
**Halslymphome** bei Parinaud'scher Conjunctivitis LXIII 53.  
**Harder'sche Drüse** des Kaninchens, Lage und Bau LXII 75.  
 — Sekretion der LXIV 204.  
**Hausmann's Stereokopenbilder** LXI 564.  
**Hausäugetiere**, Tuberkulose des A. bei LXI 152.  
 — — der Augenlider LXI 199.  
 — — der Chorioidea LXI 200.  
 — — des Ciliarkörpers LXI 205.  
 — — der Conjunctiva LXI 199.  
 — — der Cornea LXI 210.  
 — — des Glaskörpers LXI 214.  
 — — der Iris LXI 206.  
 — — der Linse LXI 214.  
 — — des Optikus LXI 213.  
 — — der Retina LXI 211.

**Haussäugetiere**, Tuberkulose der Sklera LXI 209.

— der Uvea LXI 200, 205.

**Hefezellen**, Injektion ins Blut, Conjunctivitis nach LXVIII 173.

**Held'sche Protoplasmafärbung** LXVII 318.

**Helladaptation**, Einfluß auf die Ganglienzellen der Retina LXIII 103, 109.

— — — äußeren Körner LXIII 106, 110.

— — — inneren Körner LXIII 107.

— — — Stäbchen- und Zapfenschicht LXIII 107.

— — — Struktur der Nervenzellen der Retina LXIII 85, 103.

— Reizaddition bei LXV 374.

**Hellapparat** LXV 365, 414.

**Helligkeitsfunktion** LXV 379.

**Hemeralopie**, Adaptationsstörungen bei LXV 393.

— Begriff LXV 367, 393, 415.

— der Fovea LXV 370.

— genuine LXV 393.

— Gesichtsfeld bei LXV 394.

— bei Glaukom LXV 401.

— bei Retinit. punctat. albesc. LXIII 281, 283, 285.

— symptomatische LXV 393, 397.

— Therapie LXV 394.

— Vorkommen LXI 531.

**Hemianopische Pupillenreaktion** LXV 73.

— Pupillenstarre LXX 343, 344, 348, 366, 367.

— — Begriff LXX 371.

— — diagnostische Bedeutung LXX 367, 371.

— — Untersuchungsmethode LXX 369.

— Reflextaubheit LXX 371.

— Skotome LXII 349.

**Hemianopsie**, Adaptation bei, Verhalten der LXV 405, LXX 399.

— Amblyopia ex anopsia bei, Entstehung LXX 380, 399.

— mit Asymbolie, Alexie und Agraphie LXX 359, 360, 361.

— Aussparung der Macula, nachträgliche LXX 358.

— bitemporale LXX 342, 343, 346.

— bei Chiasmaaffektionen LXX 341.

— doppelseitige, Amaurose bei LXII 366, LXX 364.

— — — Erhaltung der Pupillenreaktion LXX 365.

— — — Restitution der zentralen Sehschärfe LXII 346, 371.

— — cas. LXX 363, 365.

**Hemianopsie**, für Farben LXX 392.

— bei Hirntumoren LXII 370, LXV 73.

— mit Halluzinationen LXX 362.

— intracerebrale LXX 352.

— kortikale LXII 323.

— — und unreine LXII 311.

— ophthalmoskop. Verhalten der Papille LXX 378, 399.

— mit Orientierungsstörungen nach Schädelbruch LXX 357.

— Restitution LXX 353, 393.

— Stauungspapille bei LXX 355, 356, 363, 383.

— topische Diagnose LXX 340.

— — — Anisokorie LXX 383, 399.

— — — hemianopische Pupillenstarre LXX 367, 398.

— — — Willbrand's Prismenversuch LXX 372, 398.

— bei Traktusaffektionen LXX 347.

— — Anisokorie bei LXX 383.

— — Differenz der Lidspaltenweite LXX 386, 399.

— — hemianopische Pupillenstarre LXX 370.

— überschüssige Gesichtsfeldpartie LXX 391, 399.

— — — Erklärung LXX 388.

— — — und Sehschärfe LXX 392, 399.

— Verhalten der Pupillen LXX 383.

— s. auch Rindenblindheit.

**Hemikranie** s. Migräne.

**Heredität** bei Hyperopie LXX 196.

— bei Irideremia cong. LXX 77.

— bei Retinit. punctat. albesc. LXIII 285.

**Hermann'sche Flüssigkeit**, Fixierung der Retina in LXIV 243, LXV 527.

**Herpes zoster** bei latent, Vertikalschielen LXII 419.

**Herzbefund** bei Verschuß der Zentralgefäße LXI 17.

**Herzfehler** bei Cyanosis LXVIII 182, 189, 224.

**Heterophorie** LXII 401.

— s. auch Gleichgewichtsstörungen.

**Hirnabszeß**, Stauungspapille bei LXIX 438, 443.

**Hirndruck**, Beziehung zum Exophthalmus LXIX 409.

— Entstehung bei Tumor cerebri LXIX 432.

— Erklärung LXIX 401.

— Fortleitung auf den Scheidenraum des Optikus LXIX 403.

— — auf den Tenon'schen Raum LXIX 407.

— Grenzen LXIX 398.

— Kompensationsstadium LXIX 343.

- Hirndruck**, normaler LXIX 405.  
 — — beim Hund LXIX 406.  
 — — beim Kaninchen LXIX 406.  
 — -Symptome LXIX 406.  
**Hirnhäute**, Verbindung mit dem Auge LXV 71.  
**Hirnpunktion** bei Stauungspapille LXIX 320, 325, 331.  
**Hirnschwellung** LXIX 309, 337.  
**Hirntumor** und Stauungspapille LXIV 536, 537.  
**Hörschiel** s. Vertikalabweichung.  
**Holmgren'sche Wollprobe** LXII 467.  
**Holzsplitter-Verletzung** des A. LXI 234, 441, 443, LXVI 301.  
**Hordeolum**, Rezidive, Ursache LXVI 535.  
 — Schmerzhaftigkeit LXVI 553.  
**Hori's Photometer** LXVI 456.  
**Huhn**, Entwicklung der Tränenröhrchen beim LXII 381, 383.  
**Hund**, Blutdruck in der Femoralis LXIV 469.  
 — Ciliargefäßsystem LXIV 274.  
 — Demodexräude LXIX 518.  
 — Durchschneidung von Ciliararterien, Folgen LXIV 276.  
 — — — Methode LXIV 275.  
 — Ganglienzellen der Retina LXI 505, 513.  
 — Hirndruck, normaler LXIX 406.  
 — Körnerschicht, äußere LXIII 406.  
 — Mikrophthalm. mit Kolobom LXVIII 444.  
 — normaler ophthalmoskop. Befund LXI 512.  
 — Sehstörung durch Thyreoidin LXI 500.  
 — Thyreoidinfütterung LXI 502.  
 — Vorderkammer, Entwicklungsgesch. LXIII 442.  
**Hyalin**, Diagnose LXVII 140.  
 — Färbung LXVII 124.  
 — Verhältnis zum Amyloid LXVII 137.  
**Hyaline Degeneration** der Ciliarfortsätze LXI 111, 118, 275, 282.  
 — des Corneaeppithels bei Kerat. bullosa LXIX 36.  
 — der Irisgefäße LXI 134, 142, 282, 288, LXIV 319, LXIX 175.  
 — der Retinagefäße LXI 109, 281, 284.  
**Hyalinkonkretion** im Optikus LXVIII 192.  
**Hyalin-Kugeln** bei Demodexerkrankung der Lider LXIX 505.  
 — Entstehung LXVIII 122, LXIX 506.  
 — Färbung LXVIII 122.  
 — Formen LXIX 506.  
**Hyalin-Kugeln** im Plasmom der Conjunct. LXVIII 116.  
 — — — der Cornea LXVIII 121.  
 — bei sympathisierend. Entzündung LXI 385.  
**Hyaloldea** s. Glaskörper, Grenzhaut.  
**Hydatid** der Tränendrüse LXI 342.  
 — — — Kasuistik LXI 343.  
**Hydrocephalus int.**, Fehlen bei Stauungspapille LXIX 333.  
 — Myopie bei LXV 93.  
 — Pathogenese LXV 91.  
 — Sektionsbefund LXV 86.  
 — Stauungspapille bei LXV 75, 86, 91, LXIX 441, 443.  
 — und Syphilis LXVI 257.  
**Hydrodiaskop** LXV 32.  
**Hydrophthalmie** und deletäre Myopie, Identität LXIII 527.  
 — — — Unterschied im Bau des vorderen Augenabschnittes LXIII 527, 530.  
 — — — — in der Dicke der Sklera LXIII 527.  
**Hydrophthalmus acquisitus** des Kaninchenauges bei Glaukom LXVI 381, 393, 400, 414.  
 — Pathogenese LXIII 206.  
 — Verhalten der Cornea und Sklera LXI 228.  
**Hydrophthalmus congenitus**, Ätiologie und Pathogenese LXIII 207, 225, 431, 539, 555, LXVII 183.  
 — — Angioneurose LXIII 208, 230.  
 — — Canalis Schlemmii, Fehlen des LXIII 554.  
 — — — — Verlagerung und Verengung LXIII 553.  
 — — Chorioiditis LXIII 540.  
 — — Entzündung des vord. Augenabschnittes LXIII 542, LXIV 236.  
 — — Filtrationshindernis LXIII 548.  
 — — patholog. Bau der Abflußwege LXIII 550.  
 — — Persistenz des Ligam. pectinat. LXIII 551.  
 — Abortivformen LXIII 532, 533.  
 — Angelucci'sches Symptom LXIII 231.  
 — Astigmatismus pervers. LXIII 220.  
 — Beginn LXIII 212, 529.  
 — Diagnose LXIII 209.  
 — Druckerabsetzung, semiotische Bedeutung LXIII 225.  
 — Ein- und Doppelseitigkeit LXIII 215.  
 — Entwicklung aus einer Kerat. parenchym. LXIII 209, 211.  
 — Exkavation der Papille LXIII 489, 494, 513, 519, 524, 534.

**Hydrophthalmus congenitus**, Exkavation der Papille, Bedeutung LXIII 533.

- Farbensinn LXIII 220.
- Geschlecht LXIII 214.
- Gesichtsfeld LXIII 220, LXVII 178, 175.
- Glaskörperabhebung LXIII 222.
- Glaskörpervergütung LXIII 222
- Häufigkeit LXIII 215.
- Heredität LXIII 225.
- Hornhautradius LXIII 216, LXVII 172, 177.
- Hornhauttrübung LXIII 209, 210.
- Hornhautvergrößerung LXIII 530.
- Hyperopie bei LXIII 534, LXVII 172, 184.
- bei Irideremie LXX 86.
- Kammerwinkel LXIII 238, LXVI 414.
- Kasuistik LXIII 246.
- Katarakt bei, Behandlung LXIII 246.
- — Discission LXIII 246.
- — primäre Linearextraktion LXIII 246.
- klimatische Einflüsse LXIII 215.
- Komplikationen: Ablatio retin. LXVII 172.
- — Elephantiasis LXIII 228.
- — Gaumenspalte LXIII 228.
- — Iriskolobom LXVIII 447.
- — Korektomie LXIII 227.
- — Linsenkolobom LXIII 227.
- — Linsenluxation LXIII 277.
- — Mikrognaethie LXIII 228.
- — Polydaktylie LXIII 228.
- — Rhachitis LXIII 230.
- — Konsanguinität LXIII 226.
- — Lichtscheu LXIII 209, 210.
- — Lichtsinn LXIII 220.
- — Lues als Ursache LXIII 211, 228.
- makroskop. Befund LXIII 482, 490, 496, 505, 514, 520.
- Maße des Bulbus LXIII 482, 491, 496, 505, 514, 525, 526.
- mikr. Befund: LXIII 483, 491, 497, 506, 515, 521, LXVIII 447.
- — Canal. Schlemmii LXIII 238, 486, 492, 495, 500, 508, 517, 522.
- — Chorioidea LXIII 489, 494, 503, 509, 518, 523.
- — Ciliarfortsätze LXIII 488, 493, 502, 509.
- — Ciliarmuskel LXIII 488, 493, 501, 509, 518, 523.
- — Conjunctiva LXIII 483, 491, 497, 506, 515, 521.
- — — Cornea LXIII 483, 491, 495, 497, 507, 515, 521.
- — — Epithel LXIII 483.

**Hydrophthalmus congenitus**, mikr. Befund: Descemetis LXIII 485, 491, 498, 507, 516, 521.

- — — Verdickung LXVI 409.
- — — Glaskörper LXIII 489.
- — — Iris LXIII 487, 494, 500, 508, 517, 523.
- — — Kammerwinkel LXIII 486, 492, 495, 499, 516, 522, 535.
- — — Ligament. pectin. LXIII 238, 493.
- — — Linse LXIII 489, 502, 509.
- — — Optikus LXIII 489, 494.
- — — Retina LXIII 489, 494, 502, 511, 518.
- — — Sklera LXIII 487, 492.
- — — Sklerasporn LXIII 487, 499.
- — — Sphinkter pupill. LXIII 488.
- — — Trabecul. corneo - sklerale LXIII 487, 493, 499, 508, 516, 522.
- — — Vortexvenen LXIII 496, 541.
- — — Zonula Zinnii LXIII 489, 509, 518.
- Muskelansätze, Abstand vom Hornhautrand LXIII 483, 497, 506, 515, 525, 526.
- — Breite der LXIII 497, 506, 515, 526.
- Myopie bei LXIII 217, 534, 535, LXVII 72, 173, 175, 176, 177, 184.
- Netzhautablösung LXIII 221, 223, 269.
- Netzhautrisse LXIII 222, 503, 510.
- neuropathische Belastung LXIII 232.
- Nystagmus LXVII 175.
- ophthalmoskop. Befund LXIII 535.
- Pulsfrequenz LXIII 231.
- Refraktion LXIII 215, 534.
- Sehvermögen LXIII 220, 535, LXVII 179.
- Selbstheilung LXIII 241.
- Sklera, Dicke der LXIII 205, 487, 492, 495, 499, 508, 534.
- — elastische Fasern LXI 238, LXIII 487, 492, 508.
- Stadien LXIII 532.
- Staphylocoma posticum bei LXIII 218.
- Theorien: Glaukom durch Angioneurose LXIII 208, 230.
- — — durch Mißbildung des Ligam. pectin. LXIII 328.
- — — durch Verschluß des Kammerwinkels LXIII 207.
- — Riesenwuchs LXIII 205.
- Therapie: Cyklodialyse LXIII 239, 245, LXVII 528.
- — — Einscheidung des Kammerwinkels LXIII 237.
- — Iridektomie LXIII 234, 244, LXVII 180, 182, 530.



**Iridektomie**, Dauererfolge bei Glaukoma secund. LXIV 401, 411.

- — — simpl. LXIV 398, 406, 410.
- Einfluß auf hämatogene Iristuberkulose LXVI 35.
- bei Glaukom, Ausführung LXIV 407.
- bei Hydrophthalmus LXIII 234, 244, LXVII 180, 182, 530.
- bei Irisgeschwülsten LXX 336.
- bei Irissarkom LXIX 94.
- sympath. Entzündung nach LXI 372.
- bei Uveitis chronica LXVI 48.

**Irideremia cong.** LXX 65.

- Amblyopie bei LXX 77.
- — Ursache LXX 79, 82.
- Begriff LXX 71.
- Glaukom bei LXX 86.
- Heredität LXX 77, 84.
- Hornhauttrübungen LXX 84.
- Hydrophthalmus bei LXX 86.
- Katarakt bei LXX 82.
- Kleinheit der Linse LXX 83.
- Lageanomalien der Linse LXX 83.
- Lichtscheu LXX 82.
- mikr. Befund LXX 66.
- Nystagmus bei LXX 65, 77.
- — Ursache LXX 79.
- Theorien, mechanische LXX 71.
- — Entwicklungshemmung der Retina LXX 74, 82.
- Verwandtschaft mit Albinismus LXX 81.

**Iridochorioiditis**, experiment. Übertragung LXII 222.

- metastatische, Pathogenese LXII 215.
- — nach Pneumonie LXII 225.
- — durch Staphyloc. albus LXII 223.
- — suppurativa, Drusen der Papille bei LXIX 381.

**Iridocyclitis**, s. auch Uveitis.

- chronica spontanea, Befund ähnlich dem der sympathisierenden Entzündung LXI 446, LXIX 172.
- nach Hämolysineinspritzung LXII 528.
- durch Kontusion LXV 187, 208.
- luetica, Erkrankung der Cornea bei, Pathogenese LXII 523.
- — Verhalten des Hornhautendothels LXII 522.
- nach Nachstaroperation LXIII 559.
- — — durch Blutungen LXIII 559.
- bei Parotitis LXX 255, 256, 258, 264, 283.
- pathologische Anatomie LXIII 502, LXV 192.

**Iridocyclitis**, Phthisis bulbi bei LXI 376.

- Punktion der vord. Kammer bei LXIX 436.
- bei Sarkom der Chorioidea LXI 373, 428, LXIX 288.
- traumatica, Hornhauterkrankungen bei LXII 528.
- — mikr. Befund LXI 415.
- — und sympathisierende Entzündung LXV 141.
- Tuberkulinprobe bei LXVI 70.
- tuberculosa LXVI 2.
- — Erkrankungen der Cornea bei LXII 524.
- — Keratitis parenchymat. bei LXII 488.
- — Neutuberkulin bei LXVI 93.

**Iridodonesis** bei Hydrophthalmus LXVII 175.

**Iris**, Altersveränderungen LXIV 366.

- Anämie bei Elektrolyse des Kammerwassers LXVI 342, 352.
- bei anthropoid. Affen LXII 261.
- Atrophie bei Glaukom LXI 25, 64, 87, 111, 134, 142, 275, 282, 288, 302, LXIV 315, 317, 319, 320.
- — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 267, 271, 274, 277, 278, 279.
- — nach Injektion von elektrolytisch dargest. Eisen in die vord. Kammer LXVI 376.
- — bei vord. Synechie LXIX 262.
- Bindegewebauflagerung LXIV 160.
- Bindegewebsring LXIV 343.
- Bindegewebsstränge in der LXI 401.
- Blutung in die, bei Glaukom LXI 301, 303.
- Ciliarsporn LXV 431, LXVIII 17.
- Cyste LXVI 53.
- Dicke LXIV 340.
- — bei verschiedener Pupillenweite LXIV 348.
- Dilatorleisten LXX 409, 424.
- doppelte bei Cyklopie LXVIII 250.
- elastische Fasern LXIV 340, 346.
- Endothel, glashäutige Neubildung des LXVI 370.
- — Wucherung LXVI 365.
- Endothelium, s. d.
- Entwicklungsgeschichte LXIII 437, 438, LXVIII 5, 33.
- — bei der Katze LXVIII 18.
- — beim Schwein LXVIII 21.
- Epithel, Geschwulst LXVIII 577.
- — Schichten LXII 263, 269, 550, 551, LXIV 147, 151, 430.
- — — Verschiebungen LXIV 150.
- Faltenbildung der Hinterfläche beim Kaninchen LXX 408.



**Iris**, Faltenbildung der Hinterfläche beim Schaf LXX 408.  
 — Farbe bei Neugeborenen LXVIII 33.  
 — Farbenänderung bei Cyanosis ret. LXVIII 181, 187, 218.  
 — Filtration durch die LXVI 363.  
 — Flächenraum LXIV 347.  
 — fötale LXVI 219.  
 — — schollige Gebilde in der LXIV 228.  
 — Fuchs'scher Sporn LXV 431.  
 — Gefäße, Elastizität LXIV 344.  
 — — hyaline Degeneration LXI 134, 142, 282, 288, 302, LXIV 319, LXIX 175.  
 — — Intimawucherung LXVIII 359.  
 — — Neubildung LXI 354, 389.  
 — — Obliteration LXI 401, 444.  
 — Gerüstwerk LXIV 343.  
 — Geschwülste, Iridektomie bei LXIX 94, LXX 336.  
 — — s. Endothel., Perithel., Sarkom etc.  
 — Gleichgewichtszustand LXIV 343.  
 — Grenzsichten, hintere LXII 547, LXIV 141, 146, 594, LXV 172, 362, 429.  
 — — — mikr. Technik LXII 550.  
 — — — vordere LXIV 369.  
 — Hyperämie und Verfärbung nach der Geburt LXIV 225.  
 — Karzinom LXIX 79.  
 — Klumpenzellen der LXV 428, LXVIII 6, 252, 303.  
 — — Abkunft LXV 431, 435, LXVIII 18 LXIX 80.  
 — — Beziehung zur Irisfarbe LXV 437.  
 — — bei Bildungsanomalien LXV 436.  
 — — Häufigkeit LXV 437.  
 — — Pigmentierung LXV 433.  
 — — beim Schwein LXVIII 22.  
 — — Knickung LXVIII 61, 67.  
 — Kontraktionsfurchen LXIV 367.  
 — Krypten, Entwicklung LXVIII 31.  
 — leukämische Infiltration LXII 173.  
 — Maße beim Kaninchen LXVI 348.  
 — Melanom beim Katzenembryo LXVIII 20.  
 — Michel'scher Sporn LXV 431.  
 — Muskelapparat beim Schaf LXX 407.  
 — Muskelepithelblatt, s. d.  
 — Muskelfasern, zirkuläre und radiäre, Vergleich der Leistung LXIV 363.  
 — Muskelnetz, Wirkungsweise LXIV 365.  
 — Myom LXVIII 21.  
 — Nekrose bei intraokul. leukäm. Tumor LXII 173.

**Iris**, der Neugeborenen LXVIII 265.  
 — Ödem LXVIII 61.  
 — patholog. Anatomie bei: Cyanosis retin. LXVIII 199.  
 — — — Eisensplitterverletzung LXV 61.  
 — — — Glaukom LXI 25, 57, 64, 87, 111, 118, 134, 142, 275, 282, 288, 302, LXIII 476, LXIV 319, LXVII 500.  
 — — — experimentelles LXIV 348, 386, 397, 405.  
 — — — Hornhautfistel LXX 93.  
 — — — Hydrophthalmus cong. LXIII 487, 494, 500, 508, 517, 523.  
 — — — Irideremie LXX 67.  
 — — — Iridocyclitis spontanea LXIX 174, 180.  
 — — — traumatica LXI 389, 415, LXV 190.  
 — — — tuberculosa LXVI 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62.  
 — — — Iritis serosa traumat. LXI 440, 442, 444.  
 — — — Keratitis parenchymat. LXII 486, 510, 514, 517, LXVI 219.  
 — — — Keratoiritis beim Fötus LXIV 228.  
 — — — Mikrophthalmus cong. LXI 353, LXIII 40, LXVII 203, 213, LXVIII 303, 431.  
 — — — Röntgenbestrahlung LXVI 113.  
 — — — Sarkom LXIX 76.  
 — — — sympathisierend. Entzündung LXI 387, 414, LXV 140.  
 — — — Tuberkulose der Iris LXVI 32, 51.  
 — Peritheliom LXIX 81, LXX 332.  
 — Pigmentarten LXV 433.  
 — Pigmentblatt, Einrollung LXV 433.  
 — — — Häufigkeit LXV 436.  
 — — — Entwicklung LXVIII 7.  
 — Pigmententwicklung LXVIII 7.  
 — Pigmentierung im Affenauge LXII 261.  
 — Pigmentnävi LXV 437.  
 — Pigmentsporn LXIV 144, LXV 429, LXVIII 12.  
 — — ciliarer LXV 431.  
 — — Fuchs'scher LXV 431, LXVIII 14.  
 — — Häufigkeit LXV 436.  
 — — Michel'scher LXV 431, LXVIII 6, 12, 34.  
 — — — Fehlen bei der Katze LXVIII 20.  
 — Pigmentzellen, Einwanderung ins Stroma LXV 437, LXVIII 6, 16.

- Iris**, Pigmentzellen, Umwandlung in Muskelzellen LXVIII 13, 16.  
 — Randwulst LXIX 256.  
 — Ringsinus, embryonaler LXVIII 9.  
 — Ruhestellung LXIV 347.  
 — — beim Schaf LXX 415.  
 — Sarkom, s. d.  
 — Schichten, Gleiten der, bei Pupillarbewegungen LXIV 367.  
 — Spaltung in 2 Blätter LXIII 501, LXIV 351.  
 — Speichenbündel LXIV 371, LXV 430, LXVIII 13.  
 — — pigmentierte LXV 432.  
 — Stroma, ektodermale Zellen im LXIX 79.  
 — Stromazellen, Innervation LXVIII 29.  
 — — Pigmentierung LXV 433, LXVIII 28, 32.  
 — — unpigmentierte LXVIII 29.  
 — — — Entstehung LXVIII 30.  
 — Stromazellnetz LXIV 341, 350, 359.  
 — Strukturfalten LXX 408, 423.  
 — Temperatur LXIV 485.  
 — Tuberkulose LXI 187, LXIX 85, 88, 90, 236, 237, 238, 240, 246.  
 — — abgeschwächte LXI 188.  
 — — Abkapselung LXI 208.  
 — — Formen LXI 188.  
 — — Granulationsgeschwulst LXI 189.  
 — — bei Haustieren LXI 206.  
 — — — histolog. Eigentümlichk. LXI 208.  
 — — — klinische Symptome LXI 216.  
 — — — knötchenförmige LXI 207.  
 — — — — tumorartige LXI 207.  
 — — — — Wachstum LXI 207.  
 — — beim Kaninchen, Einfluß der Iridektomie LXVI 35.  
 — — — experimentelle LXVI 29.  
 — — — Keratitis parenchymat. bei LXVI 34.  
 — — — Knötchen, Sitz der LXVI 29.  
 — — — — Verlauf der LXVI 30.  
 — — — patholog. Anatomie LXVI 32.  
 — — klinische Erscheinungen LXI 188.  
 — — knötchenförmige LXI 189.  
 — — primäre LXI 187.  
 — — Riesenzellen bei LXI 189, 208.  
 — — sekundäre LXI 188.  
 — — Tuberkulinkur LXIX 236, 237, 238, 240, 246.  
 — — Verhalten der Cornea LXI 216.  
 — — Verlauf LXI 187.  
 — Veränderungen bei der Pupillenreaktion LXIV 362.
- Iris**, Veränderungen bei der sympathisierenden Entzündung LXI 386.  
 — Verbindung mit dem Trabeculum corneo-sklerale LXIII 449, 509, LXX 85.  
 — Verglasung der Oberfläche LXV 188, 196.  
 — — Herkunft LXV 197.  
 — Verholzung LXIV 366.  
 — Verwachsung mit der Cornea LXVIII 358.  
 — Vorderfläche, Quelle des Kammerwassers LXIV 448.
- Irisbewegung**, Gleiten der Irisschichten LXIV 367.  
 — Kontraktionsfurchen LXIV 367.  
 — Mechanik der LXIV 339—379.  
 — — beim Schaf LXX 413, 446.  
 — Muskelnetz, Wirkungsweise LXIV 365.  
 — physiolog. Ektropium des Pupillerrandes LXIV 352.  
 — — — Abnahme in Mydriasis LXIV 361.  
 — — — Zunahme in Miosis LXIV 361.  
 — postmortale Pupille, Erklärung LXIV 347.  
 — Pupillarzone, vorwiegende Beteiligung LXIV 373.  
 — Querschnittsänderungen des Sphinkters LXIV 370.  
 — Sphinkter und Dilatator, Vergleich der Leistung LXIV 363.  
 — vasomotorische Wirkung des Dilatators LXIV 349.  
 — Vershmälerung und Verdickung der Iris, Mißverhältnis LXIV 347.  
 — Zeitdifferenzen in der LXIV 374.
- Irisfortsätze** LXIII 449, LXVII 8.  
**Irisriß** LXII 246.
- Iriswurzel** und Descemetis, Verbindung LXIII 449, 508, LXX 85.
- Iritis** durch Bleinkrustation der Hornhaut LXIII 331.  
 — bei hämorrhagischer Adenie LXVII 75.  
 — knötchenförmige, Ätiologie LXII 219, LXVI 80, 98.  
 — — Diagnose LXVI 82.  
 — — — differentielle LXIV 83, 98.  
 — — experimentelle LXVI 81.  
 — Myopie bei LXV 35.  
 — bei Parotitis epidem. LXX 262.  
 — bei Skleritis posterior LXIV 383, 386.  
 — Tuberkulinprobe bei LXVI 70.  
 — tuberkulosa s. Iris, Tuberkulose.
- Iritis serosa**, Begriff LXI 439.  
 — Beschläge, Ursache der Dreiecksanordnung LXIV 499.

- Iritis serosa**, senkrechte Präzipitatlinie LXIV 499.  
 — traumatica LXI 439, LXX 473.  
 — — durch Kontusion LXI 444.  
 — — mikr. Befund LXI 440.  
 — — mit sympathisch. Entzündung LXX 473.  
 — — Unterschied von der sympathisierend. Entzündung LXI 445.

## J.

- Janiceps** LXVIII 243.  
**Janus asymmetros** LXVIII 243, 248.  
 — symmetros LXVIII 248.  
**Jequirity**, Wirkung auf das Sehnerven-ende LXIX 428.  
**Jodkalium** zur Aufhellung von Bleitribungen der Hornhaut LXIII 377.  
 — Diffusionsfähigkeit LXII 92.  
 — Einwirkung auf die Naphthalinkatarakt LXVII 291.  
 — bei Hydrophthalmus cong. LXIII 233.  
 — bei beginnend. Katarakt LXVII 272, 337, 539.  
 — — — Anwendungsweise LXVII 540.  
 — — — Bäder LXVII 550, 557.  
 — — — Einträufelungen LXVII 556.  
 — — — subkonjunkt. Injektion LXVII 557.  
 — — — Kasuistik LXVII 541.  
 — — — Resultate LXVII 555.  
 — Nachweis LXII 93, 94.  
 — Übergang in die Linse LXII 93, LXVII 284.  
 — — — — Eintrittsstellen LXVII 285.  
**Jodkaliuminjektionen**, subkonj., Dosis LXVII 276.  
 — — Übergang in Glaskörper und Kammerwasser LXVII 276.  
**Jodkaliumkatarakt** b. Frosch LXVII 288.  
**Jodnatrium**, Diffusionsfähigkeit LXII 92.  
 — Nachweis LXII 94.  
 — Übergang in die Linse LXII 93.  
**Jodreaktion** LXV 284.  
**Jodsäure**, Einwirkung aufs Auge LXIII 377.

## K.

- Kadaveröse Veränderungen** der Retina LXIV 179.  
**Kadmiumspektrum** LXVI 291.

- Kalb**, Tuberkulose des A. beim LXI 155.  
 — Ursprung der Zonulafasern LXIX 152.  
**Kaliumjodid** zur Auflösung von Bleikarbonat LXIII 359.  
**Kaliumsalze** zur Auflösung von metall. Hornhauttrübungen LXIII 349.  
**Kalkablagerung** in der Bowman'schen Membran LXIV 326.  
 — in den Ganglienzellen der Retina LXIV 159.  
 — in der Linse LXI 354, LXV 190, LXVII 207, 213, LXVIII 302.  
**Kalkkonkrement** im Glaskörper bei Tuberkulose des A. LXI 215.  
 — in Iristuberkeln LXI 208.  
 — Verschluß der Zentralarterie durch LXI 70.  
**Kalkspieße** in der Retina LXIV 325.  
**Kalktrübung** der Hornhaut, Aufhellung durch Ammoniumtartrat LXIII 351, 361, 367, 373.  
 — — — — Methode LXIII 376.  
 — — — — durch Chlorammonium LXIII 361, 367, 369, 377.  
 — — — — durch Glycerin LXIII 351.  
 — — — — spontane LXIII 327.  
 — — — — chemische Analysen LXIII 321.  
 — — — — Experimentelles LXIII 323.  
 — — — — durch Calciumkarbonat LXIII 325.  
 — — — — durch Calciumphosphat LXIII 326.  
 — — — — Rolle des Eiweiß LXIII 323.  
 — — — — des Kollagen LXIII 326.  
 — — — — des Mukoid LXIII 327.  
 — — — — der Salze LXIII 324.  
 — — — — Wesen LXIII 319.  
**Kalkverletzung**, Ankyloblepharon nach LXII 82.  
 — totales Leukom nach, cas. LXIV 580, 588.  
 — totales Symblepharon nach LXII 82.  
 — Therapie LXIII 376.  
 — Ulcus corn. serp. nach LXVI 300.  
**Kalomel** bei Hydrophthalm. cong. LXIII 233.  
**Kammer, vordere**, Blutung in die, bei Cyklodialyse LXVII 479, 508, 513, 517, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 535.  
 — — — bei Glaukoma absol. LXIV 319.  
 — — — Druck. Verhältnis zu dem des Glaskörpers LXIV 29, 37, LXV 37.  
 — — — — Meßmethoden LXIV 30.  
 — — — — Endothel, Phagocytose der LXVI 363, 366.

**Kammer, vordere**, Endothel, Proliferation LXVI 366.  
 — — — Entwicklungsgesch. LXIII 430, 439, 440, 443, 444, 446, 448, 450.  
 — — — Kunstprodukte LXIII 432, 440.  
 — — — Literatur LXIII 432.  
 — — — bei Säugetieren LXIII 442.  
 — — — Epithelauskleidung nach Hornhautwunden LXVIII 505.  
 — — — Epithelcyste LXVIII 512.  
 — — — Entstehung LXVIII 513.  
 — — — mikr. Befund LXVIII 517.  
 — — — Fibrinausscheidung bei Iristuberkulose LXI 208, 216.  
 — — — Immunitätsverhältnisse LXIV 413—442.  
 — — — Impfung mit Choleravibrionen LXIV 431.  
 — — — mit Pneumokokken LXIV 417.  
 — — — mit Typhusbazillen LXVI 448.  
 — — — Technik LXVI 32.  
 — — — Injektion von elektrolyt. dargestellt. Eisen in die LXVI 373, 393, 399.  
 — — — von feinkörnigen Massen in die LXVI 379.  
 — — — von Tusche in die LXVI 379.  
 — — — Kommunikation mit der hintern LXIV 354.  
 — — — Mikroorganismen in der, Schicksal LXIV 415.  
 — — — Punktion, blasige Abhebung des Epithels bei LXIII 488, LXVI 405.  
 — — — Einfluß auf die baktericide Kraft des Glaskörpers LXV 284.  
 — — — — — — — des Kammerwassers LXV 274.  
 — — — bei Hydropthalm. cong. LXIII 239, 244, LXVII 183.  
 — — — bei Iridocyclitis LXIV 436.  
 — — — Netzhautablösung nach LXVI 426.  
 — — — Netzhautblutungen nach LXI 297.  
 — — — bei Sekundärglaukom nach Linsenextraktion LXIV 403.  
 — — — Übergang von Hämolyse in das Kammerwasser nach LXVI 424.  
 — — — bei Uveitis chronica LXVI 51.  
 — — — bei Verschuß der Zentralarterie LXI 297.  
 — — — Strömung in der LXIV 481, 499.  
 — — — Einfluß der Wandtemperatur LXIV 489, 497.  
 — — — Wirkung LXIV 500.  
 — — — Temperatur LXIV 485.  
 — — — Tiefe bei Aphakie LXV 37.

**Kammer, vordere**, Tiefe bei Emmetropie, Hyperopie und Myopie LXX 140.  
 — — — Transsudat nach Kontusion LXII 234.  
 — — — Verhalten bei Hornhautfistel LXX 96.  
**Kammerwasser**, Abflußwege LXII 520, LXIV 448. LXVI 363.  
 — — — Absonderung, normale LXIV 1.  
 — — — s. Entstehung, Sekretion.  
 — — — Agglutinine im normalen LXIV 422.  
 — — — bei aktiv immunis. Tieren LXIV 423.  
 — — — — — Vermehrung durch subkonj. Kochsalzinjekt. LXIV 423.  
 — — — bei passiv immunis. Tieren LXIV 424.  
 — — — — — Vermehrung durch subkonj. Kochsalzinjekt. LXIV 425.  
 — — — Antikörperbildung im LXIV 438.  
 — — — Einfluß subkonj. Injektionen von Antigenen LXIV 440.  
 — — — Antitoxingehalt, Vermehrung durch Bestrahlung LXVI 284.  
 — — — baktericide Substanzen bei nicht immunis. Kaninchen LXV 272.  
 — — — — — — — Einfluß der Blutstauung LXV 278.  
 — — — — — — — entzündlicher Reize LXV 277.  
 — — — — — — — der Glaskörperpunktion LXV 276.  
 — — — — — — — wiederholter Punktion LXV 274.  
 — — — — — — — subkonjunkt. Kochsalzinjekt. LXV 276.  
 — — — — — — — der Temperatur LXV 273.  
 — — — — — — — Verhältnis zu dem des Blutserums LXV 275.  
 — — — — — beim nicht immunis. Menschen LXV 278.  
 — — — — — Wirkung LXIV 414, 419, 426.  
 — — — bakteriolytische Fähigkeit des normalen LXIV 427.  
 — — — — — in loco LXIV 429.  
 — — — — — im Tierkörper LXIV 428.  
 — — — — — in vitro LXIV 432.  
 — — — Brechungsindex LXV 38.  
 — — — Cholestearinkristalle im LXIV 500.  
 — — — Einwirkung auf die Hornhaut LXII 520, 529.  
 — — — Eiweißgehalt, beim Fötus LXIV 232.  
 — — — nach Punktion der v. K. LXV 286, LXVI 402.  
 — — — Ursache von Glaukom LXIII 549, LXVI 422.  
 — — — Vermehrung bei experiment. Glaukom LXVI 421.

**Kammerwasser**, Eiweißgehalt, Vermehrung durch Reizung des A. LXV 286.  
 — elektrische Leitfähigkeit LXIX 131.  
 — — — Einfluß des Kokains LXIX 132.  
 — — — der Temperatur LXIX 136.  
 — elektrolytische Veränderungen LXVI 322, 351, 361.  
 — embryonales, Herkunft LXIII 441.  
 — Entstehung LXIV 448.  
 — Enzymgehalt LXII 108.  
 — Fibrinbildung im, nach Kurarevergiftung LXIV 452.  
 — — nach Trigeminiisdurchschneidung LXIV 452.  
 — — nach Trigeminiisreizung LXIV 451.  
 — — Ursachen LXIV 451, 453.  
 — Fibringehalt bei experiment. Glaukom LXVI 422.  
 — Filtration, quantitative Verhältnisse LXIV 449.  
 — Filtrationsversuche LXIV 9.  
 — isotonische Kochsalzlösung LXIV 9, 58.  
 — Menge beim Kaninchen LXV 271.  
 — Regeneration LXIV 1, 449.  
 — Resorption durch die Vorderfläche der Iris LXVI 363.  
 — Sekretion, Einfluß des Blutgel-extraktes LXIV 456.  
 — — des Blutdrucks LXIV 451, 468, 471.  
 — — des intraokul. Druckes LXIV 468.  
 — — — der doppelseitigen Karotisunterbindung LXIV 477.  
 — — — des Sympathikus LXIV 454.  
 — — — des Trigemini LXIV 451, 453, 454.  
 — — Faktoren LXIV 455.  
 — — quantitative Verhältnisse LXIV 450.  
 — Sekretionsmenge LXIV 124, 457, 474.  
 — Übergang von Agglutininen in das LXIV 422.  
 — — — Antikörpern LXIV 414, 419.  
 — — — Reizeinflüsse LXIV 419.  
 — — — Hämolyisin LXVI 423.  
 — — — bei experiment. Glaukom LXVI 424.  
 — Viskosität, Einfluß der Temperatur LXIV 71.  
 — zellige Elemente beim Fötus LXIV 232.  
 — s. auch Flüssigkeitswechsel.

**Kammerwinkel**, Anatomie, beim Kaninchen LXVI 345.  
 — elastische Fasern im LXIII 441, 445, 446, 448.  
 — Entwicklungsgesch. LXIII 430.  
 — glashäutige Neubildung im LXV 188.  
 — bei Glaukom LXI 25, 64, 87, 111, 124.  
 — — — experimentellem LXVI 345, 365, 396, 404.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 238, 486, 492, 495, 499, 516, 522, 535.  
 — bei Irideremie LXX 67.  
 — bei Myopie LXIII 535.  
 — Obliteration, ohne Drucksteigerung LXIX 266.  
 — — nach Elektrolyse des Kammerwassers LXVI 362.  
 — — experimentelle, Glaukom nach LXVI 327, 330.  
 — — bei idiopathischer Iridochorioiditis LXIX 174, 257.  
 — — mikr. Befund LXI 25, 64, 124, 302. LXV 188.  
 — Pigmentinfiltration LXI 353.  
 — und Refraktion LXIII 449.  
 — Veränderungen nach subkonj. Sublimatinjektionen LXVI 338.  
 — Verhalten bei Hornhautgeschwür vor der Perforation LXIX 255.  
 — — — mit frischer Perforation LXIX 258.  
 — — bei perforierender Verletzung der Hornhaut LXIX 268.  
 — — bei Vernarbung der Perforationsöffnung ohne Iriseinheilung LXIX 260.  
 — — bei Vernarbung der Perforationsöffnung mit Iriseinheilung LXIX 261.  
 — Zellinfiltration bei Cyanosis ret. LXVIII 199.  
**Kaninchen**, angeborene Liddefekte nach Röntgenbestrahlung LXV 348, 352.  
 — — Star nach Cholininjektionen LXV 335, 350.  
 — — — nach Röntgenbestrahlung LXV 334, 350.  
 — Arteria centr. ret., Gebiet der LXIII 406, 410.  
 — Atropinmydriasis bei LXV 111.  
 — Auge, Anatomie LXIX 416.  
 — Augenhintergrund, normaler LXVI 37.  
 — Augenmaße LXVI 344, 348, 357, 395, 402.  
 — Augentuberkulose, endogene, experimentelle LXVI 9.  
 — Chininvergiftung LXX 241.

**Kaninchen, Ciliarinjektion beim LXVI 30.**

- Druck, intraokularer LXVI 395.
- Dysenterietoxin-Injektion, Conjunctivitis nach LXVIII 170.
- — — Epiphora nach LXVIII 168.
- — — Erkrankung nach LXVIII 168.
- Empfänglichkeit für Menschen- und Rindertuberkulose LXVI 28.
- Entwicklung des Glaskörpers LXV 245.
- Entwicklungsgeschichte d. A. LXV 168.
- Ganglienzellen der Retina, normale LXIV 261, 264.
- Glandula infraorbitalis LXII 75.
- Glaskörper, Zentralkanal LXV 262, LXVII 64.
- Glaukom, experimentelles LXVI 325.
- Gudden'sche Kommissur LXVII 79.
- Harder'sche Drüse, Lage und Bau LXII 75.
- Hirndruck, normaler LXIX 406.
- Iris, Faltenbildung der Hinterfläche LXX 408.
- Kammer, vordere, Entwicklungsgesch. LXIII 442.
- Kammerwasser, Menge des LXV 271.
- Kammerwinkel LXVI 345.
- Körnerschicht, äußere LXIII 406.
- Kreuzung im Chiasma LXV 102.
- Linsenkapselendothel LXVII 279.
- Linsennaht LXVII 279.
- Mikrophthalmus nach Röntgenbestrahlung LXV 347, 352.
- Narkose des LXIX 418.
- neugeborene, Lebensfähigkeit, Einfluß der Röntgenstrahlen auf die LXV 334.
- — Magen- und Darmblutungen nach Röntgenbestrahlung LXV 334.
- — Widerstandsfähigkeit der Linse LXV 337.
- — Zentralstar durch Formol LXV 333.
- — Optikusdurchschneidung beim LXV 108.
- Retina, Ernährung LXIV 272, LXX 530.
- — experimentelle Ablösung LXX 489.
- — Trübung bei Embolie der Zentralarterie LXIII 409.
- Sehleiste LXVI 263.
- — Purpurfarbe der LXVI 264.
- Tränenrüse, Lage und Bau LXII 75.
- Tränenröhrchen, Anzahl LXII 391.
- — Entwicklung LXII 391.
- Tuberkulose der Conjunct. LXI 199.

**Kaninchen, Tuberkulose, hämatogene, der Chorioidea LXVI 36.**

- — — des Ciliarkörpers LXVI 35.
- — — der Conjunctiva LXVI 45.
- — — der Iris LXVI 29.
- — — der Lider LXVI 46.
- — — der Sklera LXVI 38.
- Verhalten nach doppelseitiger Optikusdurchschneidung LXIV 263.

**Kapillaren der Retina, Pigmentablagerung in den LXIV 182.****Kapillarröhrchen, Druckgesetz für LXIX 403.****Kapillarschlingen der Conjunctiva-Papillen LXIII 292.**

- in erektionsfähigen Karunkeln von Vögeln LXIII 293.
- im Fruchthalter der Batrachier LXIII 293.

**Karbonat, metallische, Auflösungsmittel der LXIII 348, 357.****Karzinom im Irisstroma, Vorkommen LXIX 79.**

- des Oberkiefers LXII 126.
- der Siebbeinzellen und der Orbita LXV 460, 472.

**Katadioptrische Nebenbilder im A. LXX 563.**

- Begriff LXX 563.
- Helligkeit LXX 567.
- Lage LXX 567, 569.
- Störungen LXX 569.

**Katarakt, Blasenzellen LXV 189.**

- Pathogenese LXII 122.
- bei Aderhauttuberkulose LXI 187, 214.
- nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 267.
- bei Glasmachern LXIX 61, 63.
- bei Hydrophth., Behandlung LXIII 246.
- durch Jodkalium LXVII 288.
- bei Irideremie LXX 82.
- durch Kochsalz bei Fröschen LXVII 539.
- bei Naphthalin-Vergiftung LXVII 275, 538.

**Katarakta capsularis, Entstehung LXV 198.**

- mikr. Befund LXV 189, LXVII 10, LXIX 176.

**Katarakta congenita bei Kaninchen, experimentelle, mikr. Befund LXV 340.**

- — — durch Formol LXV 333.

**Katarakta congenita bei Kaninchen nach Cholininjekt. LXV 335, 350.**

- — — — — Formen LXV 336.

**Katarakta congenita** bei Kaninchen, ringförmige Trübung unter der vord. Kapsel LXV 344.

— — — nach Röntgenstrahlen LXV 334, 350.

— bei Meerschweinchen nach Infektion mit Tuberkelbazillen und Streptokokken LXV 538.

**Katarakta diabetica**, Pathogenese LXII 105.

**Katarakta nigra** LXII 109.

**Katarakta perinuclearis**, Entstehung LXV 355, LXX 327.

— experimentelle, bei Kaninchen LXV 336.

— — mikr. Befund LXV 342.

— Heredität LXVIII 278.

— vorübergehende, bei neugeb. Kaninchen LXV 334.

**Katarakta polaris ant.** LXIII 523.

— Beteiligung der Linsenfasern LXVI 444, 450.

— bei Blennorrh. neonat. LXVI 445.

— Entstehung LXVI 436, 449, 452, LXVII 287.

— Größe LXVI 451.

— bei Impfung der Vorderkammer mit Bakterienmaterial LXVI 448.

— nach Kontusion LXII 234.

— mikr. Befund LXVI 441, 442, 443.

— Ursachen LXVI 436.

— — Perforat. der Corn. LXVI 437.

— — Ulcus corn. ohne Perforation LXVI 446.

— Wucherung des Kapseleithels LXVI 441, 443, 449.

**Katarakta polaris post.** bei Kolobom LXV 187.

**Katarakta pyramidalis** LXIX 24.

**Katarakta secundaria**, Operation, s. Nachstaroperat.

— mit Pupillensperre, Operationsmethoden LXIII 560.

— — — — neue LXIII 557.

— — — — Durchlochung LXX 123.

— — — — Operation, Ursache der Mißerfolge LXIII 558, LXX 124.

— — — — — Blutung LXIII 559, LXX 124.

— — — — — Glaskörperverschmelzung LXIII 560.

— — — — — Zerrung LXIII 560.

**Kataraktasenilis**, Ätiologie und Pathogenese LXII 123.

— — — ultraviolette Strahlen LXIX 61, 64.

— Cholestearin bei LXII 118.

— Lecithin bei LXII 118.

**Katarakta senilis incip.**, Einfluß des Jodkalium LXVII 272, 537, 539.

**Katarakta senilis incip.**, Einfluß des Jodkalium, Anwendungsweise LXVII 540.

— — — — Kasuistik LXVII 541.

— — — — Resultate LXVII 555.

— häufigste Form LXVII 540.

— Rückbildung LXVII 538.

**Katarakta traumatica** durch Kontusion des A. LXI 443.

— Rückbildung LXVII 538.

**Katarakta vasculosa** LXI 357.

**Katoptrik** der Retina LXII 40.

**Katze**, Atropinmydriasis bei der LXV 111.

— Coloboma oculi LXVIII 282.

— Conjunctivitis nach Injektion von Dysenterietoxin Celli LXVIII 82, 159.

— — — — — Kruse LXVIII 165.

— Entwicklungsgesch. d. A. LXV 168.

— — der Iris LXVIII 18.

— — der vord. Kammer LXIII 442.

— — der Tränenröhrchen LXII 390.

— Epiphora nach Injektion von Dysenterietoxin Celli LXVIII 162.

— — — — — Kruse LXVIII 165.

— Erkrankung nach Injektion von Dysenterietoxin Celli LXVIII 162.

— — — — — Kruse LXVIII 165.

— Ganglienzellen der Retina, Vakuolen LXI 505.

— Gudden'sche Kommissur LXVII 79.

— Körnerschicht, äußere LXIII 406.

— Lider, Tuberkulose der LXI 153, 199.

— Melanom der Iris, embryonales LXVIII 20.

— Optikusdurchschneidung bei der LXV 109.

— Retinavenen LXIV 524.

— Zentralgefäße LXIV 524.

— Zonulafasern, Ursprung der LXIX 152.

**Kavernöser Sehnervenschwund** LXIV 310, 311, 313, 314, 315, 320, 323, 329.

**Keilbeinflügel**, Endotheliom LXV 449.

**Keilbeinhöhle**, Empyem LXV 452.

— Erkrankungen der, Diagnose LXV 441.

— — — — — Optikuskrankungen bei LXV 441.

— polypöse Wucherungen LXV 454.

— Tumoren, Symptome bei LXV 449.

**Keimblättertheorie** LXV 251.

**Keratitis bullosa** bei Glaukoma absolut. LXIX 3, 10, 19, 25.

— Histogenese LXIX 29, 37.

— Nomenklatur LXIX 37.

— Verhältnis zum Pannus degenerativus LXIX 16.

**Keratitis centralis annularis** LXVI 247.

- Unterschied von Ringinfiltrat LXVI 248.
- beim Fötus, Entstehung LXIV 233.
- — — mikr. Befund LXIV 230.

**Keratitis interstitialis diffusa specif.** LXVI 202.

- punctata specif. LXII 483.

**Keratitis neuroparalytica**, mikr. Befund LXII 536.

- nach Unterbindung des Optikus LXIV 520.

**Keratitis parenchymatosa**, Abflachung der Hornhaut nach LXII 482.

- annularis LXVI 204.
- Ähnlichkeit mit Impfkeratitis LXVI 246.
- mikr. Befund: Conjunctiva LXVI 207.
- — — Cornea LXII 501, 510, LXVI 209, LXVIII 368.
- — — Iris LXVI 219.
- Pathogenese LXVI 225, 241, 250, LXVIII 369.
- Sektionsbefund LXVI 224.
- Spirochätennachweis LXVI 226.
- Unterschied von Keratit. purulent. LXVI 246.
- avasculosa LXII 482.
- Bindegewebsbildung auf der Hornhautunterfläche LXVIII 357, 361, 365.
- ohne Entzündungserscheinungen LXII 483.
- experimentelle Untersuchungen LXII 493.
- Faltenbildung der Hornhaut bei LXII 482.
- Gefäßveränderungen bei LXII 488, 518, LXVI 233.
- bei Haustieren LXI 210.
- Hornhautnekrosen bei LXII 502, 505, LXVI 217, LXVIII 357, 360.
- Ursachen LXII 518.
- Hypopyon bei LXII 482.
- bei Iridocyklitis tuberculosa, path. Anat. LXII 488.
- bei Iristuberkulose LXVI 34, 89.
- klin. Krankheitsbild LXII 481.
- bei Lues heredit., cas. LXII 499, LXVI 204.
- — — mikr. Befund LXII 501, 510, LXVIII 372.
- — — Spirochäta pallida bei LXVIII 373.
- — — Verlauf am 2. Auge LXII 482.
- Pannus bei LXII 530.

**Keratitis parenchymatosa**, Pathogenese LXI 191, LXII 488, 490, 492, 497, 517, LXVI 257, LXVIII 361.

- Erkrankungen des Hornhautendothels LXII 493, 497, 499, 519, 529.
- — — der Uvea LXII 497, LXVI 232.
- — — Lues LXVI 225, LXVIII 361.
- — Tuberkulose LXVI 4, LXVIII 363.
- patholog. Anatomie LXII 484, LXVI 252, LXVIII 355, 368.
- — — beim Hirsch und Bären LXII 488.
- primäre LXII 483, LXVI 231.
- — Einteilung LXVIII 365.
- — luetische LXVIII 361.
- — tuberkulöse LXVIII 363.
- — und sekundäre, Diff. - Diagn. LXVIII 361.
- sekundäre LXII 484, LXVI 231.
- Pathogenese LXII 522.
- Reparation der Hornhaut nach LXII 531.
- Reparatiosherde LXII 503, 512, 515.
- bei Skorbut LXIV 175.
- durch Traumen LXV 352.
- Trübungen nach LXII 482.
- Tuberkulose bei LXVI 68.
- Unterschied von der Keratitis bei Iridocyklitis luetica LXII 524.
- — — — — traumatica LXII 528.
- — — — — tuberculosa LXII 526.
- Verlauf LXII 515.
- Wesen LXII 518.

**Keratitis, sklerosierende**, Pathogenese LXI 192, LXII 492.

- bei Uvealtuberkulose des Kaninchens LXVI 39, 89.

**Keratitis tuberculosa** LXI 192, LXII 491.

- bei Haustieren LXI 192.

**Keratitis vesiculosa**, mikr. Befund LXIX 27.**Keratoiritis** beim Fötus, mikr. Befund LXIV 226.**Keratokonius**, angeborener LXVII 34.

- Ätiologie und Pathogenese LXV 325, LXVII 30, 32.
- Imbibitionstrübung LXVII 24.
- intraokul. Druck bei LXVII 31.
- mikr. Befund LXVII 2.
- — Bowman'sche Membran LXVII 3, 21.
- — — Canalis Schlemmii LXVII 9.
- — — Descemet'sche Membran LXVII 4, 24.



**Keratokonius**, mikr. Befund, Dicke der Hornhaut LXVII 2, 18.

- — — Endothel LXVII 4, 7.
- — — Epithel LXVII 3.
- — — Hornhautstroma LXVII 3.
- — — Narbengewebe LXVII 3.
- — — Sklera LXVII 9.
- — — Trabeculum sklerocorneale LXVII 7.
- patholog. Anat. LXVII 1.
- Trübung der Spitze LXVII 23.
- Typen LXVII 18.

**Keratomalacie** LXV 155, LXVI 442.

**Keratomykosis aspergillina** LXV 417.

- anderweitige Erreger LXV 423.
- Bildung von Fruktifikationsorganen LXV 419, 421.
- Entstehungsmodus LXV 423.
- Experimentelles LXV 420.
- Häufigkeit LXV 417.
- Infiltrationsring, doppelter LXV 418.
- Kasuistik LXV 425.
- klin. Bild LXV 424.
- Pilzbefund LXV 418, 419.
- Sequestrierung LXV 424.
- Therapie LXV 418, 425.
- Verlauf LXV 424.

**Keratoplastik**, s. Corn., Transplantat.

**Klumpenzellen** des Ciliarkörpers LXVIII 17, LXX 68.

- der Iris LXV 428, LXVIII 6, 18, LXX 68.
- — — beim Schwein LXVIII 22.

**Kniehöcker**, äußerer, Atrophie bei Mikrophthalmie LXVII 200.

- — Beziehung des n. opticus zum LXVII 82.
- innerer, Beziehung der Gudden'schen Kommissur zum LXVII 84.
- Faserverlauf im LXV 103.
- — bei der Ratte LXV 104.
- Leitungsunterbrechung der optischen Fasern im LXII 353.
- Projektion der Retina auf den LXII 351, 353, LXV 103.
- Umschaltung im LXV 405.
- Veränderungen bei Rindenblindheit LXII 302, 305, 330.

**Knochenneubildung** im A. LXVIII 561, 572.

- in der Chorioidea LXIV 316, 317, 325, 326, LXVIII 305, LXIX 28, LXX 114.
- in einer epibulbären Mißbildung LXIV 200.
- im Mikrophthalm. cong. LXI 353, 355, LXVII 207.
- im sympathisierend. Auge LXI 464, LXX 467.

**Knochenneubildung**, Ursache von sympathischer Entzündung LXI 424.

**Knorpelgewebe** in einer epibulbären Mißbildung LXIV 196, 212, 218.

- im Lidwinkel bei Mikrophthalm. LXVIII 433.
- im Mikrophthalmus LXVII 191, 197, LXVIII 430.
- in der Orbita LXIV 213.

**Knorpelstadium** in der Entwicklung der Orbita LXIV 212.

**Kobaltgläser**, Absorption der LXII 12.

**Kochsalzinjektion**, subkonjunktivale, Einfluß auf die baktericide Kraft des Glaskörpers LXV 284.

- — — — — des Kammerwassers LXV 276.
- — Übergang von Agglutinin in die vord. Kammer LXIV 423, 425.

**Kochsalzlösung**, isotonisch mit der Ochsenlinse LXII 89.

- physiologische, spezif. Gewicht LXIV 105.
- — Viskosität, Einfluß der Temperatur LXIV 71.

**Koch-Week'scher Bacillus**, Toxinwirkung auf die Conjunct. LXVIII 81.

**Körperchenzellen** im Trachomfollikel LXIII 299.

**Kohlenbogenlicht** zur lokalen Lichttherapie LXVI 290.

**Kokain**, Einfluß auf die elektrische Leitfähigkeit des Bulbus LXIX 140.

- — — — — des Kammerwassers LXIX 132

**Kollagen**, Entwicklungsgesch. LXVII 354.

- Rolle bei der Kalktrübung der Hornhaut LXIII 323.

**Kommunizierende Röhren**, Gesetz der LXIX 398.

**Komplementärfarben**, Bestimmung LXII 35.

- foveale und extrafoveale LXII 37.
- — Gleichungen LXII 35, 71.

**Kompressionskoeffizient** des Gehirns LXIX 397.

- des Liquor cerebrospro. LXIX 397.

**Konkavgläser**, Mikropie durch LXVI 477.

**Konkremente** im Scheidenraum LXIX 8.

**Konsanguinität** bei Hydrophthalm. cong. LXIII 226.

- bei Retinit. punctat. albesc. LXIII 285.

**Kontrast**, sukzessiver LXVI 154.

**Kontusion** d. A., Mechanik LXII 246.

**Konus** bei Myopie, Begriff LXVII 381.  
 — — — Beziehung zur Verdünnung der Sklera LXVII 422.  
 — — — cilioretinales Gefäß im LXVII 425.  
 — — — Entstehung LXVII 381, 428, 432.  
 — — — durch angeborene Anomalien LXVII 384.  
 — — — durch Zerrung LXVII 383.  
 — — — Faltenbildung von Optikusfasern im LXVII 386, 400, 429.  
 — — — Formen LXVII 382, 384.  
 — — — ringförmige LXVII 385, 429.  
 — — — sichelförmige LXVII 384, 429.  
 — — — mikr. Befund LXVII 393, 396, 398, 399, 401, 404, 406, 410, 418, 422.  
 — — — ophthalm. Befund LXVII 405, 416.  
 — — — Ursachen LXVII 425.  
 — myopicus bei Hydrophthalm. cong. LXIII 510, 518, 524, 535, LXVII 12.  
 — nach unten LXVII 382.  
 — — — Unterschied vom temporalen LXVII 382.  
**Konvergenz** und Akkommodation, Rolle bei der Entfernungsschätzung LXVI 488.  
 — — — latente Rollung bei LXII 460.  
 — Mangel der LXX 354.  
**Konvergenzinnervation**, Schwankungen der LXII 428.  
**Kopfneigung** nach der Schulter, Einfluß auf die Vertikalablenkung LXII 435.  
 — — — Rollung d. A. bei LXII 432.  
 — Verwertung zur Diagnostik von Augenmuskellähmungen LXII 433.  
**Kopfschmerz** bei sympath. Entzündung LXII 220, 221.  
**Korektomie** bei Hydrophthalm. cong. LXIII 227.  
**Koster's Sehprobentafel** LXIV 137, 543.  
**Krause'sche Drüsen**, Anzahl LXIV 216.  
**Krönlein'sche Operation** bei Erkrankungen der hinteren Siebbeinzellen LXV 456.  
**Kryptophthalmus cong.**, Entstehungszeit LXIII 28, 30, 34.  
 — Entzündungstheorie LXIII 31.  
 — Kasuistik LXIII 25.  
 — Pathogenese LXIII 29, 31, 43.  
 — patholog. Anatomie LXIII 30.

**Kugel's Nachstaroperation** LXIII 564, LXX 124.  
**Kupfer** i. A., mikr. Befund LXIV 298.  
**Kupfertrübungen** der Hornhaut, Aufhellung durch Ammoniumacetat und -tartrat LXIII 355, 363, 383.  
 — — — Entzündung bei LXIII 383.  
 — — — Farbe LXIII 337.  
 — — — Häufigkeit LXIII 335.  
 — — — durch Kupferalbuminat LXIII 336.  
 — — — durch Kupferkarbonat LXIII 336.  
 — — — durch Kupfermukoid LXIII 336.  
**Kupferverbindungen**, Auflösung im Reagenzglas LXIII 354.

## L.

**Längsbündel**, unteres, Gefäßversorgung LXII 312.  
 — — Veränderungen bei Rindenblindheit LXII 291, 295, 304, 305.  
**Längsschnitt**, Rekonstruktion aus den Querschnitten LXI 9.  
**Lamina cribrosa** bei anthropoiden Affen LXII 274.  
 — Riß bei Hydrophthalm. cong. LXIII 519.  
 — Verhalten bei Evulsio n. opt. LXVII 368.  
 — — nach Unterbindung des Optik. LXIV 527.  
**Landolt**, Sehprüfung nach LXIV 133, 138, 599, LXV 318.  
**Langhans'sche Zellen** im sympathisierend. Auge, Entstehung LXI 384.  
**Lebensalter**, Einfluß auf die zentrale Sehschärfe LXI 542.  
 — auf den Lichtsinn LXI 542, LXV 377.  
**Leber's Filtrationsmanometer** LXIV 13.  
**Leber**, Sarkometastase in die LXIII 476.  
**Lecithin** in der Linse LXII 118.  
**Leichenmakula** LXII 61, s. Mac.  
**Lentiglobus** anterior LXV 320.  
**Lentikonus** anterior LXV 323.  
 — posterior LXV 345.  
 — — Pathogenese LXVIII 317.  
**Lesen** bei vertikaler Stellung der Zeilen LXVI 189.  
**Leseproben** LXIV 563.  
**Leukämie**, Begriff LXII 130.  
 — bei Chlorom LXII 155.  
 — diagnostische Blutuntersuchung bei LXII 190.

**Leukämie**, Farbe des Augenhintergrundes bei LXII 189.

— lymphatische, Begriff LXII 191.

— s. Lymph.

— myeloide, Lymphome bei LXII 189.

— Veränderungen der Chorioidea bei LXII 159.

— — der Retina bei LXII 161.

**Leukämische Infiltrate**, Pathogenese LXII 163.

**Leukämische Infiltration** der Chorioidea LXI 402, LXII 160.

**Leukämische Tumoren** der Lider und Orbita, symmetrische LXII 190.

**Leukocyten**, Anhäufung an der Wandinnenfläche der Vena centr. ret. LXI 139.

— — nach Zinnobereinspritzung in den Subarachnoidealraum LXIV 529.

— Anzahl bei Chlorom LXII 154.

— Einwanderung von der Aderhaut in Netzhaut und Glaskörper LXVII 328.

— in der fötalen Cornea LXIV 232.

— polynukleäre bei Hautentzündungen LXVII 70.

— — bei subkonjunkt. Abszeß LXVII 68.

— — bei sympathisierend. Entzündung LXI 385.

— proteolytische Fermentwirkung der LXVI 244.

**Leukoeytoide** LXVII 312.

**Leukoma adhaerens**, Sekundärglaukom bei, Cyklodialyse LXVII 534.

— — Iridektomie LXIV 402, 408, 411.

**Leukosarkom** der Chorioidea LXVIII 232.

**Levator palpebrae**, Zentrum LXX 558, 562.

**Licht**, terminales LXII 25.

— weißes, Darstellung LXII 32.

**Lichtabsorption** der grünen Anilinfarbstoffe LXII 18.

— und Sehpurpur LXII 51.

**Lichtdichter Verband** LXIII 92.

**Lichtempfindung**, hemiopische LXII 370.

— Lokalisation in der Retina LXV 544.

**Lichtfilter** LXII 12, 19, 32.

**Lichtnebel** LXI 527.

**Lichtquelle**, Einfluß auf die Schätzung der Farben im Augenhintergrunde LXII 2.

— künstliche, Einfluß ihrer Temperatur auf d. Spektrum LXIX 53.

— Gehalt an ultravioletten Strahlen LXIX 50.

— — technische Entwicklung LXIX 52.

**Lichtreizschwelle** bei Dunkeladaptation, Gleichheit auf beiden Seiten LXV 313.

**Lichtreizung**, Verschmelzungsfrequenz bei LXVII 158.

**Lichtscheu** bei Irideremie LXX 82.

**Lichtsinn**, s. auch Adaptation.

— bei Amblyopia cong. LXVIII 409.

— Begriff LXV 365.

— bei Commotio retinae LXII 229, 241.

— diagnostische Bedeutung LXVI 504.

— Einfluß der allgemeinen Pigmentierung LXI 543, LXV 376.

— — des Brucins LXV 304.

— — des Geschlechts LXI 544.

— — des Lebensalters LXI 524, 542, LXV 377.

— — der Refraktion LXI 544.

— — des Strychnins LXV 304, 307.

— bei Hydrophthalmus cong. LXIII 220.

— bei Myopie LXI 544, LXV 411.

— Prüfungsmethoden LXVI 456.

— — nach Aubert LXI 526.

— — nach Charpentier LXI 527.

— — nach Förster-Koster LXVI 497.

— — nach Piper LXI 527.

— — nach Wölfflin LXI 532, LXV 306.

— und Sehschärfe LXIV 573.

— Stelle des Maximums LXI 525.

— Unterschied zwischen temporaler und nasaler Netzhauthälfte LXI 525.

— Verteilung über die Netzhaut LXI 524.

— — — — des dunkeladaptierten A. LXI 525.

— — — — des helladaptierten A. LXI 524.

**Lichtsinnempfindung**, Mechanismus LXV 314.

**Lichtsinnstörungen**, Vorkommen LXI 531.

**Lichtstärke**, Einfluß der Voltspannung LXI 535.

— des Petroleums LXVI 460.

**Lichtstrahlen**, kurzwellige, des Magnesiumfunken LXVI 286.

— — s. auch ultraviol. Strahlen, Spektralstrahl.

— langwellige, Wirkung aufs A. LXVI 285.

— langwellige und kurzwellige, Energiewerte bei verschiedenen Lichtquellen LXVI 286.

— Wirkung auf Antitoxine LXVI 280.

— — — Bakterien LXVI 278, 283.

— — — Toxine LXVI 280.

— — — Zellen LXVI 277.

— — — Bedeutung der Wellenlänge LXVI 278.

— — Eintritt der LXVI 284.

— — indirekte LXVI 280.

- Lichtstrahlen**, Wirkung, indirekte, entzündliche Reizwirkung LXVI 280.  
 — — — Gewebsproliferation LXVI 282.  
 — — — Hyperämie LXVI 281.  
 — — — Mitosenbildung LXVI 282.  
 — — — Ödem LXVI 281.  
 — — — Vermehrung der antitoxischen Stoffe im Kammerwasser LXVI 284.  
 — — — Latenzstadium der LXVI 284.  
 — — — der verschiedenen Wellenlängen aufs Auge LXIX 460.
- Lichttherapie** am Auge mit Eisenbogenlicht LXVI 290.  
 — — — mit Kadmium-Zinkbogenlicht LXVI 291.  
 — — — — Apparat LXVI 292.  
 — — — mit Kohlenbogenlicht LXVI 290.  
 — — — mit Magnesiumbogenlicht LXVI 291.  
 — — — mit Magnesiumfunken LXVI 289.  
 — — lokale, bei Augenerkrankungen LXVI 275—324.  
 — — bei Lupus conjunct. LXVI 578.  
 — — des Uleus corn. serp. LXVI 295.
- Lichtverlust** beim Durchgang durch die Retina LXII 42, 49.  
 — an der Netzhautoberfläche LXII 40, 49, 72.
- Liddefekte**, angeborene, und Anomionanomalien LXV 349, 354.  
 — — bei Kaninchen, nach Röntgenbestrahlung LXV 348, 352.
- Lider**, Arteriensysteme der LXIII 202.  
 — Blutung in die, bei Chlorom LXII 154.  
 — Entwicklungsgeschichte LXIII 35, LXVI 555, LXIX 213.  
 — — Trennung LXVI 568.  
 — — Verlötung LXVI 567.  
 — — Kolobom LXIII 38.  
 — — Tuberkulose, Formen LXI 182.  
 — — bei Haustieren LXI 199.  
 — — beim Kaninchen LXVI 46.  
 — — bei der Katze LXI 153, 199.
- Lidhaut**, Blutungen bei Skorbut LXIV 175.  
 — Pigmentierung bei Demodexerkrankung LXIX 512.  
 — Veränderung durch Demodexmilben LXIX 492.  
 — — — — circumskripte LXIX 498.  
 — — — — diffuse LXIX 504.
- Lidkante**, hintere LXVI 507.  
 — vordere LXVI 507.
- Lidkolobom**, s. Coloboma palp.
- Lidkommissur**, äußere, Fehlen der LXIII 39.
- Lidrand**, Bindegewebsgerüst LXVI 546.  
 — Dicke LXVI 507.
- Lidrand**, elastische Fasern LXVI 548.  
 — Entwicklung LXVI 555, 567.  
 — Epithel LXVI 508.  
 — — Basalmembran LXVI 510.  
 — — Basalschicht LXVI 509.  
 — — Pigment LXVI 509.  
 — — Entwicklung LXVI 570.  
 — — Hornschicht LXVI 508.  
 — — Körnerschicht LXVI 508.  
 — — Malpighi'sche Schicht LXVI 509.  
 — — Übergang LXVI 510.  
 — Fettzellen LXVI 548.  
 — Gefäße LXIII 295, LXVI 549.  
 — Meibom'sche Drüsen LXVI 542.  
 — Moll'sche Drüsen LXVI 537.  
 — Musculus Rioli LXVI 544.  
 — Nervenendigungen LXVI 551.  
 — — motorische LXVI 551.  
 — — sensible LXVI 551.  
 — Papillen LXVI 547.  
 — — sensible LXVI 547.  
 — — — Nervenendigungen LXVI 554.  
 — — vaskuläre LXVI 547.  
 — Struktur LXVI 507.  
 — sub tarsale Furche LXVI 545.  
 — Tarsus LXVI 546.  
 — Wimpern LXVI 507, 511.  
 — Zeiß'sche Drüsen LXVI 534.
- Lidschluß**, Pupillarreaktion beim LXI 573.
- Lidspalte**, Entwicklungsgesch. Lösung der LXVI 240.  
 — Weite, normale LXX 387.  
 — — ungleiche, bei Traktushemianopsie LXX 386, 399.
- Ligamentum pectinatum**, Anatomie, bei anthropoid. Affen LXII 271, LXIII 447.  
 — Bedeutung für den Flüssigkeitswechsel LXIV 474.  
 — Begriff LXIII 435, LXVII 8.  
 — bei Cyklopie LXVIII 251, 252.  
 — Eindringen in den Ciliarmuskel LXIII 447.  
 — Entwicklungsgesch. LXIII 440, 441, 445, 446, 448, 449, 450.  
 — beim Fötus LXIV 227, LXVI 221.  
 — Funktionen LXII 271.  
 — Grenzring, vorderer LXVIII 252.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 238, 493.  
 — bei Keratitis parenchym., mikr. Befund LXII 509, 514.  
 — Persistenz, abnorme LXIII 551.
- Ligamentum pectinatum Hueck** LXIII 449.  
 — Störung des Flüssigkeitswechsels durch LXIII 450.
- Limbus corneae**, leukämische Infiltration LXII 171, 185, 188.

**Linse, Abszeß** LXIV 290.

- Absorptionsvermögen für ultraviol. Strahlen LXIX 61, 455, 462.
- — — — des Kadmium-Zinkbogenlichtes LXVI 292.
- — — — des Magnesiumfunkens LXVI 287, 288.
- Agglutininwirkung bei choleraimmunisierten Tieren LXIV 434.
- Altersveränderungen LXII 117.
- Brechung und Achsenlänge, Wechselwirkung LXX 132.
- chemische Zusammensetzung und Lebensalter LXII 117.
- Cholestearinkristalle in der LXII 117.
- Diffusion von Aceton in die LXII 121.
- — von Anilin in die LXII 121.
- doppelte, bei Cyklopie LXVIII 244.
- Eiweißabgabe LXII 112.
- Entwicklungsgeschichte LXV 236, 329, 348.
- — des Durchmessers LXVIII 337.
- Ernährung LXII 85, LXVII 281.
- Rolle des Kapselepitheles LXVII 282.
- Evakuierung, s. Myopieoperation.
- Fettreichtum im Alter LXII 117.
- Fluoreszenz LXII 44, LXIX 62.
- — bei Einwirkung von ultraviol. Strahlen LXIX 61, 62, 453.
- — — — Vorgang LXIX 456.
- Form, abnorme LXV 209, 212.
- Gelbwerden LXVI 166.
- Härtungsmethode LXV 337.
- Hernie, s. Phakokele.
- und Hornhaut, Entwicklungsgesch. LVIII 443.
- Kern und Rinde, künstl. Trennung LXII 88.
- Kleinheit und Trübung bei Irideremie LXX 67, 83.
- Kolobom bei Hydrophth. cong. LXIII 227.
- Krümmung bei Neugeb. LXX 132.
- Lecithin in der LXII 118.
- Leisten, äquatoriale LXIX 164, 170.
- pathol. Anatomie bei Keratitis parenchym. LXII 510.
- — bei Mikrophthalmus LXVII 192, 198, 207, 209, 213, 215. LXVIII 432.
- und Pupillarloch, Entwicklungsgesch. LXIII 442.
- Randzacken LXIX 164.
- Regeneration LXV 39.
- Rotfärbung durch Hämoglobin LXII 109.
- rudimentäre, im epibulbären Dermoid LXIII 40, 42.

**Linse, Saftkanäle** LXII 85.

- Schrumpfung bei Tuberkulose der Iris und des Ciliarkörpers LXI 197, 214.
  - Stoffwechsel LXII 85.
  - Stomata LXVII 281.
  - Temperatur LXIV 485.
  - Tröpfchenzone bei Neugeborenen LXV 338.
  - — artefizielle LXV 338.
  - Trübung nach Röntgenbestrahlung LXV 358.
  - — s. Katarakta.
  - Tuberkulose LXI 196.
  - — bei Haustieren LXI 214.
  - Verhalten gegen Aceton LXII 121.
  - — Anilin LXII 121.
  - — anorganische Substanzen LXII 87.
  - — — Amylodextrin LXII 104.
  - — — Chlorlithium LXII 87.
  - — — Chloroform LXII 121.
  - — — Eiweißkörper LXII 108.
  - — — Farbstoffe LXII 113.
  - — — Ferrieyankalium LXII 98.
  - — — Ferroeyankalium LXII 96.
  - — — Fluorescein LXII 113, 115.
  - — — Fuchsin LXII 115.
  - — — Glykogen LXII 103.
  - — bei Hornhautfistel LXX 95.
  - — im Hydrophth. cong. LXIII 489, 502, 509.
  - — bei Irideremie LXX 82.
  - — gegen Jodkalium LXII 93, LXVII 284.
  - — — Jodnatrium LXII 93.
  - — — lipoidlösliche Substanzen LXII 117.
  - — — Manganchlorür LXII 101.
  - — — organische Substanzen LXII 103.
  - — — Phenol LXII 121.
  - — — Rhodanammonium LXII 101.
  - — — ultraviol. Strahlen LXIX 458.
  - — — Zucker LXII 105.
  - Verkalkung LXI 354, LXV 190, LXVII 207, 213, LXVIII 302.
  - Wirkung der Röntgenstrahlen auf die LXV 356.
  - Zonulaansatz LXIX 165.
  - Zuckergehalt LXII 106.
- Linsenastigmatismus** nach Kontusion d. A. LXII 230.
- Linsenfasern**, zentrale, ungleicher Querschnitt der, bei Kaninchen LXV 338.
- Linsenkapsel**, Durchlässigkeit für Eiweiß LXII 109.
- eitrige Erweichung und Auflösung LXV 46.

- Linsenkapsel**, hintere, Epithelbelag LXIV 168.  
 — — spontane Ruptur LXIX 176.  
 — Histolyse der LXV 47, 67.  
 — des Kaninchens, Untersuchungstechnik LXVII 277.  
 — Perforation, eitrige LXV 53.  
 — — — der hinteren LXV 59, 60, 64, 66.  
 — — — Pathogenese LXV 51, 67.  
 — — im Mikrophthalm. cong. LXI 354, 357. LXVIII 317.  
 — Resistenz gegen Eiterung LXV 46.  
 — Ruptur, fötale LXX 328.  
 — — durch Kontusion d. A. LXI 443, 444.
- Linsenkapselepitheel**, Abhebung bei Ulcus corn. LXVI 447.  
 — Anatomie LXVII 278.  
 — Degeneration bei Impfung der vord. Kammer mit Bakterienmaterial LXVI 448.  
 — — bei Ulcus corneae LXVI 447.  
 — beim Frosch LXVII 288.  
 — beim Kaninchen LXVII 279.  
 — Rolle bei der Ernährung der Linse LXVII 282.  
 — Schutzorgan gegen Wirkung des Kammerwassers auf die Linse LXVII 382.  
 — Veränderungen bei Naphthalinvergiftung LXVII 283.  
 — — — Einfluß des Jodkaliums LXVII 294.  
 — Wucherung bei vorderem Polarstar LXVI 441, 443.  
 — — — — Ursache LXVI 443.
- Linsenkegel** LXV 237, 239, 246, 248, 262.  
 — Vorkommen LXV 241.  
 — Zweck LXV 241.
- Linsenluxation** in den Glaskörper, Cyklodialyse bei LXVII 492, 531.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 277.  
 — traumatische LXII 246, LXX 469.  
 — — in die vordere Kammer LXI 231.  
 — bei Tuberkulose der Uvea LXI 214.
- Linsennaht** bei Kaninchen LXVII 279.
- Linsenradius** und Hornhautradius LXX 138.
- Linsenschlottern**, vorübergehendes, Erklärung LXIX 159.
- Linsenstern**, umgekehrter LXVIII 262.
- Lipoödlösliche Substanzen**, Diffusion in die Linse LXII 117.
- Liquor cerebrospinalis**, Abfluß LXV 91, LXIX 433.  
 — Bewegungsstörungen LXV 91.  
 — Herkunft LXV 71.  
 — Kompressionskoeffizient LXIX 397.
- Liquor cerebrospinalis**, Stromrichtung LXIX 447.
- Literatur** zu: Akkommodation bei Aphakie LXV 43.  
 — — Amyloid und Hyalin LXVII 146.  
 — — Augenveränderungen bei Morb. macul. Werlh. LXIV 185.  
 — — baktericide Substanzen i. A. nicht Immunisierter LXV 301.  
 — — Chininvergiftung LXX 252.  
 — — Ciliarepitheel, Wucherungen und Geschwülste LXVIII 580.  
 — — Cyanosis retinae LXVIII 178, 228.  
 — — Dakryops LXI 350.  
 — — Degeneration der Netzhaut und des Sehnerven LXIV 334.  
 — — Demodexerkrankung der Lider LXIX 521.  
 — — Dilator pupillae LXII 548.  
 — — Drusen der Papille LXIX 388.  
 — — Dunkeladaptation, Beeinflussung durch künstliche Mittel LXV 319.  
 — — Elektrische Leitfähigkeit des Auges LXIX 144.  
 — — Embolie der Arter. cent. ret. LXIII 412.  
 — — Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Iris und des Pigmentepithels der Retina LXVIII 35.  
 — — Epitheleinwanderung und Epithelcysten im Auge LXVIII 533.  
 — — Flächensarkom des Auges LXIII 479.  
 — — Flüssigkeitswechsel LXIV 477.  
 — — Glaskörper, Entstehung LXV 220, 263.  
 — — — Zentralkanal LXVII 64.  
 — — Glaukom, experimentelles LXVI 431.  
 — — — Helladaptation, Einfluß auf die Struktur der Nervenzellen der Retina LXIII 110.  
 — — — Hemianopsie LXX 400.  
 — — — Hornhautfistel LXX 108.  
 — — — Hornhauttrübungen, metallische LXIII 386.  
 — — Immunitätsverhältnisse der vorderen Kammer LXIV 442.  
 — — — Iridektomie bei Hydrophthalmus LXIII 234.  
 — — Iris, hintere Grenzschichten LXIV 142, LXV 175.  
 — — Jodkalium, Einfluß auf die Katarakta incip. LXVII 296, 560.  
 — — Kammer, Entwicklung der vorderen LXIII 432.  
 — — Katadioptrische Nebenbilder im Auge LXX 572.  
 — — Keratitis parenchymatosa LXVI 259.

**Literatur zu: Keratokonus, pathologische Anatomie und Pathologie** LXVII 14, 37.  
 — — **Keratomykosis aspergillina** LXV 426.  
 — — **Klumpenzellen der Iris** LXV 428.  
 — — **Kolobom des Auges** LXV 216, LXVIII 348.  
 — — **Konus und Aderhautveränderungen im myopischen Auge** LXVII 434.  
 — — **Kontusion des Auges** LXII 249.  
 — — **Lichtsinn** LXI 559.  
 — — **Lichttherapie des Auges** LXVI 324.  
 — — **Lidrand, Bau und Entwicklung** LXVI 570.  
 — — **Linsenkapsel, Spontanruptur der hinteren** LXV 67.  
 — — **Lymphangiom der Conjunctiva** LXIII 197.  
 — — **Lymphomatöse Geschwulstbildungen in der Orbita und im Auge** LXII 192.  
 — — **Mikrophthalmus und Anophthalmus mit Cysten** LXVII 267.  
 — — — **Kolobom, patholog. Anatomie und Pathogenese** LXVIII 458.  
 — — **Mißbildung d. A.** LXIV 220.  
 — — **Myopie, elastische Fasern der Sklera** LXI 235, 244.  
 — — **Myopieoperation** LXX 64.  
 — — **Netzhautablösung, experimentelle und histologische Untersuchungen** LXX 537.  
 — — **Optikuserkrankungen bei Affektion der hinteren Nebenhöhlen der Nase** LXV 481.  
 — — **Optikuskolobom** LXV 201.  
 — — **Orbitalphlegmone** LXI 483.  
 — — **Pannus degenerativus und Keratitis bullosa** LXIX 38.  
 — — **Parinaud'sche Conjunctivitis** LXIII 67.  
 — — **Phakokele** LXVII 57.  
 — — **Photometer** LXVI 475.  
 — — **Pigmentierung, subkonjunktivale, nach Skleralruptur** LXVIII 493.  
 — — **Pigmentstreifenbildung in der Netzhaut** LXVII 308.  
 — — **Plasmom der Conjunctiva und Cornea** LXVIII 124.  
 — — **Polarkatarakt** LXVI 433.  
 — — **Pupillenverengung auf Lichtreize** LXV 134.  
 — — **Retinitis punctata albescens** LXIII 286.  
 — — **Röntgenstrahlen, Wirkung aufs Auge** LXVI 118.

**Literatur zu: Sarkom des Ciliarkörpers und der Chorioidea im Kindesalter** LXIX 289.  
 — — **Sehschärfe und Beleuchtung** LXVI 475.  
 — — **Stauungspapille** LXIX 347, 448.  
 — — **Stoffwechsel der Linse** LXII 123.  
 — — **Thyreoidismus** LXI 521.  
 — — **Trachom, Pathogenese** LXIX 542.  
 — — — **patholog. Anatomie** LXIII 317.  
 — — **Tränendrüse, Veränderungen nach Durchschneidung der Ausführungsgänge** LXII 84.  
 — — **Tränenröhrchen, Entwicklung** LXII 398.  
 — — **Tuberkulin bei Augentuberkulose** LXIX 252.  
 — — **Tuberkulose als Ätiologie chronischer Augenentzündungen** LXVI 100.  
 — — — **des Auges bei Haustieren** LXI 218.  
 — — **Zentralgefäß-Erkrankungen** LXI 324.  
**Lochbildung** in der Fovea, spontane, Befund LXIV 172.  
 — — — **Ursache** LXIV 174.  
**Lochzange** LXX 125.  
**Löwe'scher Ring** LXV 516.  
**Lokalisation**, absolute, Begriff LXVI 120.  
 — — **bei Schielenden, Arten** LXVI 123.  
 — — **Untersuchungsmethode** LXVI 120.  
 — — **und Größenschätzung** LXIX 548.  
 — **der Netzhautbilder, Einfluß von Zylindergläsern** LXII 462.  
**Lues**, s. Syphilis.  
**Lumbalpunktion**, Einfluß auf die Meningitis LXV 81.  
 — — — **die Neuritis optica luetica** LXV 81, 97.  
 — — — **die Stauungspapille** LXV 79, 97, LXIX 296, 299, 325, 331, 436.  
 — **Technik** LXV 79.  
**Lummer's Kontrastphotometer** LXI 534.  
**Lunge**, Sarkometastase LXIII 473, 477.  
**Lupus conjunctivae** LXI 182.  
 — **Lichttherapie bei** LXVI 578.  
**Lymphabfluß**, intraokularer LXIV 534.  
 — **zum Gehirn** LXIV 528.  
**Lymphadenoides Gewebe** der Chorioidea LXII 165.  
 — **der Orbita** LXII 144, 164.  
**Lymphaemie** LXII 141.

**Lymphanglektasie** der Conjunctiva LXIII 188.

— — — angeborene LXIII 188.

— — — klinische Bedeutung LVIII 189.

— — — Komplikationen LXIII 188.

— — — erworbene LXIII 189.

— — — Ätiologie LXIII 189.

— — — Formen LXIII 188.

— — — Sitz LXIII 188.

— — — hämorrhagische LXIII 196.

**Lymphangioma cavernosum**, Pathogenese LXIII 194, 196.

— — — circumscriptum LXIII 195.

— — — Ätiologie LXIII 195.

— — — Blut im LXIII 196.

— — — Leukoocyten im LXIII 196.

— — — conjunctivae LXIII 188.

— — — Formen LXIII 189.

— — — Häufigkeit LXIII 189.

— — — cavernosum, histolog. Befund LXIII 192.

— — — Kasuistik LXIII 190.

— — — simplex, Kasuistik LXIII 190.

**Lymphbahn** des Optikus LXX 105.**Lymphcyste**, Diff.-Diagnose von Dakryops LXI 347.**Lympe**, Produktion und Absorption, Theorie LXIV 445.**Lymphfollikel** der Conjunct., s. d.**Lymphocytaire** Zellwucherungen LXIII 310.**Lymphocyten**, Bildungsort LXII 163.

— bei Chlorom LXII 155.

— Herkunft LXIII 312.

— bei Keratitis parenchymat. LXII 504, LXVIII 359.

— und Plasmazellen LXIII 48.

— bei sympathisierender Entzündung LXI 379, 380, 390, 396, 399.

— Wanderfähigkeit LXI 399.

**Lymphom**, Begriff LXII 130.

— der Conjunct. LXIII 58.

— — — symmetrisches LXVII 71.

— bei myeloider Leukämie LXII 189.

**Lymphomatose**, Begriff LXII 132.

— akute, Blutbefund LXII 134, 140.

— — — Hämoglobingehalt LXII 134, 135.

— — — histolog. Befund LXII 137.

— — — Krankengeschichte LXII 133.

— — — Netzhautblutung LXII 134.

— — — Sektionsbefund LXII 136.

— — — Wesen LXII 147.

**Lymphomatöse Erkrankung** der Conjunct. bei Chlorom LXII 188.

— der Conjunctiva und Cornea LXII 184.

— der Tränendrüse LXII 188.

**Lymphomatöse Geschwülste** im Auge, Aggressivität LXII 167, 177.

— — mikr. Befund LXII 170.

— der Orbita LXII 142.

— Pathogenese LXII 163, 180.

**Lymphomatöse Geschwulstbildung**

in der Chorioidea LXII 159.

— in der Retina LXII 179.

**Lymphomeconjunctivitis** LXII 146.**Lymphosarkom** der Mamma LXII 134, 136.

— der Nieren LXII 136.

— der Orbita LXII 133, 137.

**Lymphosarkomatose** LXII 131, 165.**Lymphscheiden** der Netzhautgefäße, Blutung in die LXI 24, 247, 287.**Lymphspalt** zwischen Pigmentepithel und Retina LXIII 528, 529.**Lymphstauung**, Entzündung durch LXIX 344.**Lymphstrom** der Cornea LXII 543.

— im Optikus LXIV 534.

**Lymphzirkulation** des Gehirns LXV 70.**M.****Macula centralis retinae** LXII 2.**Macula, entoptische** LXII 17, 54, LXV 513, 621, LXVI 156, 161, 180.

— — Beobachtung LXVI 180.

— — bei Blaublicht LXVI 185.

— — Nachbilder der LXII 17, LXV 531, LXVI 181.

— — physiologische Bedeutung LXVI 180.

**Macula lutea**, Adaptation bei anatom. Defekte der LXV 384, 415.

— assoziative Verbindungen LXII 348, 368.

— Doppelversorgung LXII 344, 350, LXX 388.

— Drusen LXIX 376.

— Durchlöcherung durch Schrotkorn LXIV 286.

— Farbe LXII 1, 4, 70, LXV 487, LXVI 141, 156.

— — anatomische Untersuchungen LXII 61, LXV 486, LXVI 152.

— — Bedeutung der Intensität und Qualität der Lichtquellen LXV 508, 510.

— — bei Embolie der Art. centr. ret. LXV 506, 507, LXVI 157.

— — entoptische Untersuchung LXII 12, 52, 71, LXV 513.

— — ophthalmoskop. Untersuchung LXII 2, 71, LXV 494, LXVI 146.

— — bei ophthalmoskop. Untersuchung mit Tageslicht LXV 502, 510.



**Macnea lutea**, Farbe bei Retinitis centralis LXV 507.

- bei Sehnerventrophie LXV 508.
- Sitz der LXV 528.
- bei Thrombose der Zentralvenen LXV 507.
- Untersuchung mit Farbenmischungen LXII 25, 56, 71.
- Fasern, Verlauf der LXX 390.
- funktionelle Sonderstellung LXVI 186.
- Größe LXV 486, 504.
- inselförmige Vertretung im Occipitallappen LXV 103.
- kirschroter Fleck, Ausdehnung LXII 5.
- — Erklärung LXI 73.
- — Fehlen bei Verschuß der Zentralgefäße LXI 266.
- Kolobom, s. Coloboma mac.
- kortikale Repräsentation LXII 344, 351.
- der Leiche LXII 61, LXV 490, LXVI 147.
- — Farbe der LXII 62, 69, LXV 489.
- — — Entstehung LXII 64, LXV 489, 513, LXVI 166, 175.
- — — Konservierungsmethode LXII 62.
- und Netzhautperipherie, Unterschied der Funktion LXII 348, 368.
- Schpurpur der LXII 55.
- Veränderungen bei Commotio retinae LXII 230.
- — nach Röntgenbestrahlung LXVI 116.

**Maculadegeneration**, Haab'sche LXV 385.

**Maculare Aussparung** bei Hemianopsie LXX 358, 388.

- Maculares Gefälle** des terminalen Lichtes LXII 25, 33, 41, 46, 50, 52, 71, LXV 519.
- Einfluß des Schpurpurs LXII 48.
  - Koeffizient des LXII 33.

**Magnesiumbogenlicht** zur lokalen Lichttherapie LXVI 290.

- Magnesiumfunken**, Energie der ultraviolett. Strahlen LXVI 286.
- therapeutische Anwendung, Nachteile LXVI 289.
  - Wirkung aufs Auge LXVI 287.

**Magnesiumspektrum** LXVI 287.

**Mallory's Färbungsmethode** LXVII 319.

**Mamma**, Lymphosarkom der LXII 134, 136.

**Manganchlorür**, Diffusion in die Linse LXII 101.

- Nachweis LXII 102.

**Manolescu's Nachstaroperation** LXIII 561.

**Manometer** von Leber LXIV 13.

**Marchi-Degeneration** LXIV 285.

- Färbung LXIV 265, 283.
- Fixierungsmethode LXIV 244.
- Reaktion LXIV 285.
- — biologische Bedeutung LXIV 307.
- Untersuchung bei Stauungspapille LXIX 340.

**Markläsionen**, Feststellung durch Färbung LXII 312.

- bei Rindenerweichungen LXII 307.

**Markscheiden**, Entwicklung LXX 378.

**Markscheidenfärbung** LXI 7, LXIV 285, 309.

**Mastzellen** bei Amyloiderkrankung der Conj. LXVII 126.

- bei Demodexerkrankung der Lidhaut LXIX 504.
- bei Parinaud'scher Erkrankung LXIII 82.
- bei Plasmom der Conj. LXVIII 116, 118, 119.
- bei subkonjunkt. Abszeß LXVII 68.
- bei sympathisierend. Entzündung LXI 385.
- bei Trachom LXIII 305, LXIX 511.

**Maulwurf**, Gudden'sche Kommissur LXVII 80.

**Maus**, Gudden'sche Kommissur LXVII 80.

- Kreuzung im Chiasma LXV 102.
- Muskelzellen in der Chorioidea LXVII 351.
- Tränenröhrchen, Entwicklung LXII 390.

**Maxwell'scher Fleck**, Bedeutung des

- anatom. Baues der Macula LXV 524.
- Beobachtung LXII 12, LXV 515.
- Erklärung LXV 523, 531, LXVI 179.
- Größe und Form LXV 515, 522, LXVI 156, 162.
- Löwe'scher Ring LXV 516.
- parallaktische Verschiebung LXII 14, LXV 527, LXVI 161, 181.
- Sitz LXII 15, LXV 517.
- Untersuchungsmethode LXII 12, LXV 516.

**Medialkerne**, kleinzellige, der Affen LXX 542.

- — Sphinkterzentrum LXX 539, 562.

**Meerschweinchen**, angeborener Katarakt nach Impfung mit Tuberkelbazillen und Streptokokken LXV 358.  
 — Tränenröhrchen, Entwicklung LXII 388.  
 — Tuberkulose der Conj. LXI 199.  
**Megalocornea**, s. Cornea globosa.  
**Meibom'sche Drüsen**, s. Tarsaldrüsen.  
**Melanom** der Iris beim Katzenembryo LXVIII 20.  
**Membrana pupillaris** LXIII 436, 439, 440, 446, 447, 448, LXVIII 26, 31, 244.  
 — Beteiligung an der Keratoiritis beim Fötus LXIV 229, 235.  
 — Beziehung zur Pupillenweite LXVIII 338.  
 — fötale LXVI 219.  
 — Rückbildung LXVIII 339.  
**Membrana pupillaris perseverans**, Entstehung LXIV 235.  
**Membrana vasculosa retinae**, Histogenese LXX 452, 464.  
**Meningitis**, Sehnervenatrophie nach LXVIII 140.  
 — Stauungspapille bei LXIX 443.  
**Mesoderm**, Rückbildung in den Augenblasenspalten LXVIII 330.  
 — Verbindung mit dem Ektoderm LXV 251.  
 — — — — — Ursache von Mißbildungen d. A. LXVIII 436, 445, 453.  
**Mesodermleiste** LXV 210, LXVII 252, LXVIII 294, 319.  
**Methylenblau**, Diffusion in die Linse LXII 115.  
**Methylenblaufärbung**, vitale LXI 505.  
**Methylviolett**, Diffusion in die Linse LXII 115.  
**Migräne** bei Hyperphorie LXII 418.  
**Mikrococcus epidermidis albus**, Toxinwirkung auf die Conj. LXVIII 83.  
**Mikrognathie** bei Hydrophthalm. congen. LXIII 228.  
**Mikroorganismen** bei eitriger Perforation der Linsenkapsel LXV 47, 53, 57, 65.  
 — bei Iritis und Iridocyklitis LXII 215.  
 — — Morb. macul. Werlh. LXIV 183.  
 — — Parinaud'scher Erkrankung LXIII 55.  
 — — sympathischer Entzündung LXI 449, LXII 194, 211, 217, 225.  
 — — Ulcus corn. serp. LXII 219.  
 — in der Vorderkammer, Schicksal LXIV 415.  
**Mikrophthalmus**, Ätiologie und Pathogenese LXI 356, LXVI 228, LXVII 235, LXVIII 333, 436.

**Mikrophthalmus**, Ätiologie und Pathogenese, Anomalien des Gehirns LXVII 258.  
 — — — — Atavismus LXVIII 455.  
 — — — — Enge des Amnions LXVII 258.  
 — — — — Heredität LXVII 259, LXX 321.  
 — — — — Verwachsung von Mesoderm mit Ektoderm LXVIII 436, 445, LXX 324.  
 — — — — — der Retina mit der Hinterfläche der Linse oder mit dem Kolobomspalt LXVIII 437, LXX 324.  
 — Durchmesser der Cornea LXV 389.  
 — Fehlen der Papille LXVIII 305, 311, 313.  
 — — — — Pathogenese LXVIII 316.  
 — gliöse Wucherung LXVIII 306, 309.  
 — Glioma retinae LXI 352, 360, LXIX 474.  
 — beim Kaninchen nach Röntgenbestrahlung LXV 347, 352.  
 — Kolobom bei LXI 362, LXIII 40, LXV 389, LXVIII 429, 435.  
 — kolobomatöser, beim Hund LXVIII 444.  
 — Optikuskolobom bei LXV 198.  
 — patholog. Anatomie LXI 353, LXIII 40, LXIII 428.  
 — Retina, Duplikatur und Falten der LXIII 41, LXV 163, LXVIII 430, 436.  
 — — — — Erklärung LXVIII 440.  
 — — Rosettenbildung in der LXIII 41, LXVII 191, 197, LXVIII 432.  
**Mikrophthalmus mit Cyste**, cas. LXVII 187, LXVIII 301.  
 — — — — Ein- und Doppelseitigkeit LXVII 224.  
 — — — — ektatisches Kolobom LXVII 240.  
 — — — — Gehirnbefund LXVII 188.  
 — — — — Geschlecht LXVII 224.  
 — — — — Gruppen LXVII 228, 249, 260, LXX 314.  
 — — — — Identität mit ektatischem Kolobom LXX 315.  
 — — — — Kasuistik LXVII 217, 262.  
 — — — — Komplikationen LXVII 225.  
 — — — — mikroskop. Befund LXVII 188, 195, 201, 208, 211, 216, LXVIII 302.  
 — — — — Netzhautablösung LXVII 214.  
 — — — — Pathogenese LXVII 233, 249, 261, LXX 318.  
 — — — — patholog. Anatomie LXVII 228, LXVIII 301, LXX 315.  
 — — — — Theorie von Arlt LXVII 234.  
 — — — — — Bach LXVIII 454.  
 — — — — — Duyse LXVII 235.

**Mikrophthalmus mit Cyste, Theorie** von Ginsberg LXVII 237.

- — — — — v. Hippel LXVII 245.
- — — — — Kundrat LXVII 234.
- — — — — Maunhardt LXVII 239.
- — — — — Mitvalsky LXVII 236, 251, 258.
- — — — — Natanson LXVII 252.
- — — — — Pichler LXVII 244.
- — — — — Schimanowsky LXVII 238.

**Mikropie durch Konkavgläser** LXVI 477.

- Theorie LXVI 486.

**Mikroretina** LXV 158, 167.

- Mikroskopische Technik, Conjunctivalepithel** LXIX 531.
- Irisuntersuchung LXX 410.
- s. Einbettung, Färbung, Fixierung, Härtung etc.

**Milzbrandbacillus, Toxinwirkung auf die Conj.** LXVIII 82.**Minimum separabile** LXIV 564, 600.**Miosis bei Blutgefäßinjektion** LXIV 360.

- bei dekapierten Fröschen, Wirkung der einzelnen Spektralstrahlungen LXV 122.
- nach Durchschneidung des Optikus beim Kaninchen LXI 570.
- — — — — auf elektrische Belichtung LXV 110.
- — — — — durch Luxieren der Bulbi LXI 573.
- — — — — — Reizung der Cornea LXI 573.
- — — — — — der Nasenschleimhaut LXI 573.
- — — — — — Wirkung der einzelnen Spektralstrahlungen LXV 120.
- — — — — bei der Katze, auf elektrische Belichtung LXV 111.
- bei Elektrolyse des Kammerwassers LXVI 352.
- des Greisenalters, Erklärung LXIV 366.
- und Mydriasis, Geschwindigkeitsunterschiede LXIV 374.
- bei Optikusatrophie auf elektrische Belichtung LXV 113.
- nach Optikusunterbrechung, Erklärung LXV 127.
- bei Punktion der vorderen Kammer LXIV 360.
- am Schlüssellockkolobom LXIV 378.
- Verbreiterung des Sphinkter pupill. in LXIV 370.
- Zunahme des Ektropiums des Pupillarrandes in LXIV 361, LXVIII 28.

**Miosis, Zustandekommen** LXIV 377.**Mißbildungen, angeborene, geschwulstähnliche drüsige, des vorderen Bulbusabschnittes** LXIV 187.

- — — acino-tubulöse Drüsen in LXIV 197, 203.
- — — — — Herkunft LXIV 212, 217.
- — — — — Ätiologie LXIV 214.
- — — — — cas. LXIV 188.
- — — — — Dermoidbildung in LXIV 195, 217.
- — — — — Entstehung LXIV 207.
- — — — — histologische Untersuchungstechnik LXIV 192.
- — — — — Kasuistik LXIV 199.
- — — — — Knochenkeim im LXIV 200.
- — — — — Knorpelgewebe im LXIV 196.
- — — — — Herkunft LXIV 212, 218.
- — — — — mikr. Befund LXIV 192.
- — — — — Wesen LXIV 202.
- des Auges, Ursache LXIV 215, LXVIII 436, 445.
- der Genitalien LXIII 27.
- nach Röntgenbestrahlung LXV 353, 357.
- — — — — Cyklopie, Kolobom etc. s. d.
- Mitosen nach Bestrahlungen** LXVI 282.
- Moll'sche Drüsen** LXVI 505, 537.
- Ausführungsgang LXVI 538.
- Charakter LXVI 537.
- Entwicklungsgeschichte LXVI 560, 562, 564, 565, 566, 567.
- Form LXVI 537.
- Glasmembran LXVI 540.
- Mündung LXVI 537.
- Muskelfasern LXVI 540.
- Nerven LXVI 553.
- Sekretionsepithel LXVI 539.

**Monochromatisches Licht, Untersuchungen im** LXII 22.**Morbus maculosus Werlhofii, cas.** LXIV 177.

- — Mikroorganismen bei LXIV 183.
- — mikroskop. Befund LXIV 179.
- — ophthalmoskop. Befund LXIV 177.
- — Rundzelleninfiltration bei LXIV 184.
- — Sektionsbefund LXIV 178.
- — Ursache der Blutungen bei LXIV 182.

**Mukoid in der Hornhaut** LXIII 327.

- Rolle bei der Alaantrübung der Hht. LXIII 341.
- — — — — Bleitrübung der Hht. LXIII 330.
- — — — — Kalktrübung der Hht. LXIII 327.

- Mukoid**, Rolle bei der Kupfertrübung der Hht. LXIII 336.  
 — — — Quecksilbertrübung der Hht. LXIII 345.  
 — — — Silbertrübung der Hht. LXIII 333.  
 — — — Zinktrübung der Hht. LXIII 339.
- Mukoide, metallische**, Auflösungsmittel der LXIII 348, 359.
- Müller'sche Lösung**, Einfluß auf Eiweißhalt. Glaskörper LXVIII 392.
- Musculus levator palpebrae**, Entwicklungsgesch. LXIX 201, 205, 206, 207, 209, 211, 218.
- Musculus obliquus infer.**, Durchtrennung bei Myopie LXVIII 475.
- Musculus obliquus infer. et super.**, Wirkungsweise, Geschichtliches LXVIII 474.
- Musculus obliquus superior**, Entwicklungsgesch. LXIX 205, 211.  
 — — — Lähmung LXII 437, 438.
- Musculus orbicularis**, Entwicklungsgesch. LXVI 567, LXIX 201, 205.
- Musculus rectus externus**, Querschnitt LXII 127.
- Musculus rectus inferior**, Querschnitt LXIII 457.
- Musculus rectus internus**, Lähmung bei Parotitis epidem. LXX 270.  
 — — — Querschnitt LXII 127.
- Musculus retractor bulbi** bei Mikrophthalm. LXVIII 434.
- Muskel Riolani**, s. Riolan.
- Muskel d. A.**, Abstand vom Optikus bei Aniridie LXX 66.  
 — — — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 497, 506, 515, 525, 526.  
 — — — Hypertrophie, wahre LXII 126, LXIII 452.  
 — — — Ursachen LXII 128.  
 — — — Vorkommen LXIII 458.  
 — — — Querschnitt am lebenden und toten LXIII 454.  
 — — — der Fasern am lebend. und toten LXIII 458.
- Muskelansätze**, Breite bei Hydrophthalm. cong. LXIII 497, 506, 515, 526.  
 — — — bei Myopie LXIII 536, 537, 538.  
 — — — Entfernung vom Limbus bei Aniridie LXX 66.  
 — — — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 483, 497, 506, 515, 525, 526.  
 — — — bei Myopie LXIII 536, 537, 538.
- Muskeldruck**, Verlängerung der Augenachse durch LXV 27.
- Muskeldruck**, Vermehrung der Hornhautwölbung durch LXV 30.
- Muskelenergie**, individuelle LXII 426.
- Muskelepithelblatt**, Ansatz, ciliarer LXIV 373.  
 — — — pupillarer LXIV 371.  
 — — — Dicke LXIV 340.  
 — — — Funktion LXIV 378.  
 — — — Verbindung mit dem Sphinkter LXIV 371.  
 — — — s. Bruch-Henle'sche Membran und Dilator.
- Muskelfaser**, Kohäsionskraft LXIV 374.
- Muskelfibrille**, wechselnder Querschnitt LXIII 454.
- Muskelkontraktion** und elastische Kontraktion, Unterschied LXIV 374.
- Mydriasis**, Abnahme des Ektropiums des Pupillarrandes in LXIV 361.  
 — — — durch Atropin bei Kaninchen LXV 111.  
 — — — bei Katzen LXV 111.  
 — — — bei Negern und Indianern LXV 503.  
 — — — Blendung bei LXV 395.  
 — — — durch Klopfen auf die Bauchgegend beim Kaninchen LXI 574.  
 — — — mangelhafte, bei Neugeborenen LXVIII 33.  
 — — — und Miosis, Geschwindigkeitsunterschiede LXIV 374.  
 — — — bei Parotitis epidem. LXX 271.  
 — — — Verhalten der Iris bei LXIV 362.  
 — — — Verschmälerung des Sphinkter pup. in LXIV 370.  
 — — — durch Wärmestrahlung LXV 113.
- Mydriatika**, Wirkung bei experimentellem Glaukom LXVI 417.  
 — — — — Erklärung LXVI 419.
- Myelinisation** LXII 340.
- Myofibrillen** LXVII 349.
- Myoglia** LXIV 154.
- Myom** der Iris LXVIII 21.
- Myopie**, Ablatio retinae, Häufigkeit LXX 50, 55, 154.  
 — — — Adaptation bei LXV 411, 416.  
 — — — in den verschiedenen Altersstufen LXX 158.  
 — — — Achsenlänge d. A. LXI 232, 233, 234, 243.  
 — — — Ätiologie und Pathogenese LXI 227, 237, LXIII 528, LXVII 379.  
 — — — angeborenes Staphyl. post. LXVII 380.  
 — — — — Akkommodation LXX 170.  
 — — — — Amblyopie LXX 163.  
 — — — — Astigmatismus LXX 155, 157, 162, 198.  
 — — — — Dehnung des hinteren Abschnittes LXVII 425, 432.

**Myopie**, Ätiologie und Pathogenese, Drucksteigerung, intraokul. LXVII 381.  
 — — — — — Entzündungstheorie LXVII 380, 432.  
 — — — — — Geschichtliches LXVII 380.  
 — — — — — Hornhauttrübungen LXX 154, 162.  
 — — — — — Muskeldruck LXX 170.  
 — bei beginn. Altersstar LXV 35.  
 — angeborene LXIII 528.  
 — durch Brechungsindex-Zunahme LXV 35.  
 — Chorioidea, Atrophie, s. d.  
 — Blutungen LXVII 411, 414.  
 — Erkrankungen bei LXX 43.  
 — Herde, Entstehung LXVII 433.  
 — — mikr. Befund LXVII 394, 404, 407, 408, 411, 414, 415, 419, 420, 421.  
 — — ophthalmoskop. Formen LXVII 430, 433.  
 — Supratraktion LXVII 393, 396, 398, 400, 402, 404, 410, 413, 418, 423, 427.  
 — Cornea, Dicke der LXIII 533.  
 — Größe der LXIII 530.  
 — Descemetis, Risse LXIII 531.  
 — bei Diabetes LXV 35.  
 — Disposition LXVII 379, LXX 161.  
 — Druck, intraokularer LXIII 536.  
 — Einfluß der höheren Schule LXX 150.  
 — — der Volksschule LXX 145.  
 — Exkavation der Papille LXIII 529, 536, LXVII 403, 404.  
 — Glaskörperverschüttung LXVII 395, 401, 403, 409, 416, 417.  
 — Gleichgewichtslage, Prüfung der LXII 402.  
 — hochgradige, Entstehung LXVII 383.  
 — — Glaukom bei LXIII 536.  
 — — und Hydrophthalm. cong., Identität LXIII 527.  
 — — — — — Unterschied LXIII 527.  
 — — Maße des Bulbus LXIII 537, 538.  
 — — Optikusinsertion LXVII 392, 395, 398, 399, 401, 303, 404, 406, 410, 417.  
 — — Optikuscheidenraum LXV 211, 213, LXVII 395, 396, 398, 399, 401, 403, 404, 406, 410, 413, 418, 422.  
 — — Sehschärfebestimmung LXIV 559.  
 — Hornhautradius bei LXX 138.  
 — bei Hydrocephalie LXV 93.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 217, 534, LXVII 184.  
 — bei Ikterus LXV 35.  
 — bei Iritis LXV 35.

**Myopie**, Kammertiefe bei LXX 140.  
 — bei Kolobom LXV 212.  
 — Lichtsinn bei LXI 544, LXV 411.  
 — Muskellansätze, Breite der LXIII 537, 538.  
 — — Entfernung vom Limbus LXIII 536, 537, 538.  
 — Naharbeit, Einfluß der LXVII 379.  
 — ophthalmoskop. Befund LXIII 525.  
 — patholog. Anatomie LXVII 393, 396, 398, 399, 401, 404, 406, 410, 418, LXVIII 58.  
 — progressive, Wesen LXI 227.  
 — Ruhelage der Augen bei LXX 190.  
 — Sehschärfe bei LXX 156.  
 — Sklera, Dehnung im hint. Abschnitt LXIII 539.  
 — — Dicke LXI 241, LXIII 525, LXV 209.  
 — — elastische Fasern LXI 227, 231, 235, 237.  
 — — Struktur LXI 242.  
 — Skotom für Blau, zentrales LXV 413.  
 — Staphylombildung bei LXI 228.  
 — Therapie: Myotomie des Obliqu. infer. LXVIII 475.  
 — — s. Myopieoperation.  
 — Vergrößerung d. A., Erklärung LXX 170.  
 — Vollkorrektur, Einfluß des Alters auf die Progression bei LXX 168.  
 — — Einfluß auf die Progression LXX 164.  
 — — des Astigmatismus, Einfluß auf die Progression LXX 163.  
 — — Theorie der LXX 169.  
 — Zunahme bei Operierten und Nichtoperierten LXX 56.  
**Myopieoperation**, Ablatio retinae nach LXI 234.  
 — — — Disposition LXX 54.  
 — — — Einfluß von Glaskörpervorfall und -verlust LXX 53.  
 — — — Häufigkeit LXX 44, 51, 61.  
 — Astigmatismus nach LXX 59.  
 — Besserung nach LXX 41, 61.  
 — Discission, primäre LXX 34.  
 — — — Anhänger LXX 35.  
 — — — Heilungsdauer LXX 37.  
 — — — Zahl der Eingriffe LXX 36.  
 — ein- und doppelseitige LXX 63.  
 — Einfluß auf den Verlauf der Myopie LXX 56.  
 — Glaskörperverschüttung bei LXX 53.  
 — Hämorrhagien LXX 43.  
 — Indikation LXX 62.  
 — — bei Ablatio ret. des anderen Auges LXX 63.  
 — Infektionsgefahr LXX 38.

**Myopieoperation**, Kontraindikationen LXX 55, 63.  
 — Lebensalter LXX 38.  
 — Linearextraktion, primäre LXX 36  
 — — — Anhänger LXX 37.  
 — — — Heilungsdauer LXX 37.  
 — — — Zahl der Eingriffe LXX 37.  
 — Myopiegrade LXX 39.  
 — Operationsverfahren LXX 63.  
 — periphere Extraktion LXX 60.  
 — Statistik LXX 2, 145.  
 — Verschlechterung nach LXX 42, 61.  
**Myxödem**, Neuroretinitis bei LXI 500.

## N.

**Nachbilder** der entoptischen Macula LXII 17, LXV 531.  
**Nachblutung** nach Enukleation LXI 68.  
 — — — Gelatine bei LXII 169.  
**Nachdehnung**, elastische LXIV 7.  
**Nachstar**, s. Katar. secund.  
**Nachstaroperation** nach: Agnew LXIII 569.  
 — Bowman LXIII 532.  
 — da Gama Pinto LXIII 560.  
 — v. Graefe LXIII 560.  
 — Kugel LXIII 561, LXX 124.  
 — Manolescu LXIII 561.  
 — Schmidt-Rimpler LXIII 570.  
 — Schnaudigel LXX 126.  
 — v. Wecker LXIII 560.  
**Nagel's** Adaptometer LXV 381.  
 — Tafeln LXII 467.  
**Nagel-Verletzung** d. A. LXVI 299.  
**Naphthalinstar**, Einwirkung von Jodkalium auf LXVII 291.  
 — experimenteller LXVII 275.  
 — Verhalten des Kapselepitheles LXVII 283.  
**Narkose**, Einfluß auf den Pupillarreflex LXX 545.  
 — bei Kaninchen LXIX 418.  
 — Theorie der LXII 119.  
 — bei Trepanation des Schädels LXIX 314, 324.  
**Nasenbluten** bei Parotitis LXX 259.  
**Nasenerweiterung** bei Orbitalphlegmone LXI 474.  
**Nasennebenhöhlen-Erkrankung**, Abducenslähmung bei LXV 453.  
 — — Diagnose LXV 458.  
 — — Exophthalmus LXV 452, 455, 460.  
 — — Sehnervenerkrankungen bei LXV 440—485.  
 — — Therapie LXV 456.  
**Nase und Orbita**, venöse Verbindungen LXI 477.  
 — Zusammenhang von Erkrankungen der LXI 478.

**Natriumkarbonat** in der Hornhaut LXIII 324.  
**Natriumsalze** zur Aufhellung von metallischen Hornhauttrübungen LXIII 349.  
**Natriumthiosulfat** zur Aufhellung von Silbertrübungen der Hornhaut LXIII 353, 359, 363, 382.  
**Neger**, Atropinmydriasis beim LXV 503.  
**Nekrose** im Aderhautsarkom LXI 573, LXIII 477.  
**Nephritis**, Gefäßveränderungen bei LXX 224.  
 — — des Auges bei LXX 225, 227.  
 — Kompensation bei LXX 231.  
 — Netzhauterkrankungen bei, Pathogenese der LXX 200.  
 — Ödem der Netzhaut und der Haut bei LXX 201.  
**Nervenfasern**, Färbung LXIV 249.  
 — marklose, Färbung LXIV 258.  
 — variköse LXIV 180.  
 — — Wesen LXIV 184.  
**Nervenzellen**, Veränderungen nach Entzündung LXIV 259.  
**Netzhautbilder**, Einfluß von Zylindergläsern auf die Lokalisation der LXII 462.  
 — Größe bei Aphakie, Berechnung LXV 21.  
**Netzhautmeridiane**, korrespondier., abnorme Lage bei Vertikalablenkungen LXII 432.  
**Netzhautreizung**, intermittierende LXVIII 395.  
 — Ermüdbarkeit, periphere und zentrale LXVIII 403.  
 — Flacker- und Flimmer-Stadium LXVIII 396.  
 — Untersuchungstechnik LXVIII 401.  
 — s. auch Verschmelzungsfrequenz.  
**Neubildungen, tuberkulöse**, Resistenz der Blutgefäße in LXI 203.  
 — — Umwandlung in Granulationsgewebe LXI 204.  
**Neugeborene**, Chorioidea, Dicke der LXVII 312.  
 — Conjunctiva, Histologie LXIII 290.  
 — Hornhautradius LXX 132.  
 — Hornhauttrübung, vorübergehende LXIV 225.  
 — Iris LXVIII 265.  
 — — hintere Grenzschichten LXIV 148.  
 — Irisfarbe LXVIII 33.  
 — Irishyperämie und -verfärbung LXIV 225.  
 — Refraktion LXX 131.  
 — Retina, Blutungen LXIX 476.

**Neugeborene, Retina, Dicke der** LXVII 313.

— Sklera, Dicke der LXVII 313.

— Unwirksamkeit des Atropins, Ursache LXVIII 33.

**Neurasthenie** bei latenten Gleichgewichtsstörungen LXII 419, 424, 428.

— okulare Therapie bei LXII 428.

— — — Einfluß der Suggestion LXII 429.

— Symptome LXII 423.

**Neurektomia optico-ciliaris** bei absolut. Glaukom LXIV 407.

**Neuritis optica, Adaptation** bei LXV 398.

— Drusen der Papille bei LXIX 381.

— bei experimenteller sympath. Entzündung LXII 213.

— Gesichtsfeld bei LXV 398.

— bei intraokularen Tumoren LXIII 73, 81.

— e. Lue. Lumbalpunktion bei LXV 81.

— bei Orbitalphlegmone LXI 482.

— bei Parotitis LXX 255, 269.

— bei perforiertem Hornhautgeschwür LXVI 440.

— bei sympath. Ophthalmie LXIX 562.

— — — Pathogenese LXIX 563.

— Trennung von Stauungspapille LXIX 327, 435.

— Vergrößerung des blinden Flecks, LXV 398.

**Neuritis optica interstitialis** bei Intoxikations-Amblyopie LXI 520.

— nach Unterbindung des Optikus LXIV 516, 526.

**Neuritis optica retrobulbaris, Ätiologie** LXV 445.

— bei Erkrankungen der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 445.

— — — Ein- und Doppelseitigkeit LXV 445.

— — — Gesichtsfeld LXV 446, 452.

— — — ophthalmoskop. Befund LXV 446, 456, 460.

— — — Sehstörung LXV 445.

— — — zentrales Skotom LXV 445, 448, 452, 454, 456, 457, 459, 460.

— Licht- und Farbensinn, diagnostische Bedeutung LXVI 504.

— sympathica LXI 434.

— Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 273.

**Neuroglia** des Optikus, s. d.

— der Retina, s. d.

— Wucherung im atrophischen Optikus LXI 61.

— in der Retina LXIII 3, LXIV 317.

Schlaefke, General-Register.

**Neuroretinitis** albuminurica, Adaptation bei LXV 400.

— — Gesichtsfeld bei LXV 400.

— — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 274.

— bei Myxödem LXI 500.

— Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 275.

**Neurosen** bei Gleichgewichtsstörungen LXII 418, 423.

**Neurotomia optico-ciliaris** bei sympath. Entzündung LXI 450.

**Nieren, Lymphosarkom** der LXII 136.

— Sarkometastasen LXIII 473, 476.

**Nissl'sche Methode** LXI 504, LXIII 85.

**Nyktalopie** bei Amblyopien LXV 388.

— Blendungserscheinungen bei LXV 389.

**Nystagmus** bei Katarakta congenita LXV 8.

— in den Endstellungen LXX 342, 346, 350, 356.

— bei Hirnabszeß LXIX 438.

— bei Hydrophthalm. congenit. LXVII 175.

— bei Irideremie LXX 65, 77.

— — — Ursache LXX 79.

— bei Mikrophthalmus LXV 389.

— rotatorius LXV 186.

— Scheinbewegung bei LXVI 191.

— bei Turmschädel LXVIII 419.

## O.

**Oberflächenparallele Lagerung** neugebildeter Hornhautlamellen LXII 541.

**Oberlidenysten, Entstehung** LXVII 256.

**Obskurationen** bei Stauungspapille, Ursachen LXV 97.

**Obstipation** bei latent. Vertikalschielen LXII 419.

**Occipitallappen, Erweichung, ohne Hemianopsie** LXII 334.

— — Sehstörungen bei LXII 333.

— Gefäßverteilung im LXII 289, 300, 306, 312.

— Restitution bei Rinden- und Faserdefekten LXII 365.

— Sitz des optischen Zentrums LXII 343.

— thrombotische Veränderungen LXII 299, 306.

— Veränderungen bei Rindenblindheit LXII 291, 296.

**Occipitalrinde, abweichende Schichtung der Zellelemente** LXII 339.

**Ochsenlinse, isotonische Kochsalzlösung** LXII 89.

**Occlusio pupillae**, Operationsmethoden bei LXIII 557.

**Oculomotorius**, Nerv., Blutung in die Scheide bei Morb. macul. Werlh. LXIV 181.

— Lähmung bei Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 453.

**Ödem** der Haut und Netzhaut bei Nephritis LXX 201.

**Öllampen**, Spektrum der LXIX 53.

**Ohrenleiden**, Papillitis und Stauungspapille bei LXIX 344.

**Ohr-Pupillarreflex** LXI 573.

**Operationsnarben** der Cornea, Pigmenteinschlüsse LXIII 545.

**Ophthalmia electrica**, Rolle der ultraviol. Strahlen LXIX 50, 59.

— — Symptome LXIX 49.

**Ophthalmoplegia interior** bei Parotitis LXX 267.

**Ophthalmoskopischer Befund** bei: Aderhautherden bei Myopie LXVII 430, 433.

— — Aderhautsarkom LXIII 71.

— — Bleiintoxikations-Amblyopie LXV 387

— — Chininvergiftung LXX 248

— — Cyanosis retinae LXVIII 183, 185.

— — Drusen des Sehnervenkopfes LXIX 356, 357, 359, 361, 374, 377.

— — Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 268.

— — Embolie der Art. central. ret. LXIII 398, 399, 400, 401, 402, 403.

— — Evulsio n. optici LXVII 367.

— — hämorrhag. Infarkt der Retina LXI 309.

— — Hemianopsie LXX 378.

— — Hunden LXI 512.

— — Hydrophthalm, congenit. LXIII 535.

— — Kaninchen LXVI 37.

— — Morbus macul. Werlhofii LXIV 177.

— — Netzhautablösung LXIV 383, 386.

— — Neuritis retrobulb. infolge Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 446, 456, 460.

— — Optikusatrophie, einfacher, mit physiolog. Exkavation LXVIII 130, 132, 134, 150.

— — — Untersuchung mit Tageslicht LXV 502.

— — Optikusdurchschneidung LXIV 263.

— — Optikusunterbindung LXIV 516.

— — Orbitalphlegmone LXI 482.

— — präretinaler Blutung LXIII 419, LXX 275, 277, 284, 290, 293, 311.

**Ophthalmoskopischer Befund** bei: Pseudogliom LXX 112, 118, 120.

— — Retinitis punctata albescens LXIII 282, 283.

— — Retino-chorioiditis juxtapapillaris LXIX 45.

— — Skleritis posterior LXIV 380, 383, 386.

— — Stauungspapille LXV 74, 82, 85.

— — sympathischer Entzündung LXIX 560, LXX 465.

— — Thyreoidinamblyopie LXI 512, 518.

— — Verschuß der Arteria macularis LXI 17.

— — — der Zentralarterie LXI 57.

— — — der Zentralvene LXI 284.

**Ophthalmoskopische Untersuchung**, Bedeutung der Lichtintensität LXV 508, 510.

— — der Lichtquelle für die Farbenschatzung LXII 2, LXV 509.

— — des Tageslichts LXII 3.

— — Farbe des Augenhintergrundes LXII 49.

— — mit der Quecksilberbogenlampe LXII 7, 11, LXV 508.

— — mit Tageslicht LXII 8, LXV 499.

— — — — — Farbe des Augenhintergrundes LXII 3, LXV 500.

— — — — — Einfluß des Lebensalters LXV 501.

— — — — — Farbe der Papille LXXV 500, 509.

**Optikus**, Nerv., Anomalie beim Fötus LXIX 463.

— — Aplasie LXI 361, LXV 202, 213.

— — und Kolobom LXV 214.

— — Artefakte im LXIV 280.

— — Atrophie, s. Atroph. n. opt.

— — Beziehung zum äußern Kniehöcker, bei der Ratte LXVII 82.

— — Blutung in den, bei Verschuß der Zentralgefäße LXI 23.

— — Defekt im Stamm des LXV 201.

— — Degeneration nach Durchschneidung LXIV 237, 238, 251, 258, 261, 265.

— — — — — von Ciliargefäßen LXIV 266.

— — — — — Schnelligkeit LXIV 258.

— — — bei multipler Sklerose LXIV 329.

— — — im phthisischen Auge LXIV 325, 326.

— — — — — ascendierende, bei Glaukom LXIV 311, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322.

— — — — — Schnelligkeit LXIV 306.

— — — — — bei Ulcus corneae LXIV 289, 302, 306.



- Optikus, Evulsio, Begriff LXVII 365.
- Häufigkeit LXVII 366.
- ophthalmoskop. Bild LXVII 367.
- Verhalten der Duralscheide LXVII 368.
- Verhalten der Lamina cribrosa LXVII 368.
- Faltenbildung im Konus myopicus LXVII 386, 400, 429.
- Faserquellung nach Unterbindung LXIV 535.
- Fehlen bei Cyklopie, Ursache LXVIII 256.
- bei Mikrophthalmus LXI 353, 361.
- Fixierungsmethode LXIV 281.
- fleckförmige Fettdegeneration LXIV 279, 289, 297.
- Gefäße LXV 468.
- Gliazellen, phagocytaire Rolle LXV 467.
- Proliferation LXV 466.
- Hypoplasie LXV 204.
- Insel von Pigmentepithelien im LXIX 464.
- Intervaginalraum, s. Scheidenraum.
- Kolobom, s. Coloboma n. opt.
- Leitungsbahn bei sympath. Entzündung LXI 410.
- Lückenbildung nach Unterbindung LXIV 527.
- Lymphströmung im LXIV 534, LXX 105.
- Markscheiden-Entwicklung LXX 378.
- Nervenfasern, Entwicklung LXV 214.
- Fehlen bei Aderhautkolobom LXV 213.
- — — Anencephalie LXVIII 267.
- — — Cyklopie LXVIII 246, 261.
- — — Mikrophthalmus LXVIII 305, 312.
- Ödem bei Embolie der Zentralarterie LXIII 400, 407.
- bei Filixextrakt-Vergiftung LXV 470.
- toxisches, bei Erkrankung der hint. Nebenhöhlen der Nase LXV 476.
- Wirkung auf die Nervenfasern LXV 470.
- pathologische Anatomie bei: Chininvergiftung LXX 249.
- — Cyanosis retinae LXVIII 192.
- — Cyklopie LXVIII 246.
- — Embolie der Zentralarterie LXIII 400, 407.

- Optikus**, pathologische Anatomie bei:  
 experiment. Glaukom LXVI 349, 388, 399, 407.  
 — — — Hydrophthalm. congenit. LXIII 489, 494.  
 — — — Intoxikations-Amblyopie LXV 478.  
 — — — Kolobom LXV 194, 211.  
 — — — Methylalkohol-Amblyopie LXV 471.  
 — — — Mikrophthalmie LXIII 41, LXVII 191, 198, 200, 204, 215, LXVIII 305, 434.  
 — — — Myopie LXVII 393, 396, 398, 400, 401, 404, 418.  
 — — — Retinitis septica LXX 281.  
 — — — Rindenblindheit LXII 302.  
 — — — Stauungspapille LXV 83, 84, 85, 86, 462, LXIX 293, 329, 340, 342.  
 — — — des sympathisierenden Auges LXIV 410.  
 — — — Thyreoidin-Amblyopie LXI 507, 508, 509, 510, 516.  
 — — — zentralem Skotom LXV 463.  
 — — — — Gefäße LXV 468.  
 — — — — Nervenfasern LXV 465.  
 — — — — Neuroglia LXV 466.  
 — — — — Septen LXV 465.  
 — Pigmentepithel-Einwanderung LXVIII 234.  
 — Sarkom, mikr. Befund LXIII 476, LXIX 285.  
 — Scheiden, Ampulle, Vorkommen LXIX 414.  
 — — — bei Stauungspapille LXIX 333, 336, 414.  
 — — — elastische Fasern, Vermehrung bei Glaukom LXVI 384.  
 — Scheidenraum, Bindegewebswucherung im LXVII 11, 27.  
 — — — Blutung in den LXIV 181, 182.  
 — — — Druck im LXV 97.  
 — — — Entwicklung LXVIII 246.  
 — — — Eröffnung bei Stauungspapille LXV 80, LXIX 436.  
 — — — Erweiterung bei Myopie LXV 211, 213, LXVII 392.  
 — — — Flüssigkeit im, Absonderung LXV 71.  
 — — — — Menge LXIV 532.  
 — — — Flüssigkeitsstrom im, Richtung LXIV 512, 533, 535, LXIX 443.  
 — — — Konkreme im LXIX 8.  
 — — — Obliteration bei Cyanosis retin. LXVIII 192.  
 — — — — bei Meningitis LXIV 540.  
 — Septensystem bei anthropoiden Affen LXII 274.  
 — Tuberkulose LXI 195.
- Optikus**, Tuberkulose, entzündliche LXI 196.  
 — — — Formen LXI 195.  
 — — — Häufigkeit LXI 195.  
 — — — bei Haustieren LXI 213.  
 — — — — Pathogenese LXI 213.  
 — — — knötchenförmige LXI 195.  
 — — — Pathogenese LXI 195.  
 — — — beim Rind LXI 213.  
 — — — beim Schwein LXI 173, 214.  
 — — — tumorartige LXI 196.  
 — Unterbindung bei Tieren LXIV 515.  
 — — — Faserquellung LXIV 535.  
 — — — Hornhauttrübung LXIV 518.  
 — — — Hydrops vaginae LXIV 525.  
 — — — interstitielle Neuritis LXIV 516, 526.  
 — — — intraokularer Druck LXIV 516, 525, LXVI 326.  
 — — — Lückenbildung nach LXIV 527.  
 — — — mikr. Befund LXIV 516, 526.  
 — — — ophthalm. Befund LXIV 516, 523.  
 — — — Stauungspapille LXIV 528.  
 — — — Verhalten der Gefäße LXIV 528.  
 — — — der Lamina cribrosa LXIV 527.  
 — Venen LXV 72.  
 — Verhalten bei Zinnobereinspritzung in den Subarachnoidealraum LXIV 528.
- Optisches Erinnerungszentrum** LXX 395.  
 — — — Einseitigkeit LXX 396, 400.
- Optische Fasern**, Verlauf im Kniehöcker LXII 353.  
 — — — in der Sehstrahlung LXII 354, 356.
- Optisches Rindenfeld**, s. Sehsphäre.
- Optisches Wahrnehmungszentrum** LXX 394.
- Opto** LXIV 566.
- Optotypen**, s. Sehprobentafel.
- Ora serrata**, entwicklungsgeschichtl. Verschiebung LXIX 156.
- Orang Utang**, Auge des LXII 251.  
 — Abstand der Fovea centr. von der Papille LXII 273.  
 — äußere Augenmaße LXII 252.  
 — Chorioidea, Dicke LXII 259.  
 — Ciliarmuskel LXII 261.  
 — Dilator LXII 266.  
 — Duralscheide, Dicke LXII 274.  
 — Eintrittsstelle der Zentralgefäße LXII 274.  
 — — — Hornhaut, Dicke LXII 255.  
 — — — Durchmesser LXII 254.  
 — — — Radius LXII 255.  
 — Optikus LXII 273.  
 — — Septen LXII 274.

**Orang Utang**, Papille, Durchmesser LXII 273.

— — physiolog. Exkavation LXII 273.

— Retina, Dicke LXII 272.

— Sklera, Dicke LXII 257.

**Orbicularis ciliaris**, Entwicklungsgeschichte LXIX 156.

— Pigmentepithelzellen, Befestigung der LXIX 155.

**Orbita**, Abszeß, operative Therapie LXV 457.

— Dermoidcysten, Entstehung LXIII 16.

— Encephalocele LXIII 17.

— Entwicklungsgeschichte LXIV 211.

— Geschwülste, descendierende Degeneration des Optikus und der Retina bei LXIV 331.

— lymphomatische LXII 130, 133, 137.

— — Aggressivität LXII 146.

— — bei Chlorom LXII 158.

— — — Doppelseitigkeit LXII 191.

— — — mikr. Befund LXII 139, 142.

— — — Pathogenese LXII 143.

— — — Rückbildung LXII 150.

— — — Wachstum LXII 150.

— Gliom LXIII 13.

— Granulationsgewebe in der leeren LXI 223.

— Karzinom LXV 460, 472.

— Knorpelgewebe LXIV 213.

— leukämische Tumoren, symmetrische LXII 190.

— lymphadenoides Gewebe in der LXII 144, 164.

— und Nase, venöse Verbindungen LXI 477.

— — — Zusammenhang der Erkrankungen von LXI 478.

— und Rachen, Zusammenhang der Erkrankungen von LXI 479.

— der Taube LXIII 90.

— Teratoma congenit. LXIII 1.

**Orbitalphlegmone** mit Abszeßbildung im Gesicht LXI 472.

— — — in der Umgebung LXI 457.

— Ätiologie LXI 459, 470, 474, 476.

— Amaurose bei LXI 467, 468, 482.

— Beteiligung der Nasenschleimhaut LXI 474.

— ophthalmoskop. Befund LXI 482.

— und -periostitis, Diff.-Diagnose LXI 461.

— Prognose LXI 481.

— Rachenaffektion bei LXI 479.

— mit Schläfenabszeß LXI 462.

— — — Zusammenhang LXI 470.

— Sehstörungen bei, Ursache der LXI 482.

**Orbitalphlegmone**, sektorenförmiger Gesichtsfelddefekt LXI 459.

— Symptome LXI 461.

— Therapie LXI 480.

— und Thrombophlebitis, Diff.-Diagnose LXI 462.

— Verbreitungswege LXI 480.

**Orbitalvenen**, Thrombose, Diagnose LXI 462.

**Orbitopalpebralcysten** bei Anophthalmie, Kasuistik LXVII 217.

— — — Pathogenese LXVII 249.

— — — patholog. Anatomie LXVII 230.

— Größe LXVII 224, 259.

— Gruppen LXVII 228, 249, 260.

— Inhalt LXVII 225.

— Komplikationen LXVII 225.

— bei Mikrophthalmie LXVII 185, LXVIII 301, LXX 314.

— — — Kasuistik LXVII 217.

— — — patholog. Anatomie LXVII 228.

— Pathogenese LXVII 233, 249.

— patholog. Anatomie LXVII 226, 260.

— — — Außenschicht LXVII 226.

— — — Innenschicht LXVII 226.

— Retina, aktive Wucherung LXVII 252.

— — perverse Lagerung LXVII 189, 196, 226, 237, 244, 249, 263, LXX 316.

— im Unter- und Oberlid LXVII 224, 259.

— Verwachsung mit der Orbitalwand LXVII 225.

**Orchitis** bei epidem. Parotitis LXX 261, 266, 270.

**Orientierung**, Zustandekommen LXII 372.

**Orientierungsstörungen**, Erklärung LXII 372, LXX 397.

— bei Hemianopsie LXX 357.

**Orthophorie** LXII 400.

— absolute Horizontaldivergenz bei LXII 412.

— — Vertikaldivergenz bei LXII 412.

**Ovarien**, Dermoidcysten, Erklärung LXIII 14.

## P.

**Pannus degenerativus** LXIX 1, 11.

— — klinisch. Bild LXIX 14.

— — mikr. Befund LXIX 4, 20, 24.

— — Verhältnis zur Keratitis bullosa LXIX 16.

— — — zum Totalstaphylom d. Corn. LXIX 25.

— glaukomatosus LXIV 319.

**Pannus** bei Keratitis parenchymat. LXII 530.  
 — leukämicus LXII 172.  
 — Pathogenese LXII 531.  
 — skrophulosus LXIX 11.  
 — trachomatosus LXIX 11.  
**Papagei**, Tuberkulose der Conjunct. LXI 153, 199.  
**Papille**, Bindegewebswucherung vor der LXI 23.  
 — Blutung in die LXIV 303.  
 — cystenartige Hohlräume LXVIII 233.  
 — Drusen LXIX 355.  
 — Durchmesser bei anthropoid. Affen LXII 273.  
 — Exsudation auf der LXI 443.  
 — Farbe bei Quecksilberbogenlicht LXV 509.  
 — — normale LXII 4, 9, 64.  
 — — bei Tageslicht LXV 509.  
 — Fehlen bei Cyklopie LXVIII 255, 261.  
 — — bei Mikrophthalmie LXVIII 305, 311, 313.  
 — — — — Pathogenese LXVIII 316.  
 — Kleinheit LXVII 29.  
 — leukämische Infiltration LXII 174.  
 — Pigmenteinwanderung LXVIII 18.  
 — Schaltgewebszapfen LXVIII 140.  
 — Schrägstellung bei Optikuskolobom LXV 194, 205, 211.  
 — Vortreibung durch Druck LXIX 415.  
 — — — — experimentelle Methode LXIX 417.  
 — — — — mittels Agar LXIX 426.  
 — — — — — Paraffin LXIX 426.  
 — — — — — Quecksilber LXIX 422.  
 — — — — — Vaseline LXIX 426.  
 — — — — durch Entzündungsreize LXIX 427.  
 — — — — Ameisensäure LXIX 430.  
 — — — — Elektrolyse LXIX 428.  
 — — — — Jequirity LXIX 428.  
 — — — — Liquor Ammonii caust. LXIX 429.  
 — weiße Verfärbung bei Atrophie. Ursache LXIV 330, 333.  
**Papillitis** bei Aderhautsarkom LXIII 73.  
 — bei Cyanosis retinae LXVIII 179, 194.  
 — bei Skorbut LXIV 175.  
**Papillo-makuläre Fasern**, Erkrankung bei Intoxikat.-Amblyopie LXV 478.  
**Paracenthese**, s. Kammer, Punktion.  
**Paraffininjektionen**, subkutane, Embolie der Zentralarterie nach LXI 75.  
**Parallaktische Verschiebung** im aufrechten Bild LXI 487.

**Parallaktische Verschiebung**, entoptische LXV 527, LXVI 161, 181.  
 — im umgekehrten Bild LXI 487.  
**Paranoia**, Sehnervenatrophie bei LXVIII 130.  
**Paraplegia inferior** bei Parotitis epidem. LXX 267.  
**Parinaud'sche Erkrankung** LXII 146, LXIII 52.  
 — Ätiologie LXIII 57.  
 — Differentialdiagnose LXIII 56.  
 — Ein- und Doppelseitigkeit LXIII 53.  
 — Halslymphome LXIII 53.  
 — Infektiosität LXIII 58.  
 — klinische Erscheinungen LXIII 53, LXVII 76.  
 — Mikroorganismen LXIII 55.  
 — mikr. Befund LXIII 59, 63.  
 — Nekrosen LXIII 63.  
 — Therapie LXIII 55, 57.  
 — Verlauf LXIII 57, 66.  
**Parotitis epidemica**, Akkommodationslähmung bei LXX 269.  
 — Albuminurie bei LXX 267, 271.  
 — Allgemeinerscheinungen LXX 261.  
 — Dauer LXX 261.  
 — Diabetes insipid. bei LXX 259.  
 — — mellit. bei LXX 271.  
 — Exophthalmus bei LXX 270.  
 — Facialislähmung bei LXX 258, 263, 265.  
 — Fieber LXX 261.  
 — Häufigkeit LXX 260.  
 — Iridocyklitis bei LXX 264.  
 — Iritis bei LXX 262.  
 — Lähmung des musc. rect. int. LXX 270.  
 — Lokalisationen LXX 261.  
 — Mydriasis bei LXX 271.  
 — Nervenaffektionen bei LXX 265.  
 — mit Nervenaffektionen und Iridocyklitis LXX 263.  
 — Neuritis optica bei LXX 269.  
 — Ophthalmoplegia interna bei LXX 267.  
 — Orchitis bei LXX 261, 266, 270.  
 — Paraplegia inferior bei LXX 267.  
 — Prodrome LXX 260.  
**Pars ciliaris ret.**, s. Retina.  
**Pavor nocturnus** bei latent. Vertikalschielen LXII 419.  
**Pemphigus** LXVII 166.  
**Pepton**, Diffusion in die Linse LXII 111.  
**Perifolliculitis acarica** LXIX 502.  
**Perineuritis retrobulbaris intracanalicularis** LXV 443.  
**Periosterkrankung** bei Chlorom LXII 156.

**Peritheliom** LXIX 81, LXX 332.  
 — mikr. Befund LXX 334.  
**Petroleum**, Lichtstärke LXVI 460.  
**Petroleumlampe** als Arbeitslampe LXIX 74.  
**Pferd**, Tuberkulose d. A. LXI 154.  
**Phagocyten** im Trachomfollikel LXIII 299.  
**Phagocytose** bei Injektion von elektrol. dargestellt. Eisen in die vordere Kammer LXVI 397.  
 — der Retina-Pigmentepithelzellen LXVIII 198.  
 — bei Ulcus corn. serp. LXV 292, 293.  
**Phakokele**, Bezeichnung LXVII 41.  
 — post trauma LXVII 52.  
 — — — Entstehung LXVII 55.  
 — post ulcus, cas. LXVII 42.  
 — — — Drucksteigerung LXVII 43.  
 — — — Entstehung LXVII 44.  
 — — — Bedingungen: Drucksteigerung LXVII 50.  
 — — — Größe und Beschaffenheit der Linse LXVII 47.  
 — — — Größe der Perforationsöffnung LXVII 46.  
 — — — zentrale Lage der Perforationsöffnung LXVII 44.  
**Phakolyse**, s. Myopieoperation.  
**Phenol**, Diffusion in die Linse LXII 121.  
**Phyktäne**, Pathogenese LXVI 69.  
**Phorometer** LXIX 185.  
**Photographische Methode** für Absorptionsbestimmungen LXIII 137, 150.  
**Photometer** von Förster LXV 378, 414, LXVI 456.  
 — — — modif. von Koster LXVI 497.  
 — von Gullstrand LXII 30.  
 — — Hori LXVI 456.  
 — — Lummer LXI 534.  
 — — Martens LXII 38.  
**Phototropismus** LXIII 108.  
**Phthisis bulbi**, Degeneration der Netzhaut und des Sehnerven bei LXIV 324.  
 — nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 268.  
 — Erhaltung der Netzhaut und des Sehnerven bei LXIV 269, 271.  
 — bei Iridoeyklitis spontanea LXI 376.  
 — mikr. Befund LXI 432, LXIV 325, 326.  
 — bei Sarkom der Chorioidea LXI 376, LXIII 79.  
 — bei Tuberkulose d. A. LXI 217.  
**Pigment**, Eisenreaktion LXI 225.  
**Pigmentablagerung** in den Netzhautkapillaren LXIV 182.

**Pigmentatrophie** der Retina, Verhalten der Adaptation bei LXV 409.  
**Pigmentbeschläge** der Descemetis, Bedeutung LXIII 545.  
**Pigmentbildung** in epitheloiden Zellen LXI 383.  
**Pigmenteinschlüsse** in gewuchertem Hornhautendothel LXI 446, LXIII 485, 507, 546.  
 — in Operationsnarben der Hornhaut LXIII 545.  
**Pigmentierung** des Hornhautepithels bei anthropoid. Affen LXII 256.  
 — der Lider, bei Demodexerkrankung LXIX 512.  
 — subkonjunktivale, nach Skleralruptur LXVIII 484.  
 — — — Entstehung LXVIII 490.  
 — — — Kasuistik LXVIII 488.  
**Pigmentkörnchen** in Riesenzellen LXI 189, 201, 207.  
**Pigmentkörnchenzellen** LXI 86, 274.  
**Pigmentnävi** der Iris LXV 437.  
**Pigmentstreifenbildung** in der Netzhaut LXVII 298, LXVIII 175.  
 — — — cas. LXVII 299.  
 — — — Ätiologie LXVII 299, 304.  
 — — — ophthalm. Bild LXVII 298.  
**Pigmentverschleppung** in den Kammerwinkel LXI 353.  
**Pigmentwucherung** der Ciliarfortsätze LXV 62.  
 — im Mikrophthalm. cong. LXI 362.  
**Plasmazellen**, Begriff, morphologischer LXIII 47.  
 — — tinktorieller LXIII 46.  
 — Emigrationstheorie LXIII 48.  
 — und Epitheloidzellen LXIII 65.  
 — Färbungsmethode LXIII 59, LXVIII 116.  
 — Geschwulstbildung aus LXVIII 123.  
 — Granulationstheorie LXIII 47.  
 — Größe LXIII 60.  
 — Herkunft LXIII 47.  
 — — aus Adventitialzellen LXIII 313, LXVIII 123.  
 — — hämatogene LXIII 48, 64, 311.  
 — — histogene LXIII 311.  
 — Lymphomtheorie LXIII 51.  
 — mikr. Befund (Morphologie) LXIII 59, 62, 65.  
 — Rolle bei der Entzündung LXIII 47, LXIX 517.  
 — Schicksal LXIII 50, 66.  
 — im Trachomfollikel LXIII 304, 307, LXIX 512, 515.  
 — Vermehrung LXIII 60, 62.  
 — Vorkommen LXIII 47, 310.  
**Plasmodium** LXII 507.  
**Plasmon** LXIII 48.

- Plasmom** der Conjunctiva und Cornea LXVIII 114.  
 — — — Ätiologie LXVIII 122.  
 — — — hyaline Kugeln LXVIII 116, 121.  
 — — — Mastzellen LXVIII 116, 118, 119.  
 — — — mikr. Befund LXVIII 115, 117.  
 — — — Plasmazellen LXVIII 116, 118, 120.  
 — — — Unterschied von amyloiden Tumoren LXVIII 121.
- Platinchlorid** zur Fixierung des Sehpurpurs LXI 562.
- Plica centralis** LXII 64.
- Pneumokokken**, Impfung in die vordere Kammer LXIV 117.  
 — bei Iridochoioiditis LXII 225.  
 — bei Pneumonie LXV 289.  
 — im Tränensackleiter LXII 223.  
 — beim Ulcus corn. serp. LXII 219, LXIV 289.  
 — — — Veränderungen nach Keratotomie LXV 292.
- Pneumokokken-Infektion** d. A. bei Pneumonie LXII 225.
- Polyblasten** LXVI 208.  
 — Differenzierungsformen LXIX 514.  
 — im Trachomfollikel LXIX 513.
- Polydaktylie** bei Hydrophthalm. cong. LXIII 228.
- Polykorie** LXVIII 265.
- Präaurikulardrüse**, Schwellung bei akutem Trachom LXIX 536.
- Präretinale** Bindegewebsneubildung LXI 23, 132, LXIV 167.  
 — Blutungen, s. unter Blutungen.  
 — Pseudomembran nach Glaskörperverlust LXX 493, 497, 503.  
 — zellige Gewebebildung bei Ablösung LXVIII 60, 63, 73, LXX 534.  
 — — — bei Retinit. prolif. LXVIII 66.
- Projektionsfasern**, Myelinisation LXII 340.
- Projektionstheorie** LXVI 136.
- Protoplasmafärbung** nach Held LXVII 318.
- Protozoen** in Epithelzellen LXIX 541.
- Protrusio bulbi**, s. Exophthalmus.
- Prowazek'sche Körper**, Bedeutung LXIX 540.  
 — bei Blennorrhoe LXIX 539.  
 — Mutationsfähigkeit LXIX 541.  
 — bei Trachom LXIX 528, 538.
- Psammomkörner** in der Retina LXIV 325.
- Pseudocysten** d. A., Begriff LXVIII 495.
- Pseudodiphtheriebazillen** LXII 212, 218.
- Pseudogliom** LXI 363, LXX 111.  
 — Drucksteigerung LXX 122.  
 — mikr. Befund LXX 113, 118, 120.  
 — ophthalm. Befund LXX 112, 118, 120.  
 — Pathogenese LXX 121.
- Pseudoleukämie**, Begriff LXII 130.
- Ptosis** bei Parinaud'scher Conjunctivitis LXIII 54, 57.  
 — nach Verletzung des Seitenhauptkerns LXX 555, 562.
- Pulsfrequenz** bei Hydrophthalmus cong. LXIII 231.
- Pupillarfaser**, Kreuzung LXX 368, 384, 385.  
 — Widerstandsfähigkeit LXX 365.
- Pupillarloch** und Linse, Entwicklungsgesch. LXIII 442.
- Pupillarmembran**, s. Membr. pupill.
- Pupillarrand**, Ektrop., s. d.  
 — Entrop., s. d.  
 — Entwicklung LXVIII 23.  
 — Typen LXVIII 23.
- Pupillarreflex**, Beziehung zur Bogenfaserung LXX 550, 561.  
 — — zum Okulomotoriuskern und nächster Umgebung LXX 553.  
 — — zum vorderen Vierhügel LXX 546, 561.  
 — Einfluß der Narkose LXX 545.  
 — nach Optikusdurchschneidung LXI 570.
- Pupillarreflexbahn** LXX 368.
- Pupillarreflexzentrum** LXX 368, 545.
- Pupillen**, Verhalten bei Hemianopsie LXX 383.  
 — — bei Thyreoidinvergiftung LXI 508, 509.
- Pupillenabstandsmesser** LXV 176.
- Pupillendifferenz** bei einseitiger Durchtrennung des Optikus LXX 385.  
 — — intensiver Belichtung LXX 384.  
 — — Hemianopsie LXX 383, 399.
- Pupillenerweiterung**, s. Mydriasis.
- Pupillen-Reaktion**, s. auch Irisbewegung.  
 — bei Embolie der Art. centr. ret. LXV 115.  
 — Erhaltung bei Amaurose infolge doppelseit. Hemianopsie LXX 365.  
 — — — durch Optikusatrophie LXX 364.  
 — hemianopische LXV 73, LXX 343, 344.  
 — Iris-Veränderungen bei LXIV 362.  
 — auf Lidschluß LXI 573.  
 — bei Optikusatrophie LXV 113, 114.

**Pupillenreaktion** nach Optikusdurchschneidung LXV 106.

**Pupillenschwarten**, s. Katarakta secund.

**Pupillenspiel**, s. Irisbewegung.

**Pupillen-Untersuchung**, Bedeutung der Beleuchtung LXV 134.

**Pupillenverengerung**, s. Miosis.

**Pupillenweite** und Dicke der Iris LXIV 348.

— Einfluß auf die Akkommodation bei Aphakie LXV 24.

— — auf die Sehschärfe LXVI 465.

— Entwicklung LXVIII 337.

— im Gleichgewichtszustand der Iris LXIV 346.

— postmortale LXIV 347.

**Pupillomotorischer Bezirk** der Retina LXX 387, 400.

**Purpura hämorrhagica**, Augenveränderungen bei, pathol. Anat. LXIV 176.

**Pykuomorphie** LXI 505.

**Pyknose** der Zellkerne LXVI 218.

## Q.

**Quadrantenhemianopsie** LXII 346, 354, 355, 357, 360.

**Quecksilberbogenlampe**, zur fokalen Untersuchung LXII 11.

— Linienspektrum LXII 8, LXV 497, 509.

— zur ophthalmoskop. Untersuchung LXII 7, 11, 378, LXV 497, 508, LXVI 158.

— Spektrum LXIX 57.

**Quecksilberinjektion** in den Glaskörper, eitrige Perforation der Linsenkapsel nach LXV 66.

**Quecksilbertrübung** der Hornhaut, Aufhellung LXIII 364, 385.

— — durch Quecksilberalbuminat LXIII 344.

— — durch Quecksilbermukoid LXIII 345.

— — — Verlauf LXIII 346.

— — — Vorkommen LXIII 346.

**Querschnitt**, Bedeutung bei Gefäßuntersuchungen LXI 7.

## R.

**Rachenerkrankung** bei Orbitalphlegmone LXI 479.

**Radiumstrahlen**, biologische Wirkung, Ersatz durch Lecithin und Cholin LXV 327.

— therapeutische Wirkung LXVI 118.

**Ranula**, Pathogenese LXI 348.

**Ratte**, Anophthalmus congen. und Sehbahnen bei der LXV 101, LXVII 81.

— Gudden'sche Kommissur LXVII 81.

— Kniehöcker, Beziehung des Optikus zum LXVII 82.

— — Faserverlauf im LXV 104.

— Kreuzung im Chiasma LXV 101.

— Muskelzellen in der Chorioidea LXVII 351.

— vordere Kammer, Entwicklungsgesch. LXIII 442.

**Recurrensparalyse** LXX 258.

**Refraktion**, Begriff LXX 134.

— Einfluß auf den Lichtsinn LXI 544.

— bei Hydrophthalm. congen. LXIII 216.

— bei Iriskolobom LXVI 271.

— und Kammerwinkel LXIII 449.

— der Neugeborenen LXX 131.

— normale LXX 134.

— — Gang während des Lebens LXX 142.

— sphärische, Änderung bei Astigmatismus LXX 197.

— und Strabismus LXIX 550.

**Refraktionsänderung** und Achsenverlängerung LXX 56.

— — bei Skleritis post. LXIV 390.

**Refraktionserhöhung** durch Zunahme des Brechungsindex LXV 35.

— abnorme LXV 42.

**Regeneration** der Cornea LXII 531.

— von Sehnen LXII 542.

**Reh**, Tränenröhrchen, Entwicklung LXII 390.

**Reizaddition**, binokulare LXI 529, 544.

**Reizschwelle** LXI 538, LXVI 501.

— im Dunkeln LXV 365, 367.

— Einfluß des Allgemeinbefindens LXI 541.

— — der Tageszeit LXI 542.

— Unbeständigkeit LXV 365.

— bei Unterbrechung der Adaptation LXI 530, 545.

— Untersuchungsmethode LXV 366.

**Rekonstruktion** des Flächenbildes aus der Schnittserie LXVII 389.

— des Längsschnittes aus den Querschnitten LXI 9.

**Restitution** bei Rinden- und Faserdefekten des Gehirns LXII 365, 369.

**Retina**, s. auch, Netzhaut.

— Ablösung, Ätiologie und Pathogenese LXIV 161, LXV 260, LXX 486, 502, 516, 524, 533.

— — — Exsudationstheorie LXVIII 56.

— — — präretinale Pseudomembran LXX 493, 497, 503, 516, 535.

**Retina**, Ablösung, Ätiologie und Pathogenese, präretinale zellige Gewebebildung LXVIII 60, 63, 73, LXX 534.  
 — — — Schrumpfungstheorie LXVIII 38, LXX 532.  
 — — bei Ablösung der Chorioidea LXI 80, LXVI 406, LXVIII 59, 68.  
 — — Adaptation, Verhalten der LXV 409, 416.  
 — — bei Aderhautkolobom LXVIII 297.  
 — — artefizielle LXI 114, 121, 128, LXIV 309, LXVI 406, LXX 482.  
 — — Atrophia nerv. optici bei LXX 528.  
 — — nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 268.  
 — — bei Endophthalmitis LXI 437, LXX 471, 477.  
 — — Ernährung der Retina bei LXX 529.  
 — — experimentelle LXX 487.  
 — — Fehlerquellen LXX 488.  
 — — — durch Glaskörperverlust LXX 488.  
 — — — Methode LXX 490.  
 — — — Pathogenese LXX 532.  
 — — — patholog. Anatomie LXX 507, 525.  
 — — — spontane Rückbildung LXX 532.  
 — — — — mikr. Befund LXX 497.  
 — — — — Vorgang LXX 506.  
 — — Faltenbildung LXX 530.  
 — — bei Glaskörper-Ablösung LXVIII 47, LXX 519.  
 — — Glaskörpergrenzschicht, Rolle bei der LXX 516.  
 — — Glaskörperschrumpfung bei LXVIII 38, 60, 69, 74.  
 — — nach Glaskörperverlust LXX 534.  
 — — Glaukom bei LXIV 385.  
 — — bei Glaukoma absolut. LXIV 158.  
 — — Gliawucherung bei LXX 531.  
 — — am Sehnervensatz LXIII 503.  
 — — hämorrhagische LXI 314.  
 — — bei Hämorrhagie, präretinaler LXIII 425, LXX 293, 300, 310.  
 — — — subretinaler LXIV 287, 288, 320, LXX 504.  
 — — Häufigkeit LXX 46.  
 — — — Alter und Geschlecht LXX 46.  
 — — — Ein- und Doppelseitigkeit LXX 46.  
 — — — bei Myopie LXX 48, 50.  
 — — — bei Nicht-Myopie LXX 49.  
 — — — spontane LXX 48.  
 — — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 221, 223, 269, 502, LXVII 172.

**Retina**, Ablösung bei Iridocyklitis LXV 192, LXIX 175.  
 — — nach Kontusion LXII 234, 235.  
 — — bei Kupfersplitter i. A. LXIV 298.  
 — — im Mikrophthalmus LXVII 214.  
 — — mikroskop. Befund LXIII 476, LXIV 158, 164, 287, 289, LXV 211, LXVI 406, LXVIII 59, 69, LXX 507, 525.  
 — — — bei Wiederanlegung LXX 506.  
 — — — bei Myopie LXX 48, 55.  
 — — — Alter LXX 50.  
 — — — Ein- und Doppelseitigkeit, LXX 50.  
 — — — Geschlecht LXX 50.  
 — — nach Myopieoperation, Disposition LXX 54.  
 — — — — Einfluß von Glaskörper-vorfall und -verlust LXX 53.  
 — — — — Häufigkeit LXX 44, 51.  
 — — — durch Narbengewebe LXIV 294.  
 — — — Netzhautrisse LXVIII 56, LXX 520, 532.  
 — — — am hinteren Pol LXVIII 59, 68.  
 — — — Typen LXX 521.  
 — — ophthalmoskop. Befund LXIV 383, 386.  
 — — bei Orbitalphlegmone LXI 482.  
 — — bei Pseudogliom LXX 112, 118, 120.  
 — — nach Punktion der vord. Kammer bei Glaukom LXVI 426.  
 — — bei Retinitis albumin. LXX 227.  
 — — — — prolif. LXVIII 66.  
 — — — — septica LXX 286.  
 — — nach Röntgenbestrahlung LXI 108.  
 — — bei Sarkom der Uvea LXIII 70, 71, 78, 473, LXVI 106, 107, LXVII 497, LXVIII 73, 233.  
 — — — — Ausbleiben LXIII 75, 82.  
 — — bei Skleritis poster. LXIV 383, 384, 389.  
 — — subretinale Flüssigkeit LXX 519, 524, 533.  
 — — Verhalten der Pars ciliaris bei LXX 529, 535.  
 — — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 275.  
 — — Abreißung durch Glaskörperschrumpfung LXVIII 50.  
 — — von der Ora serrata LXIII 503, LXVIII 71, LXX 471.  
 — — von der Papille LXIV 303.  
 — — Anomalie in der fötalen LXIX 463.  
 — — Arterien, Endarteriitis der LXI 123, 285, 300, LXIV 159, 162, 167.



**Retina**, Arterien, Sklerose LXI 132.  
 — — Verhalten bei Verschuß der Zentralarterie LXI 23, 23, 62.  
 — — — — der Zentralvene LXI 85, 110, 117.  
 — Atrophie LXI 63, 73, 110, 141, 287, LXIII 511, 518, LXIV 167, 312, 316, 317, LXVI 387, 416, LXVII 13.  
 — — Endarteriitis der Zentralarterie bei LXIV 318.  
 — Bau im Gebiet der Macula LXIII 426.  
 — Befestigung LXII 69.  
 — Bildgröße, Berechnung LXV 21.  
 — Bindegewebsbildung hinter der LXI 274, LXIV 165.  
 — — vor der LXI 23, 132, LXIV 167.  
 — Blessig'sche Hohlräume LXI 63, 134.  
 — Blutungen bei Cyanosis LXVIII 192.  
 — — nach Cyklodialyse LXVII 489, 511.  
 — — bei Erkrankungen der Gefäße LXI 110, 287, 300.  
 — — bei Lymphomatose LXII 134.  
 — — mikr. Befund LXX 302.  
 — — bei Morb. macul. Werlhof. LXIV 177, 178, 179.  
 — — bei Neugeborenen LXIX 476.  
 — — bei Orbitalphlegmone LXI 468, 482.  
 — — organisierte LXIV 159, 162.  
 — — postanämische LXI 309, 314.  
 — — präretinale, s. Blutung.  
 — — nach Punktion der vord. Kammer LXI 297.  
 — — bei Purpura hämorrhag. LXIV 194.  
 — — Resorption LXIX 477.  
 — — bei Skorbut LXIV 175.  
 — — bei Stauungspapille LXIV 538.  
 — — subretinale LXVIII 192.  
 — — bei Tuberkulose LXI 194.  
 — — bei Verschuß der Retinalvenen LXI 123.  
 — — — — der Zentralarterie LXI 256, 298, 304.  
 — — — — der Zentralvene LXI 85, 88, 103, 110, 118, 133, 142, 148, 151.  
 — — Verschmelzungsfrequenz bei LXIX 275.  
 — — s. auch Retinitis hämorrhag.  
 — Brechungsindex LXII 40, 42.  
 — Cyanosis, s. d.  
 — Cyste LXI 111.  
 — — bei Aderhautsarkom LXIII 73, 82.  
 — Degeneration bei Aderhautkolobom LXVIII 297.  
 — — bei Blutungen LXIV 169.

**Retina**, Degeneration, cystoide LXII 273, LXIII 511, LXIV 158, 167, 180, 309, 316, 321.  
 — — bei diffuser Sklerose LXIV 330.  
 — — nach Durchschneidung von Ciliargefäßen LXIV 266.  
 — — — — des Optikus LXIV 237, 251, 256, 264.  
 — — — — — intrakraniell LXIV 260.  
 — — bei primärem Glaukom LXIV 319, 321, 322.  
 — — bei sekundärem Glaukom LXIV 311, 313, 314, 315, 316, 317, 322.  
 — — bei Orbitaltumor LXIV 332.  
 — — im phthisischen Auge LXIV 325, 326.  
 — — nach Ulcus corneae LXIV 289, 297, 301, 306.  
 — — nach Verletzungen LXIV 287, 290, 292, 294, 299, 303, 305, 305, 309.  
 — Dicke LXV 511.  
 — — bei anthropoiden Affen LXII 272.  
 — — in der Fovea LXV 511.  
 — — bei Neugeborenen LXVII 313.  
 — Dioptrik LXII 41.  
 — Dispersion der LXII 40.  
 — Drusen LXIX 376.  
 — Duplikatur und Falten bei Aderhautkolobom LXV 162, 186, 204, LXVII 247, LXVIII 285, 296, 323, 325.  
 — — — — im Mikrophthalmus LXIII 41, LXV 163, LXVII 209, 214, LXVIII 430, 436.  
 — — — — — Erklärung LXVIII 440.  
 — Einbettungsmethode LXIII 93, LXIV 240.  
 — Einlagerung in die Chorioidea LXVIII 332.  
 — — in den Optikus LXVIII 246, 332.  
 — — unter das Pigmentepithel LXVIII 457.  
 — — zwischen Sklera und Optikus LXVIII 332.  
 — Elastizität der inneren Schichten LXX 503.  
 — Entwicklungsgeschichte LXVI 222.  
 — epithelial-gliöse Verbindung mit der Chorioidea LXIII 510, 513, 524.  
 — Ernährung LXIII 406, LXIV 273.  
 — — bei Ablösung LXX 529.  
 — — beim Kaninchen LXIV 272, LXX 530.  
 — Faltenbildungen bei Ablösung LXX 530.  
 — — angeborene LXV 156, 162, 168.  
 — — — — embryonale LXV 168, LXVI 222.

**Retina**, Faltenbildungen, angeborene, Entstehung LXV 167, LXX 504.  
 — — — bei Fischembryonen LXV 166.  
 — — — im Mikrophthalmus LXV 163.  
 — — bei Cyklopie LXVIII 245, 253, 261.  
 — — nach Glaskörperverschmelzung LXX 494, 497.  
 — Farbe, Einfluß der Wellenlänge des bleichenden Lichtes auf die LXIII 170.  
 — — im reflektierten Licht LXVI 152.  
 — Farbstoff der, Bedeutung für den Sehsakt LXIII 112.  
 — Fehlen bei intraokul. leukomat. Tumor LXII 174.  
 — Fettgehalt LXX 219.  
 — fibrinöse Exsudation in die LXIV 163.  
 — Fixierungsmethode LXIII 93, LXIV 239.  
 — — in Alkohol LXIV 241.  
 — — — Birch-Hirschfeld'schem Gemisch LXIV 244, 247.  
 — — — Cox'schem Gemisch LXIV 243.  
 — — — Flemming'scher Lösung LXIV 242.  
 — — — Formol LXIV 242.  
 — — — Hermann'scher Flüssigkeit LXIV 243.  
 — — nach Marchi LXIV 244.  
 — — in Salpetersäure LXIV 242.  
 — — mit Sublimat-Kochsalz LXIV 240.  
 — — in Zenker'scher Lösung LXIV 244.  
 — — Fluoreszenz LXII 43, 72, LXIII 118, LXV 532.  
 — — Rolle bei der Erythroptose LXV 538.  
 — — — — den Nachbildern der entoptischen Macula LXV 532.  
 — — — — Veränderungen der Farbenswahrnehmung LXV 538.  
 — Ganglienzellen, Chromatinveränderung bei Helladaptation LXIII 104.  
 — — Chromatolyse LXI 514, LXIV 238, 287, 289, 291, 295, 297, 299, 301, 303, 309, 311, 314, 316, LXX 527.  
 — — — biologische Bedeutung LXIV 306.  
 — — — nach Verblutung LXIV 238.  
 — — — Degeneration, fettige LXIV 252.  
 — — — nach Optikusdurchschneidung LXIV 238, 251, 256, 263.  
 — — — — mikr. Befund LXIV 287, 289, 291, 295, 297, 299, 301, 303, 309, 311, 314, 316, 319, 321, 325, 326, 332.

**Retina**, Ganglienzellen, Färbungsmethode LXIV 247.  
 — — Fixierungsmethode LXIV 239.  
 — — Formbildung, mangelhafte LXV 158, 167.  
 — — beim Hund LXI 505, 513.  
 — — beim Kaninchen LXIV 261, 264.  
 — — bei der Katze LXI 505.  
 — — Struktur, Einfluß der Tötungsart LXIV 249.  
 — — Vakuolen LXI 514, LXIII 89, 404, LXIV 263, 289, 291, 295, 297, 303, 309, 311, 314, 316, LXVI 113, 349, LXX 528.  
 — — Veränderungen bei Ablatio LXX 527.  
 — — — bei Chininvergiftung LXX 249, 251.  
 — — — bei Embolie der Art. centr. ret. LXIII 399, 404.  
 — — — im helladaptierten Auge LXIII 85, 97, 99, 100, 102, 103.  
 — — — durch Röntgenstrahlen LXVI 109, 113.  
 — — — nach Schnervendurchschneidung LXIV 238.  
 — — — bei Thyreoidinamblyopie LXI 507, 508, 509, 510, 513.  
 — — — nach Verblutung LXIV 238, 250.  
 — — Verkalkung LXIV 159.  
 — Gefäße, s. auch Arterien, Venen, Zentralgef.  
 — — Entwicklungsgesch. LXX 448.  
 — — Fehlen bei Cyklopie LXVIII 254.  
 — — Fettröpfchen in den, bei Retinit. albumin. LXX 216.  
 — — hyaline Degeneration LXI 109, 281, 286, LXIV 158, 159, 173, 317, 320, 321, LXVIII 297.  
 — — Lymphscheiden, Blutung in die LXI 24, 247, 287.  
 — — — erweiterte LXI 63.  
 — — Obliteration bei Cyanosis bulbi LXVIII 194.  
 — — Sklerose LXI 62, 132, 187, 300, LXIII 511, LXIV 158, 159, 162, 173, LXX 366.  
 — — vakuolisierende Degeneration LXVI 116.  
 — — Veränderungen nach Röntgenbestrahlung LXVI 113, 116.  
 — — Verhalten bei Morb. macul. Werlhof. LXIV 141.  
 — Gefäßerkrankungen LXI 2, 122, 285.  
 — — anatomische Technik bei LXI 5.  
 — Gefäßneubildung LXIV 159.  
 — Glasmembran, Widerstandsfähigkeit LXI 202.  
 — Glia, s. Neuroglia.

**Retina**, glöse Verbindung mit dem Pigmentepithel LXVIII 287.  
 — hämorrhagischer Hof um leukämische Herde LXII 182.  
 — — Infarkt LXI 293, 309, LXVIII 193, 206.  
 — — Pathogenese LXI 312.  
 — Hypoplasie LXV 155.  
 — Inkongruenz, s. Schichtungsgemeinschaft, anomale.  
 — kadaveröse Veränderungen LXIV 179, LXVII 13.  
 — Kapillaren, Erweiterung bei Venenthrombose LXI 117.  
 — — neugebildete LXI 273.  
 — — Pigmentablagerung in den LXIV 182.  
 — Katoptrik LXII 40.  
 — Keulenbildung auf der Innenfläche nach Glaskörperverlust LXX 493, 497, 514.  
 — keulenförmige (Buckel) Gebilde LXII 232, LXIV 246.  
 — Körnerschicht, Einfluß der Helladaptation LXIII 86, 96, 98.  
 — — Veränderungen bei Verschuß der Zentralgefäße LXI 24.  
 — — zylindrische Epithelzellen in der LV 160, 167.  
 — — äußere, Einfluß der Helladaptation LXIII 106, 110.  
 — — — Entwicklungsstörung LXV 156, 158, 167.  
 — — — bei Haussäugetieren LXIII 406.  
 — — — Veränderung bei Ablatio LXX 526.  
 — — — — bei Embolie der Chorioidealarterie LXIII 399, 406.  
 — — — — innere, Einfluß der Helladaptation LXIII 107.  
 — — — — Veränderung bei Ablatio LXX 527.  
 — — — — bei Embolie der Zentralarterie LXIII 399, 405.  
 — — kolloide Infiltration LXIV 161, 167.  
 — — leukämische Pseudotumoren LXII 181.  
 — Lichtverlust beim Durchgang durch die LXII 42, 49.  
 — — an der Oberfläche der LXII 40, 49.  
 — Limitans externa, Fortsetzung in der Pars cil. ret. LXIX 147.  
 — — Risse bei hochgrad. Myopie LXVII 413, 416, 429.  
 — — — interna LXV 256, LXVIII 72, LXX 296, 302, 308, 495.  
 — — — Endigung an der Papille LXX 280, 289, 309.

**Retina**, Limitans interna, Endothelhäutchen auf der LXIV 173.  
 — — — Fortsetzung in der Pars cil. ret. LXIX 148.  
 — — — Risse LXX 303.  
 — — — Verbindung mit der Adventitia der Gefäße LXX 308.  
 — — — Zelllage auf der, bei Neugeborenen LXIX 163.  
 — — lymphomatöse Geschwulstbildung in der LXII 160, 179.  
 — — — hämorrhagischer Hof LXII 182.  
 — — — Pathogenese LXII 180.  
 — — Mißbildung in der LXV 155.  
 — — Nekrose nach Verschuß der Zentralarterie LXIII 411.  
 — — Nervenfasern, Fehlen bei Anencephalie LXVIII 267.  
 — — — — Cyklopie LXVIII 245, 254, 261.  
 — — — markhaltige LXX 97, 103.  
 — — — variköse LXIV 180, 184.  
 — — — bei Gefäßerkrankungen LXI 301.  
 — — — — Morb. macul. Werlh. LXIV 180.  
 — — — — Wesen LXIV 184, LXX 202.  
 — — Nervenfaserschicht, embryonale Zellen in der LXV 158, 167.  
 — — Nervenzellen, Einfluß der Helladaptation auf die Struktur der LXIII 86, 96.  
 — — Neuroglia, Wucherung LXIII 3, LXIV 317.  
 — — Neurogliazellen, Pigmentaufnahme LXVIII 236.  
 — — — Wanderungsfähigkeit LXVIII 236.  
 — — — Ödem, cystoide Räume bei LXX 204.  
 — — — bei Embolie der Zentralarterie LXIII 410.  
 — — — bei Morbus macul. Werlhof. LXIV 180.  
 — — — bei Nephritis LXX 201.  
 — — — — Fibringehalt LXX 203.  
 — — — — Fibrinnetze LXX 205.  
 — — — — Mangel an Leukoeyten LXX 203.  
 — — — der Nervenfaserschicht LXI 86, 110, 117.  
 — — — der Zwischenkörnerschicht LXI 24, 63, 73, 86, LXVIII 193.  
 — — Pars ciliaris, Fältelung bei Aderhautkolobom LXV 199, 210.  
 — — — papillomartige Fortsätze LXV 159.  
 — — — Verhalten bei Ablatio LXX 529, 535.

**Retina, patholog. Anatomie** bei: Ab-  
lösung, s. d.

- — — Aderhautsarkom LXIII 73.
- — — Chininvergiftung LXX 249.
- — — chorioidit. Herden bei Myopie LXVII 412, 416, 420.
- — — Cyanosis ret. LXVIII 192, 214.
- — — Cyklopie LXVIII 245, 253, 261, 263.
- — — Duplikatur und Faltenbildung LXV 156.
- — — Embolie der Arter. centr. LXIII 399, 403, 408.
- — — der Chorioidealarterien LXIII 399, 403.
- — — Gefäßerkrankungen LXIV 158.
- — — Glaskörperverlust LXX 493.
- — — Glaukom, experiment. LXVI 349, 367, 398.
- — — Hydrophthalm. cong. LXIII 489, 494, 502, 511, 518.
- — — Irideremie LXX 69.
- — — Keratitis parenchym. LXII 510.
- — — Kolobom der Uvea LXV 193, LXVIII 279, 285, 288, 295, 323.
- — — kolobomatöser Cystenbildung LXVIII 279.
- — — Leukämie LXII 161.
- — — Mikrophthalmie LXIII 41, LXVII 189, 196, 203, 205, LXVIII 430.
- — — Morbus macul. Werlhof. LXIV 178.
- — — Myopie LXVII 394, 396, 398, 400, 402, 404, 410, 412, 419, 424.
- — — Optikusdurchschneidung, s. Retin., Degeneration.
- — — Orbitaleysten LXVII 253, 258.
- — — präretinaler Blutung LXX 281, 286, 302.
- — — Pseudogliom LXX 113, 118, 120.
- — — Purpura hämorrhag. LXIV 176.
- — — Retinitis albumin. LXX 201, 225.
- — — — septica LXX 281, 289.
- — — Rindenblindheit LXII 302.
- — — Riß der Membr. limit. ext. LXVII 412, 416, 420.
- — — Röntgenbestrahlung LXVI 107, 109, 113.
- — — Sklerose der Retinalgefäße LXI 133, 281, 287, 300.
- — — Skorbut LXIV 176.
- — — Stauungspapille LXV 84, 85, 462. LXX 222.

**Retina, patholog. Anatomie** bei: im  
sympathisierenden A. LXI 409, LXX  
471.

- — — Thyreoidinamblyopie LXI 507, 508, 509, 510.
- — — Tuberkulose der Chorioidea d. Kaninchens LX 41.
- — — ultravioletter Strahlen-Einwirkung LXIX 60.
- — — Verschluß der Retinalvenen LXI 123.
- — — — Zentralgefäße LXI 24, 62, 73, 273.
- — — — Zentralvene LXI 85, 117, 132, 141.
- — — Peripherie, assoziative Verbindungen LXII 348, 369.
- — — und Macula. Unterschied der Funktion LXII 348, 368, LXVIII 405.
- — — Peripblebitis LXI 441, 443.
- — — perverse Lagerung in Orbitaleysten LXVII 189, 196, 226, 237, 244, 249, 263, LXX 316.
- — — Pigmentepithelzellen bei anthro-  
poiden Affen LXII 273.
- — — Aufnahme von Fettröpfchen LXX 214, 219.
- — — biologische Selbständigkeit LXVIII 240.
- — — Drusen LXIII 504.
- — — Durchwanderung von Leukocyten LXVII 329.
- — — Eisenreaktion LXVIII 235.
- — — Fettgehalt LXX 219.
- — — Hyperplasien LXVIII 239.
- — — Phagocytose LXVIII 198.
- — — Proliferation bei Aderhautsarkom LXIII 73, LXVIII 238.
- — — Umwandlung in epitheloide Zellen LXI 381, 404.
- — — Veränderungen bei chorioidi-  
tischen Herden bei Myopie LXVII 404, 411, 419, 431.
- — — bei Embolie der Chorioideal-  
arterien LXIII 399, 406.
- — — im Mikrophthalm. cong. LXI 355.
- — — bei sympathisierender Entzün-  
dung LXI 392.
- — — Verhalten bei Retinit. albumin.  
LXX 210.
- — — Wanderung der LXV 437,  
LXVIII 18, 232, 234, 237, LXX 212.
- — — in das Lumen obturierter Ge-  
fäße LXX 217.
- — — Wucherung bei Ablösung LXIV 298.
- — — — Aderhautsarkom LXVIII 239.

**Retina**, Pigmentepithelzellen, Wucherung bei sympathisierender Entzündung LXI 404.  
 — Pigmentkörnchenzellen LXI 86, 274.  
 — Pigmentschicht, Basalmembran LXVII 317.  
 — — doppelte, im Mikrophth. LXVII 208.  
 — — Endigung am Optikus LXVII 334.  
 — — Entwicklungsgeschichte LXVIII 4, 33.  
 — — — bei der Katze LXVIII 19.  
 — — — beim Schwein LXVIII 21.  
 — — epitheliale Geschwulst LXVIII 579.  
 — — Verbindung mit der Chorioidea LXVII 320.  
 — Pigmentstreifenbildung LXVII 298, LXVIII 175.  
 — Projektion auf die Gehirnrinde LXII 353, LXV 103.  
 — — — — Experimentelles LXII 863.  
 — — auf den Kniehöcker LXII 354, LXV 103.  
 — — die Sehstrahlung LXII 357.  
 — pupillomotorischer Bezirk der LXX 387, 400.  
 — Reizung, intermittierende, Stadien LXVIII 396.  
 — — s. Verschmelzungsfrequenz.  
 — Risse bei Ablösung, s. d.  
 — Rosetten LXVIII 254.  
 — — Entstehung LXVIII 292.  
 — — im fötalen Auge LXIX 464, 465.  
 — — bei Kolobom LXVIII 287.  
 — — Vorkommen LXVIII 292.  
 — Rundzellenansammlungen bei Morb. mac. Werlhof. LXIV 179.  
 — Ruptur bei Hydrophth. cong. LXIII 222.  
 — — — — ander Oraserrat. LXIII 503, 510.  
 — Spaltung bei Aderhautsarkom LXIII 73, 82.  
 — Stäbchen, Degeneration bei Ablatio LXX 526.  
 — — und Zapfen, Entwicklung LXV 168.  
 — — — — bei Kaninchen und Katzen LXV 168.  
 — — — — Fehlen LXV 167.  
 — — — — Funktion LXV 414.  
 — — — — -Innenglieder, bläuliche Färbung bei der Taube LXIII 95, 108.  
 — — — — Schiefstellung bei Glaukom LXI 63, LXIII 511.  
 — — — — bei Tag- und Nachtvögeln LXV 371.

**Retina**, Stäbchen und Zapfen, Veränderungen bei Embolie der Chorioidealarterien LXIII 399, 406.  
 — — — — bei Helladaptation LXIII 107.  
 — — — — — Verschuß der Zentralgefäße LXI 28.  
 — Stützgewebe, Wucherung des LXVII 13, 27.  
 — taschenförmige Einlagerung in die Chorioidea LXV 164.  
 — Trübung bei Embolie der Art. centr. LXIII 399, 403, 408.  
 — — — — beim Kaninchen LXIII 409.  
 — — — — Ursache LXIII 410.  
 — — bei Skleritis poster. LXIV 380.  
 — Tuberkel LXVI 61.  
 — Tuberkulose, entzündliche LXI 194.  
 — — Folgeerscheinungen LXI 195.  
 — — Formen LXI 193.  
 — — granulationsartige LXI 194.  
 — — bei Haustieren, entzündliche LXI 211.  
 — — — — Formen LXI 211.  
 — — — — granulationsartige LXI 212.  
 — — — — knötchenförmige LXI 212.  
 — — — — Pathogenese LXI 212.  
 — — — — tumorartige LXI 212.  
 — — knötchenförmige LXI 193.  
 — — — Sitz LXI 194.  
 — — Pathogenese LXI 193.  
 — — beim Rind LXI 164, 165, 167.  
 — — beim Schwein LXI 170, 171, 172.  
 — tumorähnliche, zellige Wucherung in der fötalen LXIX 466.  
 — Venen, Endophlebitis LXI 122, 132, 300, LXIV 159.  
 — — hyaline Degeneration LXI 286.  
 — — der Katze LXIV 524.  
 — — Sklerose LXI 132.  
 — — Thrombose LXI 109, 286.  
 — — Verhalten bei Verschuß der Zentralgefäße LXI 24, 63.  
 — — — — der Zentralvene LXI 84, 109, 117, 141.  
 — venöse Stauung bei Embolie der Art. centr. LXIII 410.  
 — Veränderungen bei Aderhauttuberkulose LXI 186.  
 — Verbindung mit dem Glaskörper LXV 243, 248, 254, LXVIII 49, 75, LXX 496.  
 — Verdickung in einer fötalen LXIX 468.  
 — Verdoppelungen, s. Duplikatur.  
 — Verwachsung mit der Hinterfläche der Linse in Mißbildungen LXVIII 437.

**Retina**, Vorziehen über die Papille bei glaukomat. Atrophie LXVIII 154.

— — — bei neuritischer Atrophie LXVIII 153.

— weiße Flecke, Entstehung LXIV 183.

— — — bei Stauungspapille LXX 222.

— — — Vorkommen LXIV 184, LXX 222.

— Wucherung, aktive, in Cysten LXVII 252.

— Zapfen der Fovea. Anordnung LXIV 551.

— — — Querschnitt LXIV 552, 565.

— Kontraktion bei Helladaptation LXIII 108.

— Zapfenfaserschicht LXV 541.

— Zellen, epitheliale Umformung, in der fötalen LXIX 471.

— Zirkulationsstörungen, Grundlagen LXI 2.

**Retinalapoplexie**, hämorrhagische LXI 77.

**Retinitis albuminurica**, Adaptation, Verhalten der LXV 401, 416.

— Drusen der Papille LXIX 381.

— Fetteinlagerung LXX 205.

— — Entstehung des Fettes LXX 206, 216, 221.

— — Fettinfiltration des Gliagerüsts LXX 214.

— — Fettkörnchenzellen LXX 205, 208.

— — — Formen LXX 208.

— — — Herkunft LXX 209.

— — — Pigmentgehalt LXX 211.

— — — prognost. Bedeutung LXX 206.

— Fettröpfchen in den kleinen Gefäßen der Retina, Chorioid, und des Optikus LXX 216.

— mikr. Befund LXX 227.

— Ödem bei LXX 201.

— Pathogenese LXX 200, 223.

— — Gefäßveränderungen LXX 223.

— — Urämie LXX 231.

— — Zirkulationsstörungen LXX 220, 230.

— Verhalten der Pigmentepithelzellen LXX 210.

— Vorkommen LXX 201.

**Retinitis centralis**, Farbe der Macul. lut. bei LXV 507.

**Retinitis hämorrhagica** mit Chorioiditis LXI 275, 277.

— bei Erkrankungen der Arter. centr. LXI 246.

— — — der Retinargefäße LXI 285, 288.

**Retinitis hämorrhagica**, Pathogenese LXI 2, 147, 290.

— bei Verschuß der Vena centralis LXI 77, 104, 114, 119, 126, 276, 295.

— — — beider Zentralgefäße LXI 268.

— bei Wanderkrankungen der Vena centr. LXI 146.

**Retinitis metastatica**, Wesen LXIV 183.

**Retinitis pigmentosa**, Beziehung zur Retinit. punct. albescens LXIII 285.

— Drusen der Papille bei LXIX 380.

**Retinitis proliferans** LXIV 369.

— präretinale Gewebsbildung bei LXVIII 66.

**Retinitis punctata albescens**, Ätiologie LXIII 285.

— Beziehung zur Retinit. pigment. LXIII 285.

— Gesichtsfeldeinschränkung LXIII 283, 285.

— Häufigkeit LXIII 281.

— Hemeralopie LXIII 281, 283, 285.

— Kasuistik LXIII 281.

— klinische Symptome LXIII 285.

— ophthalm. Befund LXIII 282, 283.

— Sehschärfe LXIII 283.

— Therapie LXIII 286.

— Verlauf LXIII 286.

**Retinitis septica**, mikr. Befund LXX 281.

— Wesen LXIV 183.

**Retino-chorioiditis juxtapapillaris**, cas. LXIX 41.

— Erklärung LXIX 47.

— Gesichtsfelddefekt LXIX 45.

— Glaskörpertrübungen LXIX 46.

— Häufigkeit LXIX 48.

— Krankheitsbild LXIX 45.

— ophthalm. Befund LXIX 45, 46.

— Prognose LXIX 47.

— Verlauf LXIX 46.

**Rhodan ammonium**, Diffusion in die Linse LXII 101.

**Ricin**, Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 82.

**Riesenzellen** bei Amyloidentartung LXVII 126, 134.

— in Beschlägen auf der hint. Hornhautfläche LXI 442.

— in Bindegewebsschwarten zw. Ret. und Chorioid. LXIV 166, LXX 114.

— bei Fremdkörpern LXI 224.

— bei hämorrhag. Inguinallymphom. LXVII 74.

— bei Iridochoioiditis spontan. LXIX 176, 180.

— in Iriduberkeln LXVI 33.

— in der Kammerbucht bei Glaukom LXIX 19.

- Riesenzellen** bei Keratit. parench. LXII 511, 513, 518, LXVIII 357.  
 — in Nekrosen von Aderhautsarkom LXIII 78.  
 — in organisierten Blutergüssen LXIV 167, 169.  
 — mit Pigmentkörnchen LXI 189, 201, 207.  
 — bei proliferierender Aderhautentzündung LXI 437.  
 — bei sympathisierend. Entzündung LXI 384, 388, 393, 398, LXV 139.  
 — — — — Entstehung LXI 384.  
 — — — — Pigmentgehalt LXI 384.  
 — — — — prognost. Bedeutung LXI 384.  
 — im Tuberkel LXI 179.  
 — bei Tuberkulose der Chorioidea LXI 161, 163, 171, 172.  
 — — — — der Iris LXI 189, 208, LXIX 86, 90.  
 — — — — — und des Ciliarkörpers LXI 176, 178, 180.  
 — — — — — Retina LXI 165, 166.  
**Rind**, Glaskörper, Area Martegiani LXVII 61, 62.  
 — — Zentralkanal LXV 261, LXVII 61.  
 — Tuberkulose des Auges LXI 153, 154, 155, 156, 157, 158.  
 — — — — Häufigkeit LXI 198.  
 — — der Chorioidea LXI 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167.  
 — — — — Bedeutung des Tapetum fibros. LXI 202.  
 — — der Iris und des Ciliarkörpers LXI 176, 178, 180.  
 — — des Optikus LXI 213.  
 — — der Retina LXI 164, 165, 167.  
 — — — Sklera LXI 179.  
**Rindenblindheit**, anatom. - histolog. Grundlagen LXII 290, 316, 333, 337.  
 — cas. LXII 287.  
 — kortikale LXII 323.  
 — Veränderungen des Corp. genicul. ext. LXII 302, 305, 330.  
 — — der Sehstrahlung LXII 291, 295, 303, 305, 308, 313, 322.  
 — — des Tapetum LXII 291, 295, 304, 305.  
 — — — unteren Längsbündels LXII 291, 295, 304, 305.  
 — Wiederherstellung der Funktion bei LXII 366.  
**Rindenerweichung**, Läsion des Markes bei LXII 307, 322.  
 — durch Verschluß der Art. occipit. LXII 326.

Schlaefke, General-Register.

- Riolan'scher Muskel** LXVI 544.  
 — Entwicklungsgesch. LXVI 559.  
 — Funktion LXVI 545.  
 — interciliarer, subciliarer und sub-tarsaler Teil LXVI 544.  
 — Rolle beim Entrop. spast. LXVI 546.  
 — Zusammenhang mit d. Musc. orbicul. LXVI 545.  
**Rivus lacrimalis** LXVI 507.  
**Röntgenbestrahlung**, Ablatio retin. nach LXVI 108.  
 — angeborene Katarakt bei Kaninchen nach LXV 334, 350.  
 — — Liddefekt bei Kaninchen nach LXV 348, 352.  
 — biologische Wirkung, Ersatz durch Lecithin und Cholin LXV 327.  
 — Cholin im Blut nach LXV 356.  
 — Einfluß auf die Lebensfähigkeit neugeborener Kaninchen LXV 334.  
 — Gefäßveränderungen nach LXVI 110, 113, 114, 116.  
 — Linsenstrübungen nach LXV 358.  
 — Magen- und Darmblutungen bei Kaninchen nach LXV 334.  
 — Mikrophthalmus bei Kaninchen durch LXV 347, 352.  
 — Mißbildungen und Wachstumsstörungen durch LXV 353, 357.  
 — patholog. Wirkung aufs A. LXVI 118.  
 — — — — anatom. Befund LXVI 104, 107.  
 — Sehstörungen durch LXVI 111.  
 — Wirkung auf Aderhautsarkom LXVI 110.  
 — — — Cornea LXVI 111, 112.  
 — — — Hautkarzinom LXVI 111.  
 — — — Linse LXV 356.  
 — — — Macula LXVI 116.  
 — — — Retina LXVI 107, 109, 113, 118.  
**Röntgenuntersuchungen** bei Turmschädel LXVIII 422.  
**Rohrzucker**, Invertierung LXII 107.  
 — Übergang in die Linse LXII 106.  
**Rollung** d. A., latente, Bedeutung LXII 462.  
 — — — Beschwerden LXII 461, 462.  
 — — — Definition LXII 459.  
 — — — Häufigkeit LXII 461.  
 — — — bei Konvergenz LXII 460.  
 — — — Therapie LXII 462.  
 — — — Untersuchungsmethode LXII 460.  
 — bei Seitwärtsneigung des Kopfes LXII 432.  
**Rosetten** im Mikrophthalmus LXIII 41, LXVII 191, 197, LXVIII 432.

- Rosetten** im Mikrophthalmus. Blutgefäß im Lumen der LXVIII 455.  
 — — — und im Gliom, Identität LXVIII 455.  
 — in der Retina LXVIII 254.  
 — — — bei Coloboma oculi LXVIII 287.  
 — — — — Entstehung LXVIII 292.  
 — — — — beim Fötus LXIX 464, 465.  
 — — — — Vorkommen LXVIII 292.  
**Rückenmarkswurzeln**, hintere, Degeneration bei Stauungspapille LXIX 440.  
**Ruhelage** d. A. LXX 189.  
 — bei Refraktionsanomalien LXX 190.  
 — Untersuchungsmethode LXX 189.  
**Ruptur** an der Corneoskleralgrenze LXVII 53.  
**Rüssel'sche Körperchen**, s. Hyalin-Kugeln.

## S.

- Säugetiere**, Entwicklung der Tränenröhrchen LXII 380.  
**Sagittalmark**, Gefäßversorgung LXII 300.  
**Salpetersäure**, Fixierung der Retina in LXIV 242.  
**Sand**, Verletzung d. A. durch LXVI 299.  
**Santonin**, Dosis LXV 309.  
 — Einfluß auf die Dunkeladaptation LXI 531, LXV 309.  
 — Gelbsehen nach LXI 531, LXV 309.  
 — Wirkung aufs A. LXV 302.  
**Sarkom**, Bindegewebswucherung im LXIII 477.  
 — am Canalis optic. LXV 450.  
 — der Chorioidea (Uvea) LXIII 69, 77, LXVI 106, LXVII 497.  
 — — — Chromatophoren, Rolle der LXIX 285.  
 — — — Durchbruch, frühzeitiger LXIII 75, 79, 83.  
 — — — extraokulare Knoten, Farbe der LXII 177.  
 — — — flächenhaftes, Begriff LXIII 468.  
 — — — — Beziehung zum intraokul. Druck LXIII 478.  
 — — — — Diff.-Diagnose LXIII 479.  
 — — — — Durchbruch durch die Sklera LXIII 475.  
 — — — — fibröse Entstehung LXIII 477.  
 — — — — Kasuistik LXIII 470.  
 — — — — Metastasen LXIII 476.  
 — — — — mikr. Befund LXIII 473.  
 — — — — Prognose LXIII 478.

- Sarkom** der Chorioidea, flächenhaftes, Sektionsbefund LXIII 472.  
 — — — — Wachstum LXIII 468.  
 — — — — Glaukom bei LXVI 108.  
 — — — — Iridoeyklitis bei LXI 373, 428, LXIX 287.  
 — — — — im Kindesalter LXIX 281.  
 — — — — — mikr. Befund LXIX 284.  
 — — — — Verkalkungen LXIX 283.  
 — — — — Lebensalter LXIX 286.  
 — — — — leukomatöses, s. Leukosark.  
 — — — — mikr. Befund LXIII 72, 77, LXVI 106, LXIX 284.  
 — — — — Nekrosen im LXI 372, 373, 428, LXIII 74, 78, 474.  
 — — — — Netzhaut-Ablösung bei LXIII 70, 71, 78, 473, LXVI 106, 107, LXVII 497, LXVIII 73.  
 — — — — ohne Netzhaut-Ablösung LXIII 74, 75, 82.  
 — — — — Netzhautspaltung bei LXIII 73, 82.  
 — — — — ophthalm. Befund LXIII 71.  
 — — — — Papillitis bei LXIII 73, 81.  
 — — — — Phthisis bulbi bei LXI 376, LXIII 79.  
 — — — — Pigmentepithel, geschwulstartige Wucherung LXVIII 239.  
 — — — — Proliferation LXIII 73, LXVIII 238.  
 — — — — ohne Sekundärglaukom LXIII 74.  
 — — — — Stadien LXIII 69, 75.  
 — — — — sympathisch. Entzündung bei LXI 373, LXV 148.  
 — — — — Therapie, Röntgenbestrahlung LXVI 110.  
 — — — — Wachstum und Ernährung LXIII 79.  
 — — — — Einfluß des intraokularen Druckes LXIII 478.  
 — — — — des Ciliarkörpers LXV 492.  
 — — — — der Iris, cas. LXIX 75.  
 — — — — Häufigkeit LXIX 82.  
 — — — — Lebensalter LXIX 89, 92.  
 — — — — leukomat., Fehldiagnose LXIX 83.  
 — — — — Häufigkeit LXIX 82.  
 — — — — mikr. Befund LXIX 77.  
 — — — — Probeexzision LXIX 105, LXX 339.  
 — — — — Prognose LXIX 82, 93.  
 — — — — Therapie, Enukleation LXIX 99.  
 — — — — — Rezidiv und Metastasen nach LXIX 101.  
 — — — — — Iridektomie LXIX 94, 104, LXX 336.  
 — — — — — Rezidiv und Metastasen nach LXIX 101.



**Sarkom** des Kleinhirns LXIX 293.  
**Schädelhöhle** und Rückgrathöhle, Druck in der LXV 90.  
**Schädelläsionen**, Drusen an der Papille nach LXIX 381.  
**Schädelwachstum** und Gehirnwachstum LXVIII 421.  
**Schaf**, Ciliarkörper, Anatomie LXX 411.  
 — Glaskörper, Area Martegiani LXVII 62.  
 — — Zentralkanal LXV 262, LXVII 61.  
 — Iris, Anatomie LXX 411.  
 — — Dilator LXX 419, 434, 439, 443.  
 — — funktionelle LXX 413.  
 — — Muskelapparat LXX 407.  
 — — Physiologie LXX 413.  
 — — Ruhestellung LXX 415.  
 — — Sphinkter LXX 419, 433, 438.  
 — Pupillenspiel LXX 446.  
 — Scheiniris LXX 412.  
 — Tränenröhrchen, Entwicklung LXII 390.  
**Schaltgewebszapfen** der Papille LXVIII 140.  
**Schattendrehung**, skioskopische, bei Astigmatismus LXII 275, LXIII 388, LXV 150.  
 — — Bedeutung des Spiegelloches LXII 277, LXVI 195.  
**Scheinbewegung** bei Nystagmus LXVI 191.  
 — in Stereoskopbildern, Erklärung LXI 491, LXIII 462.  
**Schichtstar**, s. Katar. perinucl.  
**Schieleroperation**, anomale Sehrichtungsgemeinschaft nach, Verhalten der LXVII 444.  
 — doppelseitige LXIX 557.  
 — Dosierung LXII 442.  
 — Erfindung LXVIII 463.  
 — erste Ausführung LXVIII 465.  
 — Exophthalmus nach LXVIII 473, 478, 479.  
 — Fadenoperation LXVIII 480, 482.  
 — Geschichtliches LXVIII 461.  
 — — Bonnet LXVIII 469, 473.  
 — — Buffon LXVIII 462.  
 — — Cunier LXVIII 468.  
 — — Dieffenbach LXVIII 464.  
 — — v. Graefe LXVIII 481.  
 — — Guérin LXVIII 467, 480.  
 — — Stromeyer LXVIII 463.  
 — — Taylor LXVIII 461.  
 — unter Kontrolle des Stereoskops LXIX 554.  
 — Lebensalter LXIX 558.

**Schieleroperation**, Mißerfolge LXVIII 470.  
 — — Ursachen LXVIII 476.  
 — — Sehschärfe nach LXVIII 477.  
 — Statistik LXVIII 471.  
 — Vorlagerung LXVIII 480.  
**Schielertheorie** LXIX 549.  
 — Innervationsanomalie LXIX 549.  
 — sensorischer Apparat, Änderung des LXIX 552.  
 — Widerwillen gegen Einfachsehen LXIX 553.  
**Schimpanse**, Auge des LXII 251.  
 — — äußere Maße LXII 252.  
 — Chorioidea, Dicke LXII 259.  
 — Dilator LXII 266.  
 — Duralscheide, Dicke LXII 274.  
 — Eintrittsstelle der Zentralgefäße LXII 274.  
 — Foveaabstand von der Papille LXII 273.  
 — Hornhaut, Dicke LXII 255.  
 — — Durchmesser LXII 254.  
 — — Radius LXII 255.  
 — Papille, Durchmesser LXII 273.  
 — Retina, Dicke LXII 272.  
 — Sklera, Dicke LXII 257.  
**Schlafenabszeß** bei Orbitalphlegmone LXI 462.  
**Schlagapparat** von Bäck LXII 233.  
**Schlangengift**, Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 81.  
**Schlüssellochkolobom**, Miosis am LXIV 378.  
 — Ursache der Form LXIV 343.  
**Schmidt-Rimpler's Nachstaroperation** LXIII 570.  
**Schnaudigel's Nachstaroperation** LXX 126.  
**Schneeblindheit**, Ursache LXIX 59.  
**Schule**, Einfluß auf die Myopie LXX 145.  
**Schutzbrillen**, Absorptionsfähigkeit für ultraviol. Strahlen LXIX 66.  
**Schwartenbildung** im Auge LXI 412.  
**Schwein**, Auge, Entwicklungsgesch. LXV 230, LXVIII 21.  
 — Dilator, Entwicklung LXVIII 22.  
 — Glaskörper, Area Martegiani LXVII 61, 62.  
 — — Zentralkanal LXV 261, LXVII 61.  
 — Iris, Entwicklungsgesch. LXVIII 21.  
 — Sphinkter, Entwicklungsgesch. LXIII 437, LXVIII 22.  
 — Tränenröhrchen, Anzahl LXII 388.  
 — — Entwicklung LXII 381, 383.  
 — Tuberkulose d. A. LXI 153, 173.  
 — — — Häufigkeit LXI 198.

**Schwein**, Tuberkulose der Chorioidea LXI 157, 161, 168, 171.

— — — — Pathogenese LXI 172.

— — des Ciliarkörpers LXI 175.

— — der Optikuscheiden LXI 173, 214.

— — — Retina LXI 170, 171, 172.

— — — Sklera LXI 169, 171.

**Schwindelercheinungen**, Ursachen LXI 485.

**Seelenblindheit**, anatomische Grundlage LXII 372, LXX 395.

— Begriff LXX 397.

**Sehbahn**, Verlauf der LXV 99.

**Sehen** (Theorie des) LXII 347, LXVI 486

— binokulares, s. Binokularsehen.

— Lokalisation und Größenschätzung LXIX 548.

— zentrales, assoziative Vorgänge beim LXII 348.

— in Zerstreuungskreisen LXV 16.

**Sehgelb** LXII 51.

— Bildung im lebend. Auge LXIII 143.

— — — — der Eule LXIII 148.

— — — — Fische LXIII 144.

— — — — des Frosches LXIII 144, 148.

— — — — Menschen LXIII 146.

— Entstehung aus Sehpurpur LXIII 131, 155.

— Geschichtliches LXIII 114.

— Indolenz LXIII 179.

— Lichtabsorption LXIII 116.

— Lichtempfindlichkeit LXIII 119.

**Sehhügel**, Beziehung der Gudden'schen Kommissur zum LXVII 84.

— — des Optikus zum LXVII 83.

**Schleiste** beim Kaninchen LXVI 263.

— — — Purpurfärbung LXVI 264.

— bei Säugetieren LXVI 263.

**Schleistung**, Begriff LXIX 107.

— bei Hyperopen LXIX 106, 110.

— — — und Grad der Hyperopie LXIX 119.

— — — — Geschlecht LXIX 117.

— — — — Lebensalter LXIX 113.

**Sehnen-Regeneration** LXII 542.

**Sehnervenschwund**, primärer kavernöser LXIV 310.

— s. Atroph. n. opt.

**Sehprobentafel** für Analphabeten LXIV 550.

— Eigenschaften LXIV 609.

— mit gotischen Buchstaben LXIV 556.

— mit Hakenfiguren LXIV 550.

— für Schulkinder LXIV 558.

— mit Spiegeleinrichtung LXIV 559.

— mit Ziffern LXIV 550.

**Sehprobentafel** von Guillery LXIV 129, 570, 602.

— — Koster LXIV 137, 543.

— — Landolt LXIV 133, 602, 609, LXV 318.

— — Snellen LXIV 544, LXV 318.

**Sehpurpur**, Anagenese LXIII 173.

— Autoregeneration LXIII 173.

— Bleichung, Graufärbung der Fischretina im Zwischenstadium LXIII 155.

— — zu Sehgelb LXIII 113, 114, 121, 13.

— Bleichungsdifferenz in kurz- und langwelligem Licht LXIII 113, 118, 120.

— Bleichungsversuche, Methode LXIII 171.

— Einfluß auf das makuläre Gefälle des terminalen Lichtes LXII 48.

— Entstehung LXI 563.

— Fixation LXI 561.

— Fluoreszenz LXII 48, 55.

— Lichtabsorption LXII 51, LXIII 116, 122.

— Lichtempfindlichkeit, Einfluß des Aggregatzustandes der Netzhaut LXIII 177.

— -Lösung, Bleichungsdifferenz im kurz- und langwelligem Licht LXIII 152.

— — Lichtabsorption, Messung der LXIII 156.

— — — -Spektrum, Photographie des LXIII 150.

— der Macula LXII 55.

— Neogenese LXIII 173.

— ophthalmoskopische Wahrnehmbarkeit LXIII 135.

— Regeneration, Einfluß von Reagentien LXIII 178.

— Veränderungen durch Licht LXIII 112.

**Schrichtungsgemeinschaft**, anomale, Begriff LXVII 440.

— — Diagnose LXVII 442.

— — Prognose LXVII 440.

— — Untersuchungsmethode LXVII 443.

— — Verhalten nach Schieloperation, cas. LXVII 444.

— — — — Perioden LXVII 462.

— — — — — Alleinherrschaft der anomalen Lokalisation LXVII 462.

— — — — — Wettstreit zw. anomaler und normaler Lokalisation LXVII 465.

— — — — — Alleinherrschaft der normalen Lokalisation LXII 473.

— — Winkelgröße, Beziehung zum Schielwinkel LXVII 472.

**Sehschärfe**, Abhängigkeit vom Durchmesser der Zerstreuungskreise und der Größe der Netzhautbilder LXV 18.  
 — und Arbeitsfähigkeit LXIV 576.  
 — und Astigmatismus LXX 60.  
 — Begriff LXIV 599.  
 — Bestimmung bei Amblyopie LXIV 559.  
 — — Distanz LXIV 559.  
 — — einheitliche Methode LXIV 606.  
 — — mit Hakenfiguren LXIV 550.  
 — — bei hochgradiger Myopie LXIV 559.  
 — — bei Unfallverletzten LXIV 573, 575.  
 — — mit Ziffern LXIV 550.  
 — — nach Guillery LXIV 129, 138, 570, 575, 599.  
 — — nach Koster LXIV 547, 607.  
 — — nach Landolt LXIV 133, 138, 599.  
 — — nach Snellen LXIV 544, 598.  
 — und Differenzierung des fovealen Bezirkes LXX 80.  
 — bei doppelseit. Erweichung des optisch. Rindenfeldes LXII 352.  
 — bei Drusen an der Papille LXIX 386.  
 — Einflüsse auf die LXIV 573.  
 — Einfluß des Alters LXI 542.  
 — — der Beleuchtung LXIV 131, 134, 138, 567, LXVI 455, 461, 501.  
 — — der brechenden Medien, Durchsichtigkeit LXIV 571.  
 — — — — Form LXIV 568.  
 — — des Brucins LXV 305.  
 — — der funktionierenden Netzhaut-elemente, Erregbarkeit LXIV 571.  
 — — — — Quantität der LXIV 568.  
 — — der Pupillengröße LXVI 465.  
 — — des Strychnins LXV 303, 305, 316.  
 — — — — doppelseitiger LXV 316.  
 — Einheit der LXIV 566.  
 — bei Eisenbahnbediensteten LXIX 106.  
 — erwerblicher Wert der LXIV 575.  
 — in farbigem Licht LXIX 479.  
 — — — — Einfluß der Beleuchtung LXIX 486.  
 — — — — Untersuchungsmethode LXIX 482.  
 — Gradbezeichnung LXIV 565.  
 — — lineares und quadratisches System LXIV 574.  
 — für Grün LXIX 486.  
 — Herabsetzung, s. Amblyopie.  
 — bei Hydrophthalmus cong. LXIII 220.  
 — bei Hyperopie LXX 178.

**Sehschärfe**, indirekte (periphere) LXI 525.  
 — bei Irideremie LXX 79.  
 — — Iriskolobom LXVI 271.  
 — und Lichtsinn LXIV 573.  
 — — makuläre Aussparung bei Hemianopsie LXX 392, 399.  
 — — Medientrübung, Ursache des Mißverhältnisses LXIV 308.  
 — normale LXIV 564.  
 — für Rot LXIX 486.  
 — Schädigung, absolute und relative LXIV 576.  
 — Sinken auf d. fixierend. A. bei binokul. Einstellung bei Strabismus LXVII 474.  
 — bei Skleritis post. LXIV 380, 383.  
**Sehsphäre**, Umgrenzung LXII 338.  
 — — Bedeutung der Myelinisation LXII 340.  
 — — — — der sekundären Degeneration LXII 341.  
 — — Calcarinarinde LXII 339.  
 — — in der Calcarinaregion LXII 343.  
 — — im Occipitallappen LXII 343.  
 — — Tierexperimente LXII 342.  
 — — Vie d'Azyr'scher Streifen LXII 338.  
**Sehstörungen** bei Commotio retinae LXII 228, 229.  
 — — — — Ursachen LXII 230, 236.  
 — bei Erweichungsherden des Occipitallappens LXII 333.  
 — bei Läsion der Calcarina LXII 360.  
 — — Neuritis retrobulb. infolge Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 445.  
 — bei Orbitalphlegmone LXI 482.  
 — plötzliche, bei Verschuß der Zentralarterie, Erklärung LXI 67, 68, 125, 135.  
 — bei Rindendefekten, Verschwinden der LXII 363.  
 — nach Röntgenbestrahlung LXVI 111.  
 — — Verletzung des Cuneusstils LXII 346.  
**Sehstrahlung**, Gefäßversorgung LXII 300, 312.  
 — Histologie LXII 291.  
 — Läsion bei Rindenerweichung LXII 311, 313, 322, 360.  
 — — Sehstörungen nach LXII 354.  
 — — Ursache von Hemianopsie LXII 333.  
 — primäre Herde LXII 314.  
 — Veränderungen bei Rindenblindheit LXII 291, 296, 303, 305, 314, 322.  
 — Verlauf der optischen Fasern in der LXII 354, 356.



**Skleralsporn**, Entwicklungsgeschichte LXIII 445, 446, 448, 450, LXVI 221.

— bei Hydrophthalm. cong. LXIII 487, 499.

**Skleritis** posterior LXIV 380.

— — Ätiologie LXIV 390.

— — anatom. Befund LXIV 381.

— — Beweglichkeitsbeschränkung LXIV 382, 389.

— — cas. LXIV 382.

— — Chorioiditis bei LXIV 381, 390.

— — Diff.-Diagnose LXIV 386.

— — Exophthalmus LXIV 381, 382.

— — Gesichtsfeldeinengung LXIV 383.

— — Iritis bei LXIV 383, 386.

— — Netzhautablösung bei LXIV 383, 384, 389.

— — ophthalm. Befund LXIV 380, 383, 386.

— — Refraktionsänderung bei LXIV 390.

— — Sehschärfe LXIV 380, 383.

— — Symptome LXIV 386.

— — Therapie LXIV 383.

— — sulzige, bei Uvealtuberkulose des Kaninchens LXVI 39.

— — Tuberkulinprobe bei LXVI 84.

— — bei Tuberkulose LXVI 83.

**Sklerocornealcyste** LXVIII 513, 516.

**Sklerose**, diffuse, Optikusdegeneration bei LXIV 328.

— multiple, Optikusdegeneration bei LXIV 329.

**Sklerotomie** bei Glaukom LXI 57.

— — Ausführung LXIV 407.

— hintere, bei Glaukoma absol. LXIV 407.

— bei Hydrophthalmus cong. LXIII 236, 243, LXVII 171, 179.

— — Ausführung LXIV 407, 410.

— sympathische Entzündung nach LXI 372.

— vordere, Dauererfolge bei Glaukoma infl. acut. LXIV 396, 406.

— — — — — chron. LXIV 397, 406.

— — — — — simpl. LXIV 399, 406, 410.

— — — bei Hydrophthalmus LXIV 400.

**Skopolamin**, Wirkung bei experiment. Glaukom LXVI 401, 407.

**Skorbut**, Augenveränderungen bei LXIV 175.

— — patholog. Anatomie LXIV 176.

**Skotoma** centrale bei Amblyopia congenit. LXI 283.

— — — intoxicat. und Chorioret. centr., Unterschied LXV 388.

**Skotoma** centrale, intoxicat., anatom. Grundlage LXI 517, LXV 470, 477.

— — mit konzentr. Gesichtsfeldeinschränkung LXI 17.

— — bei Maculakolobom LXV 384.

— — mikr. Befund LXV 463.

— — bei Neurit. retrobulb. LXV 445, 448, 452, 454, 457, 460.

— — — — — Pathogenese LXV 459, 470.

— — — Pigmentstreifenbildung in der Ret. LXV I 301, 303.

— — — Verschuß der Arter. centr. LXI 57.

— — — — — macul. LXI 16, 17.

— — hemianopisches LXII 349.

— bei Neuroretinit. album. LXV 400, 401.

— peripheres, bei Commot. retin. LXII 228, 229, 242.

**Skrofulose**, Beziehung zur Tuberkulose LXVI 69.

**Snellen's** Optotypen LXIV 544, LXV 318.

**Sonne**, Farbe der untergehenden LXII 42.

**Sonnenlicht** zur Therapie des Ulcus corn. serp. LXVI 323.

**Speicheldrüsen**, Veränderungen nach Unterbindung der Ausführungsgänge LXII 74.

**Spektrale Mischungsgleichungen** bei Blindheit LXII 469.

**Spektralstrahlungen**, Differenz in der Gesamtenergie der einzelnen LXV 117.

— Wirkung der einzelnen auf die Iris von Kaltblütern LXV 122, 127.

— — — — — Warnblütern LXV 120.

**Spektrum** des Acetylgaslichtes LXIX 55.

— der elektrischen Bogenlampe LXIX 57.

— — — Glühlampe LXIX 56.

— bei Farbenblindheit LXII 61.

— der Gaslampe LXIX 54.

— des Kadmiums LXVI 291.

— des Magnesiums LXVI 287.

— objekt., zur Prüfung der Blindheit LXII 468.

— der Öllampe LXIX 53.

— der Quecksilberdampflampe LXIX 57.

— Unterschied des Refraktions- und Diffraktions-Sp. LXV 129.

— des Zinks LXVI 291.

**Spezifisches Gewicht** von 1% Kochsalzlösung LXIV 105.

**Sphinkter iridis ciliaris** LXV 437.  
**Sphinkter pupillae**, bei anthropoid. Affen LXII 262.  
 — und Dilator, Vergleich der Leistung LXIV 363.  
 — Entwicklungsgesch. LXIII 437, 438, 440, LXV 430, LXVIII 1, 34, LXIX 79.  
 — — bei der Katze LXVIII 19.  
 — — beim Schwein LXIII 437, LXVIII 22.  
 — Fehlen bei Irideremie LXX 68.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 488.  
 — der Kaltblüter, direkte Reizung durch Licht LXV 127.  
 — Pigmentgehalt bei Kaltblütern LXV 126.  
 — Pigmentierung LXVIII 16.  
 — Querschnittsänderung bei Mydriasis und Miosis LXIV 370.  
 — beim Schaf LXX 419, 433, 438.  
 — Verhalten bei Ektrop. des Pupillar-randes LXIV 352.  
 — Wirkungsweise LXIV 377.  
 — Zentrum LXX 539, 562.  
**Spiegelloch**, Bedeutung für die skiaskopische Schattendrehung LXII 277, LXVI 195.  
**Spindelzellen** an der hint. Hornhautfläche bei Iritis serosa LXI 445.  
**Spirochaeta pallida** LXVI 224.  
 — in der Cornea bei kongenital. Lues LXVIII 364.  
 — bei Keratit. parenchym.luetica LXVIII 373.  
**Stäbchensehschärfe** LXVI 464.  
**Staphylococcus pyogenes albus** bei Iridochoioiditis LXII 223.  
**Staphylococcus pyogenes aureus** im subkonj. Abszeß LXVII 68.  
**Staphylokokken** bei Conjunct. diphther. LXVII 165, 167, 168.  
 — bei sympath. Ophthalmie LXII 194.  
 — Virulenzverlust im menschl. Blut LXII 224, 225.  
**Staphyloma corneae**, Abtragung, sympath. Entzündung nach LXI 372.  
 — totale, anatom. Befund LXIV 314, 315, LXIX 24.  
 — — Entstehung LXVIII 379.  
**Staphyloma intercalare** LXVIII 358.  
**Staphyloma posticum**, Ätiologie LXVII 36.  
 — anatom. Befund LXVIII 58, 60.  
 — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 218.  
**Staphyloma sklerae** äquatoriale, bei Glaukoma absol. LXI 18, 25.  
**Staphylotoxin**, Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 78, 81, 82, 99.  
**Star**, s. Katarakt.

**Staroperation**, Glaukom nach LXVII 531, 532.  
 — bei hochgrad. Myopie LXX 62.  
 — mikr. Befund LXI 87.  
 — sympath. Entzündung nach LXI 372.  
**Statistik**, Ablatio retinae LXX 46.  
 — — bei Myopie LXX 48.  
 — Hydrophthalm. cong. LXIII 215.  
 — Hyperopie LXX 193.  
 — Myopieoperation LXX 2.  
 — sympath. Entzündung LXI 367.  
**Stauungspapille** mit Abducenslähmung nach Ohroperationen LXV 98.  
 — Abplattung der Hirnwindungen bei LXIX 333.  
 — Abschwellung nach Trepanation LXIX 316, 330.  
 — Ampulle der Optikuscheiden bei LXIX 333, 336, 414.  
 — bei Aneurysma der Carotis LXV 98.  
 — atrophisches Stadium LXV 96.  
 — Balkenstich bei LXIX 346.  
 — Beziehung zur Größe des Tumors LXIX 334.  
 — Definition LXIX 396.  
 — Degeneration der hinteren Rückenmarkswurzeln bei LXIX 440.  
 — Drusen der Papille bei LXIX 381.  
 — bei Echinokokkus LXIX 443.  
 — — in den Ventrikeln LXV 82.  
 — Einfluß der Lumbalpunktion LXV 79, 97, LXIX 296, 299, 325, 331, 436.  
 — — der Spaltung der Optikuscheiden LXV 80, LXIX 436.  
 — — der Trepanation LXV 74, 75, 76, 77, 78, 98, LXIX 290, 435.  
 — einseitige LXIX 445.  
 — Entwicklung aus Neuritis LXIX 441.  
 — bei entzündlichen Cerebralerkrankungen LXIV 540.  
 — bei Erkrankungen ohne Hirndrucksteigerung LXIX 441.  
 — Fehlen bei erhöhtem Hirndruck LXIX 335, 441.  
 — Hemianopsie bei LXX 355, 356, 363, 383.  
 — bei Hirnabszeß LXIX 438, 443.  
 — Hirnpunktion bei LXIX 320, 325, 331.  
 — bei Hydrocephalus LXV 75, 86, 91, LXIX 441, 443.  
 — Hydrocephalus bei LXIX 333.  
 — Hydrops vaginae n. opt. bei LXIV 538.  
 — Kopfschmerz und Erbrechen bei LXIX 332.  
 — bei Mandelentzündung LXI 480.  
 — bei Meningitis LXIX 443.

**Stauungspapille, Netzhautblutungen** bei LXIV 538.

- Neuritis und Perineuritis bei LXIX 338, 344.
- Obskurationen, Ursache der LXV 97.
- bei Ohrenleiden LXIX 344.
- Pathogenese LXIII 81, LXIV 511, 536, LXV 69, 88, 95, 474, LXIX 326, 343, 395.
- — Drucktheorie, Ödem des Optikus LXIX 336, 338.
- — — Erweiterung der Zentralvene LXIX 336.
- — — Entzündungstheorie LXIX 328, 394, 431.
- — — Toxine LXIX 431.
- — — Experimentelles LXIV 502, LXIX 410.
- — — Hirndrucksteigerung LXIV 536, LXV 69, 89, 93, LXIX 333, 343, 393.
- — — ohne Liquor LXV 93.
- — — Hirnödeme LXIX 395.
- — — Kompression des Sin. cavernos. LXIX 336, 392.
- — — Nephritis LXIX 337.
- — — patholog. veränderte Hirnlymphe LXIV 537, LXV 95.
- — — patholog. Anatomie LXV 83, 84, 85, 86, 462, LXIX 293, 329, 340, 342, 413.
- — — Marchi-Untersuchung LXIX 340, 342.
- — — Spontanheilung bei Pseudotumor LXIX 301.
- — — bei Syphilis LXIX 300.
- — — bei Turmschädel LXIX 301.
- — — Trennung von Neuritis optica LXIX 327, 435.
- — — Trepanation, s. d.
- — — bei Tumor cerebri LXIV 536, 537, LXV 73, 83, 85, LXIX 290, 431, LXX 363.
- — — Einfluß des Alters LXIX 443.
- — — — des Sitzes auf die Häufigkeit derselben LXIX 446.
- — — — Häufigkeit LXIX 442.
- — — ohne Tumor cerebri LXIX 308.
- — — bei Tumor intraocularis LXIX 444.
- — — — orbitae LXV 460.
- — — nach Unterbindung des Optikus LXIV 528.
- — — Verhalten der Zentralgefäße LXIV 538, LXIX 414.
- — — weiße Herde in der Retina bei LXX 222.

**Stereoskop** zur Kontrolle bei der Schieloperation LXIX 554.

**Stereoskopbilder, Erklärung der** Scheinbewegung LXI 491, LXIII 462.

— von Hausmann LXI 564.

**Stereoskopischer Apparat** LXI 566.**Stilling's Tafeln** LXII 466.**Strabismus, Amblyopie** bei LXIX 552, LXX 180.

- — — Behandlung LXIX 558.
- — — Besserung nach Operation LXX 178.
- — — des Schielauges LXIX 552, LXX 180.
- — — — — Behandlung LXIX 558.
- — — absolute Lokalisation LXVI 120.
- — — Bewegung des schielend. Auges nach oben bei Verdecken desselben LXII 447.
- — — Dunkeladaptation bei LXV 372.
- — — Erlernung des LXIX 543.
- — — des Binokularsehens bei LXIX 554.
- — — Höhenablenkung bei Seitenablenkung LXIX 548.
- — — bei Hyperopie, Binokularsehen bei LXX 187.
- — — — — nach der Operation LXX 188.
- — — — — konvergenter, Häufigkeit LXX 187.
- — — — — Theorie LXX 185, 187.
- — — innere Hemmung bei LXVII 474.
- — — und Refraktion LXIX 550.
- — — Sehstärke des fixierend. A., Sinken bei binokul. Einstellung LXVII 474.
- — — Therapie LXIX 554.
- — — Ätzung der Conjunct. LXVIII 469.
- — — Excision von Conjunct. LXVIII 469.
- — — s. Schieloperation.
- — — Untersuchung LXIX 553.
- — — Winkel des. Beziehung zum Winkel der anomalen Sehrichtungsgemeinschaft LXVII 472.
- — — s. auch Schielen usw.

**Strahlen, s. Lichtstrahlen.****Stratum sagittale ext., s. Längsbündel, unteres.**

— int., s. Sehstrahlung.

**Streptokokken-Impfung, angeborene** Katarakt bei Meerschweinchen nach LXV 358.

- bei Keratit. purul. LXVI 317.
- — Toxin. Wirkung auf die Conjunct. LXVIII 79, 80, 82.

**Stroboskopbilder** LXI 491.**Strömung** in der vorderen Kammer LXIV 481.

**Strohalm**, Verletzung d. A. durch LXVI 298, 307, 308, 311.  
**Stromazellnetz** der Iris LXIV 341, 350, 359.  
**Struma** nach Thyreoidinfütterung LXI 503.  
**Strychnin**, Angriffspunkt LXV 314.  
 — Dosis LXV 307.  
 — Wirkung aufs A. LXV 302.  
 — — — Doppelseitigkeit LXV 313, 316.  
 — — auf die Dunkeladaptation LXV 307.  
 — — auf das Gesichtsfeld LXV 303, 305.  
 — — — den Lichtsinn LXV 304.  
 — — — die Sehschärfe LXV 303, 305, 316.  
**Subarachnoidealraum**, Verbindung mit d. Hirnventrikeln LXIV 513.  
 — — — dem Scheidenraum d. Optik. LXIV 514.  
 — — — Zentralkanal und den Perivaskularräumen des Gehirns und Rückenmarks LXIV 514.  
 — Zinnobereinspritzungen in den, Leukoeytenanhäufung nach LXIV 529.  
 — — Verbreitung im Auge LXIV 530.  
 — — — Gehirn LXIV 530.  
 — — — Optikus LXIV 528.  
 — — — in den perivaskulären Räumen LXIV 529.  
**Sublimat** zur Fixation des Sehpurpurs LXI 561.  
**Sublimatfixierung** LXIV 239.  
**Sublimatinjektionen**, subkonj., Veränderungen im Kammerwinkel nach LXVI 338.  
**Sublimatirübung** der Cornea LXIII 344, 356.  
**Suggestion**, Einfluß bei okularer Therapie der Neurasthenie LXII 429.  
**Suprachorioidea** LXI 408.  
**Suprachorioidealraum**, Emissarien LXI 408.  
 — Obliteration bei sympath. Entzündung LXI 413.  
**Supratraktionssichel** LXVII 386, 393.  
**Sykosis**, Begriff LXIX 497.  
**Symblepharon**, totales, nach Kalkverletzung LXII 82.  
**Symphathikus**, Einfluß auf d. intraokul. Druck LXIV 454, 472.  
 — — — die Kammerwassersekretion LXIV 454.  
 — Resektion bei Glaukom LXIV 397.  
 — — bei Hydrophthalm. cong. LXIII 238.

**Symphathische Entzündung** nach Abtragung eines Hornhautstaphyl. LXI 372.  
 — Antikörper im Blut bei LXII 200.  
 — bakteriolog. Blutuntersuchung bei LXII 193, 226.  
 — bei Chorioidealsarkom LXI 373, LXV 148.  
 — bei Chorioiditis LXI 377, 405, LXV 142, LXX 466.  
 — Diagnose LXII 220.  
 — — histologische LXV 135, 143, 149.  
 — Entzündung anderer Organe bei LXII 215.  
 — trotz Enukleation LXI 378, LXII 200, LXX 470.  
 — Experimentelles LXII 195.  
 — — Blutübertragung LXII 204, 210, 221.  
 — — Implantation von Gewebstücken LXII 203, 210, 221.  
 — — Injektion von Reinkulturen LXII 212.  
 — Formen LXI 425.  
 — Häufigkeit LXI 449.  
 — Heilung LXI 378.  
 — Hyphäma bei LXI 375.  
 — Hypopyon LXI 377.  
 — Inkubationszeit LXI 377, 449, LXII 199, LXIX 562, 567, LXX 467, 485.  
 — — Maximum LXIX 570.  
 — — Minimum LXIX 569.  
 — nach Iridektomie LXI 372.  
 — nach Iridoeyklitis bei Sark. chor. LXI 373.  
 — bei Iritis serosa traumat. LXX 473.  
 — Kasuistik LXI 370, LXII 201, 208, 220, LXIV 325, LXIX 560, LXX 465.  
 — Kopfschmerzen bei LXII 220, 221.  
 — Krankheitsbegriff LXIX 574.  
 — Kulturen LXII 204, 210, 211, 221.  
 — Meningitis bei LXII 213.  
 — Metastasentheorie LXII 196, 197, 219, LXX 468.  
 — Migrationstheorie LXI 410.  
 — Mikroorganismen LXI 499, LXII 194, 211, 217, 225.  
 — — im Blut LXII 197, 208, 211.  
 — — im Conjunktivalsack LXIX 572.  
 — — Elektivität für die Uvea LXIX 573.  
 — — Übergang auf den Fötus LXII 222.  
 — — auf der Urogenitalschleimhaut LXIX 575.  
 — mikr. Befund am sympathisierend. A. LXI 379, LXX 467, 471, 476.  
 — Neuritis optica bei LXIX 563.



**Sympathische Entzündung, Neuritis optica, Pathogenese LXIX 563.**

- als Neuritis retrobulb. LXI 434.
- ophthalm. Befund LXIX 560, LXX 466.
- nach Panophthalmie LXI 431.
- Pathogenese LXI 366, 372, 434, 447, 450. LXII 193, 215, LXVI 8, 68, 157, LXIX 566, 575, 576, LXX 468, 481.
- patholog. Anatomie bei experimenteller LXII 207, 213.
- nach perforier. Hornhautgeschwür LXI 372.
- plastische Exsudation bei LXI 425, LXV 145, LXX 418.
- Prognose LXI 378.
- prognostische Bedeutung der sympathisierend. Entzündung LXI 379.
- bei Reizlosigkeit des verletzten A. LXI 407.
- und Reizung, Diff.-Diagnose LXI 433.
- Rezidiv nach Operationen LXI 421.
- Serumtherapie LXII 209.
- spätes Auftreten, Pathogenese LXI 420, LXIX 571.
- nach Staroperation LXI 372.
- Statistik LXI 367.
- nach subkonjunktivaler Skleralruptur LXI 449, LXIX 573.
- Taubheit bei LXI 450.
- Therapie: Enukleation LXI 433, 451.
- — Exenteration LXI 450.
- — Neurotomia optico-cil. LXI 450.
- — Quecksilbereinreibungen LXIX 560.
- toxische Theorie LXVIII 157.
- Übertragungsbahn LXI 450, LXII 197, LXIX 564.
- nach Ulcus corn. mit Irisvorfall LXI 435.
- als Uveitis LXIX 560.
- durch Verknöcherungen LXI 424.
- Verlauf LXI 378.
- Wesen LXIX 575.

**Sympathische Reizung LXI 352.**

- Befund LXI 431.
- Einfluß der Enukleation LXI 432.
- Symptome LXI 432.

**Sympathisierende Entzündung LXI 365, 447.**

- Ähnlichkeit mit Tuberkulose LXI 385.
- Anfangsstadium LXX 482.
- anatomischer Befund und klinische Diagnose LXI 435, LXV 149.
- — ähnlicher LXI 437, LXIX 172.
- Bezeichnung LXI 431.

**Sympathisierende Entzündung, Charakteristisches der LXI 379, 415, LXIX 176.**

- Diagnose LXI 451.
  - Eintritt nach der Verletzung LXI 416, LXX 478.
  - und Endophthalmitis LXI 427, LXV 135, LXX 467, 470, 477.
  - epitheloide Zellen LXI 380, LXV 139, LXX 477.
  - erste Symptome LXI 419.
  - Herde auf der Chorioidea LXI 408.
  - — in der Chorioidea LXI 406, LXX 467, 482.
  - — auf der inneren Oberfläche der Chorioidea LXI 403, LXV 143.
  - — in der Sklera LXI 409, LXX 479.
  - hintere Synechien bei LXV 146.
  - hyaline Kugeln bei LXI 385.
  - und Iritis serosa traumat. LXI 445.
  - Lymphocyten bei LXI 379, LXV 139, LXX 474, 477.
  - Mastzellen bei LXI 385.
  - plastische Exsudation LXI 422.
  - — — Ursachen LXI 427.
  - polynukleäre Leukocyten LXI 385.
  - prognostische Bedeutung LXI 379.
  - Riesenzellen bei LXI 384, LXV 139.
  - Rückbildung der Infiltration LXI 411.
  - Schwartenbildung LXI 412.
  - ohne sympathische Entzündung LXI 432, LXX 475.
  - und traumatische fibrinös-plastische Uveitis LXV 141, 142, 146.
  - — — Iridocyklitis LXV 141.
  - Ursachen LXI 372, 431.
  - Veränderungen der Chorioidea LXI 394, 403, 415, LXV 142, LXX 477.
  - — des Ciliarkörpers LXI 390, 414.
  - — der Iris LXI 386, 414, LXV 140.
  - — des Optikus LXI 410.
  - — der Retina LXI 409, LXX 471.
  - Verhalten der Gefäße der Uvea LXI 399.
  - Verknöcherung bei LXI 404, LXX 467.
  - Zellformen bei LXI 379, LXIV 294.
- Sympathisierende Infiltration LXI 379.**
- Rückbildung LXI 411, LXV 147.
- Syncephalus thoracopagus LXVIII 243.**
- — Entstehung LXVIII 247.
- Synectium LXII 507, 511, LXVIII 574.**
- Syndaktylie LXIII 26.**
- Pathogenese LXIII 36.

**Synechie**, hintere, Entstehung der angeborenen LXIV 235.

— — totale LXI 353.

— periphere, ringförmige LXIII 522.

— vordere, und Hypertonie LXIX 254.

**Synostosis praematura**, Ursachen LXVIII 425.

**Syphilis**, cerebro-spinale LXX 342.

— Erreger, Toxine des LXVI 240.

— — Übertragung ins Fruchtwasser LXVI 240.

— Gefäßerkrankungen bei LXVI 233.

— hereditaria, Entwicklungshemmungen bei LXVI 227.

— — des Auges bei LXVI 228.

— Therapie bei cerebraler LXX 346.

— Ursache von Hydrophthalm. cong LXIII 211, 228.

## T.

**Tabaksamblyopie**, s. Amblyop. intoxic.

**Tabes**, Sehnervenatrophie bei LXVIII 132.

**Tätowierung** von Hornhautnarben, Methode LXII 376.

**Tapetum cerebri**, Veränderungen bei Rindenblindheit LXII 291, 296, 304, 305.

**Tarsaldrüsen**, Acini LXVI 543.

— Anzahl LXVI 542.

— Ausführungskanal LXVI 542.

— Basalmembran LXVI 544.

— Charakter LXVI 542.

— cystische Degeneration bei Trachom LXIII 391.

— Entwicklungsgesch. LXVI 559, 560, 562, 563, 564, 565, 568.

— Form LXVI 542.

— Lage LXVI 542.

— Veränderungen bei Conj. diphther. LXVII 155, 167, 168.

— — — Trachom LXIX 510.

**Tarsus**, Entwicklungsgesch. LXVI 557.

— des Lidrandes LXVI 546.

— Tuberkulose des LXI 182, LXVI 46, 90.

— Veränderungen bei Trachom LXIII 300.

**Tastreiz**, Verschmelzungsfrequenz bei LXVII 161.

**Taube**, Orbita der LXIII 90.

— Stäbchen-Zapfennenglieder, bläuliche Färbung der LXIII 95.

**Taubenkopf**, Durchleuchtbarkeit LXIII 91.

**Taubheit** bei sympath. Entzündung LXI 450.

**Technik**, anatomische, bei Gefäßerkrankungen der Retina LXI 5.

— mikroskopische, s. d.

**Temperatur** der Bogenlampe LXV 111.

— Einfluß auf die Filtration des Auges LXIV 60, 450.

— — auf die elektr. Leitfähigkeit des Kammerwassers LXIX 136.

— — auf die Viskosität von Flüssigkeiten LXIV 71.

— des Gasbrenners LXV 111.

— künstlicher Lichtquellen, Einfluß auf ihr Spektrum LXIX 43.

— der vordern Augenteile LXIV 485.

**Tenon'sche Kapsel**, Entwicklungsgesch. LXIX 205, 206, 207, 218.

**Tenon'scher Raum**, Verbindung mit dem Scheidenraum des Optik. LXIX 407.

**Tenotomie**, s. Schieloperation.

**Teratogenetische Terminationsperiode** LXIII 12.

**Teratom** und Dermoide. Unterschied LXIII 14, 16.

— Erklärung LXIII 11, 14.

— der Orbita, angeb. LXIII 1.

— — — Erklärung LXIII 13.

— — — Exophthalmus bei LXIII 9.

— — — Kasuistik LXIII 5.

— — — klin. Eigentümlichkeit LXIII 9.

— — — Mortalität LXIII 10.

— — — Typen LXIII 12.

— — — Wachstum LXV 10.

— — — Zusammensetzung LXIII 5, 10.

**Terminales Licht** LXII 25.

**Tetanus** nach Gelatineinjektion LXII 169.

**Thalamus opt.**, s. Sehlügel.

**Theromorphie** im Auge eines Kindes LXV 155.

**Thioninfärbung** LXIV 248.

**Thrombose** bei Conjunct. diphther. LXVII 168.

— Entstehung LXI 91, 102.

— der Orbitalvenen, Diagnose LXII 25.

— Wirkung auf die Gefäßwand LXI 320.

**Thrombus**, Färbung LXI 20.

— Fibrinmassen im LXI 20.

— Kanalisation LXI 139, 143.

— mikr. Befund LXI 20, 82.

— Organisation LXI 25, 69, 82, 88, 265, 320.

**Thyreoidinamblyopie**, s. Ambl. intoxicat.

- Digitized by Google

**Tränenabfuhrwege**, permanente Drainage, Indikationen LXVII 110.  
 — — — Instrumentarium LXVII 90.  
 — — — Methode LXVII 93, 104, 112.  
**Tränenabsonderung** von der Conjunctiva LXIII 295.  
 — bei Dakryops LXI 346.  
 — nach Durchschneidung der Ausführungsgänge der Tränendrüse LXII 77.  
 — Meßmethode LXII 76.  
 — Quellen LXIII 295.  
**Tränenbein**, Nekrose, Therapie LXVII 112.  
**Tränendrüse**, adenoides Gewebe in der LXII 144.  
 — Ausführungsgänge LXIV 210.  
 — bei Cyklopie LXVIII 264.  
 — Cyste, s. Dakryops.  
 — Entwicklungsgeschichte LXIV 209, LXIX 193.  
 — — bindegeweb. Teil LXIX 218.  
 — — Drüenschläuche LXIX 212.  
 — — erstes Auftreten LXIX 213.  
 — — interglanduläre Membran LXIX 206, 219.  
 — — Lidpartien LXIX 209, 222.  
 — — Orbitalpartien LXIX 209, 222.  
 — Hydatid der LXI 342.  
 — Innervation LXIII 295.  
 — lymphomatöse Erkrankung LXII 188.  
 — tubulöse Natur LXI 341.  
 — Veränderungen bei Dakryops LXI 341, 348.  
 — — nach Durchschneidung der Ausführungsgänge LXII 73, 80.  
 — des Kaninchens, Lage und Bau LXII 75.  
**Tränenleiden**, Therapie mit permanenter Drainage LXVII 88.  
 — — mit Sondierung LXVII 88.  
**Tränennasenkanal**, Entwicklung LXII 379.  
 — Klappe im LXIII 201.  
 — nasale Öffnung LXVII 113.  
 — Stenosen, Therapie LXVII 110.  
**Tränenpunkt**, überflüssige LXII 397.  
**Tränenröhrchen**, Anzahl beim Kaninchen LXII 391.  
 — — beim Schwein LXII 388.  
 — Entwicklung LXII 394.  
 — — bei Amphibien LXII 380.  
 — — — Huhn LXII 381, 383.  
 — — — Kaninchen LXII 391.  
 — — — Katze LXII 390.  
 — — — Maus LXII 390.  
 — — — Meerschweinchen LXII 388.  
 — — — Reh LXII 390.  
 — — — Säugetieren LXII 380.  
 — — — Schaf LXII 390.

**Tränenröhrchen**, Entwicklung beim Schwein LXII 381, 383.  
 — temporale Verziehung LXIII 39.  
**Tränensack**, Cysten, Therapie LXVII 110.  
**Tränensackblennorrhoe** durch Pneumokokken LXII 223.  
 — Therapie LXVII 110.  
 — Tuberkulose bei LXVI 67.  
**Tränensackexstirpation**, Indikationen LXVII 87.  
**Tränenträufeln**, Beseitigung durch Entfernung der Liddrüse LXII 73.  
 — s. Epiphora.  
**Trepanation** LXV 78, 96, LXIX 290, 295, 322, LXX 355.  
 — Indikation LXV 79, LXIX 325.  
 — bei Stauungspapille, Bedeutung des Ortes der Operation LXIX 319, 324.  
 — — — Einfluß auf das Sehvermögen LXIX 296, 323.  
 — — — — die Lebensdauer LXIX 303.  
 — — — — Einwände LXIX 300.  
 — — — — mit oder ohne Eröffnung der Dura LXIX 315, 322, 324.  
 — — — Gefahren LXIX 311, 323.  
 — — — — Erschütterungen des Schädels LXIX 319.  
 — — — — Hirnprolaps LXIX 321, 324.  
 — — — — Infektion LXIX 313.  
 — — — — derosteoplastisch, Methode LXIX 318.  
 — — — — plötzliche Entleerung des Liquor LXIX 317.  
 — — — — Quetschung der Hirnteile LXIX 320.  
 — — — — Shock LXIX 314.  
 — — — — bei Gumma cerebri LXIX 301.  
 — — — — Mortalität LXIX 296, 324.  
 — — — — Narkose bei LXIX 314, 324.  
 — — — — Rückgang dieser LXIX 316, 330.  
 — — — — bei Tumor cerebri, Einfluß auf die Lebensdauer LXIX 306, 323.  
 — — — — — auf das Sehvermögen LXIX 298.  
 — — — — — Mortalität LXIX 297.  
 — — — — — ohne Tumor LXIX 308, 323.  
 — — — — — zweizeitiges Verfahren LXIX 314.  
 — — — — bei Turmschädel mit Papillitis LXVIII 419, 424.  
**Trigeminus** (nerv.), Durchschneidung, Fibrinausscheidung im Kammerwasser nach LXIV 452.

**Trigeminus**, Einfluß auf den intraokul. Druck LXIV 451, 454, 472.

— — — die Sekretion des Kammerwassers LXIV 451, 453, 454.

— Reizung, Fibrinausscheidung im Kammerwasser nach LXIV 451.

**Triplopie**, s. Dreifachsehen.

**Tritanopie**, s. Blaublindheit.

**Triton**, Glaskörperentwicklung beim LXV 228.

**Trypanosomen-Injektion** ins Blut, Conjunctivitis nach LXVIII 173.

**Tuberkel**, abgekapselter LXI 177.

— Riesenzellen im LXI 179.

**Tuberkelbazillen** im Chalazion LXVI 90.

— Impfung mit, angeborene Katarakt bei Meerschweinchen nach LXV 358.

— von Menschen und Rindern, Virulenz für Kaninchen LXVI 28.

**Tuberkulin** zu diagnostischen Zwecken LXVI 65.

— — — bei Uveitis chron. LXVI 66.

**Tuberkulin-Präparate** LXIX 232.

— Alt-Tuberkulin LXIX 232.

— Anwendungsweise LXIX 232.

— Bazillenemulsion LXIX 234, 251.

— Anwendungsweise LXIX 234.

— Neu-Tuberkulin (T. R.) LXIX 233.

— Anwendungsweise LXIX 233.

**Tuberkulinprobe** bei Augenkrankheiten LXVI 67.

— — Keratitis parenchym. LXVI 68.

— — Skleritis LXVI 84.

— — Skrofulose LXVI 69.

— — Uveitis chron. LXVI 70.

— — — lokale Reaktion LXVI 74, 75.

**Tuberkulin-Reaktion** LXVI 67.

**Tuberkulin-Therapie** bei Augentuberkulose LXVI 91, LXIX 234.

— — — Methode LXVI 94.

— — — Rezidive LXIX 250.

**Tuberkulose**, abgeschwächte LXVI 6.

— des Auges, endogene, Experimentelles LXVI 9, 28.

— — — gutartige Formen LXVI 5.

— — — Katarakta capsular. bei LXI 197.

— — — Linsenschrumpfung bei LXI 197, 214.

— — — Pathogenese LXI 183.

— — — Veränderungen des Glaskörpers bei LXI 197, 214.

— — — bei Haustieren LXI 152.

— — — — Ausgang LXI 217.

— — — — Dauer LXI 217.

— — — — Doppelseitigkeit LXI 198, 217.

— — — — Geschlecht LXI 98.

**Tuberkulose** des Auges bei Haustieren, Häufigkeit LXI 198.

— — — — klin. Symptome LXI 215.

— — — — Untersuchungstechnik LXI 159.

— — — — beim Kalb LXI 155.

— — — — Pferd LXI 154.

— — — — Rind LXI 153, 154, 155, 156, 157, 198.

— — — — Schwein LXI 153, 173, 198.

— der Chorioidea, akute Miliar- LXI 184.

— — — — — Anzahl der Tuberkel LXI 185.

— — — — — hämatogene LXI 184.

— — — — — lymphogene LXI 184.

— — — — — Pathogenese LXI 184.

— — — — — Sitz LXI 185.

— — — — — Ausbreitung LXI 186.

— — — — — chronische Lokal- LXI 185.

— — — — — diffuse LXI 185.

— — — — — knötchenförmige LXI 186.

— — — — — tumorartige LXI 186.

— — — — — Komplikationen LXI 187.

— — — — — bei Haustieren, akute Miliar- LXI 200.

— — — — — Ausbreitung auf die Gefäße LXI 163, 164, 166, 168, 169, 202.

— — — — — chronische LXI 201.

— — — — — Ausbreitung LXI 202.

— — — — — Sitz LXI 201.

— — — — — klin. Symptome LXI 215.

— — — — — tumorartige LXI 203.

— — — — — Größe LXI 203.

— — — — — histolog. Eigentümlichk. LXI 203.

— — — — — Sitz LXI 203.

— — — — — Wachstum LXI 203.

— — — — — Verkäsung und Verkalkung LXI 165, 169, 171, 173, 203.

— — — — — beim Kaninchen, experiment. LXVI 36.

— — — — — beim Rind LXI 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167.

— — — — — Bedeutung des Tapetum fibrosum LXI 202.

— — — — — beim Schwein LXI 157, 161, 168, 171.

— — — — — Pathogenese LXI 172.

— des Ciliarkörpers LXI 187.

— — — — — Formen LXI 187.

— — — — — Glaskörperblutungen bei LXI 187, 197.

**Tuberkulose** des Ciliarkörpers als Granulationsgeschwulst LXI 187.  
 — — — klin. Bild LXI 187.  
 — — — mit Knötchenbildung LXI 187.  
 — — — bei Haustieren, Häufigkeit LXI 205.  
 — — — — Pathogenese LXI 205.  
 — — — beim Kaninchen, experiment. LXVI 35.  
 — — — beim Rind LXI 176, 178, 180.  
 — — — beim Schwein LXI 175.  
 — der Conjunctiva LXIX 244, 246, 248.  
 — — — Formen LXI 182.  
 — — — und Parinaud'sche Conjunct., Diff.-Diagn. LXIII 56.  
 — — — Pathogenese LXI 182.  
 — — — bei Haustieren LXI 199.  
 — — — — Pathogenese LXI 199.  
 — — — bei Kaninchen LXI 199, LXVI 45.  
 — — — bei Meerschweinchen LXI 199.  
 — — — bei Papageien LXI 153, 199.  
 — der Cornea LXI 191, LXII 491, LXIX 241, 242, 243, 248.  
 — — — Formen LXI 191.  
 — — — Häufigkeit der einzelnen LXI 193.  
 — — — knötchenförmige LXI 192, LXII 525.  
 — — — parenchymatöse LXI 191.  
 — — — primäre LXI 193.  
 — — — sklerosierende LXI 192, LXVI 39, 89.  
 — — — bei Haustieren LXI 210.  
 — — — — Formen LXI 210.  
 — — — — Pathogenese LXI 210.  
 — des Glaskörpers LXI 197.  
 — — — bei Haustieren LXI 214.  
 — Häufigkeit LXVI 67.  
 — der Iris LXI 187, LXIX 84, 85, 88, 90, 236, 237, 238, 240, 246.  
 — — — abgeschwächte LXI 188.  
 — — — Abkapselung LXI 208.  
 — — — Formen LXI 188.  
 — — — Granulationsgeschwulst LXI 189.  
 — — — klin. Erscheinungen LXI 188.  
 — — — knötchenförmige LXI 189.  
 — — — Lebensalter LXIX 89.  
 — — — primäre LXI 183, 187.  
 — — — Riesenzellen LXI 189, 208, LXIX 86, 90.  
 — — — sekundäre LXI 187.  
 — — — Verhalten der Cornea LXI 216.  
 — — — Verlauf LXI 187.  
 — — — bei Haustieren LXI 206.

**Tuberkulose** der Iris bei Haustieren, histolog. Eigentümlichk. LXI 208.  
 — — — — klin. Symptome LXI 216.  
 — — — — knötchenförmige LXI 207.  
 — — — — tumorartige LXI 207.  
 — — — — Wachstum LXI 207.  
 — — — beim Kaninchen, experiment. LXVI 29.  
 — — — und des Ciliarkörpers, beim Rind LXI 176, 178, 180.  
 — bei Keratitis parenchym. LXVI 68, 89.  
 — der Lider, Formen LXI 182.  
 — — — bei Haustieren LXI 199.  
 — — — beim Kaninchen LXVI 46.  
 — — — bei der Katze LXI 153, 199.  
 — der Linse LXI 196.  
 — — — bei Haustieren LXI 217.  
 — des Optikus LXI 195.  
 — — — entzündliche LXI 196.  
 — — — Formen LXI 195.  
 — — — Häufigkeit LXI 195.  
 — — — knötchenförmige LXI 195.  
 — — — Pathogenese LXI 195.  
 — — — tumorartige LXI 196.  
 — — — bei Haustieren LXI 213.  
 — — — — Pathogenese LXI 213.  
 — — — beim Rind LXI 213.  
 — der Optikuscheiden beim Schwein LXI 173, 214.  
 — bei Phlyktänen LXVI 69.  
 — der Retina, entzündliche LXI 194.  
 — — — Folgeerscheinungen LXI 195.  
 — — — Formen LXI 193.  
 — — — granulationsartige LXI 194.  
 — — — knötchenförmige LXI 193, LXVI 61.  
 — — — — Sitz LXI 194.  
 — — — Pathogenese LXI 193.  
 — — — bei Haustieren, entzündliche LXI 211.  
 — — — — Formen LXI 211.  
 — — — — granulationsartige LXI 212.  
 — — — — knötchenförmige LXI 212.  
 — — — — Pathogenese LXI 211.  
 — — — — tumorartige LXI 212.  
 — — — beim Rind LXI 164, 165, 167.  
 — — — — Schwein LXI 170, 171, 172.  
 — der Sklera LXI 190.  
 — — — Formen LXI 191.  
 — — — klinisch. Bild LXI 191.  
 — — — Pathogenese LXI 190.  
 — — — primäre LXI 190.  
 — — — Verlauf LXI 191.  
 — — — bei Haustieren LXI 209.  
 — — — — Pathogenese LXI 209

- Tuberkulose** der Sklera bei Haustieren, Verlauf LXI 209.  
 — — — beim Rind LXI 179.  
 — — — beim Schwein LXI 169, 171.  
 — bei Skrofulose LXVI 69.  
 — des Tarsus LXI 182, LXVI 90.  
 — des Tierauges LXI 152.  
 — bei Tränensackblennorrhoe LXVI 67.  
 — Ursache von chron. Uveitis LXVI 2, 99.  
 — der Uvea bei Haustieren, Gefäßveränderungen LXI 205.  
 — — — — Häufigkeit LXI 200.  
**Tuberkulöse Neubildungen**, Resistenz der Blutgefäße in LXI 203.  
 — Umwandlung in Granulationsgewebe LXI 204.  
**Tumor cerebri**, Diagnose LXIX 308.  
 — Entzündungen bei LXIX 431.  
 — Hemianopsie bei LXII 370.  
 — Hirndruck bei, Entstehung LXIX 432.  
 — Sehnervenatrophie bei LXVIII 137.  
 — Stauungspapille bei, s. d.  
 — Toxinbildung bei LXIX 432.  
**Tumoren**, entwicklungsgesch. Anlage LXVIII 21.  
 — intraokulare, Diagnose LXIX 281.  
 — — Stauungspapille bei LXIX 444.  
**Turmschädel**, Divergenz d. A. bei LXVIII 417, 418.  
 — harter Gaumen bei LXVIII 422.  
 — intrakranieller Druck bei LXVIII 423.  
 — Kasuistik LXVIII 417.  
 — Knochenveränderungen bei LXVIII 421.  
 — Papillitis bei, Ursachen LXVIII 423.  
 — Pathogenese LXVIII 421.  
 — Prominenz d. A. LXVIII 417, 418, 420.  
 — Refraktion LXVIII 418.  
 — Röntgenuntersuchungen LXVIII 422.  
 — Sehnervenatrophie bei LXVIII 412, 417, 418.  
 — Sehschärfe bei LXVIII 417, 418, 420.  
 — Skelettveränderungen LXVIII 413.  
 — Stauungspapille bei, Spontanheilung LXIX 301.  
 — Trepanation bei LXVIII 419, 424.  
**Typhusbazillen**, Impfung in die vordere Kammer LXVI 448.

## U.

- Ulcus corneae**, s. Cornea und Keratitis.  
**Ultraviolette Strahlen**, Absorption durch Beleuchtungsgläser LXIX 65.  
 Schlaefke, General-Register.

- Ultraviolette Strahlen**, Absorption durch Beleuchtungsgläser, Einfluß des Bleigehalts LXIX 66.  
 — — — — der Dicke LXIX 65.  
 — — durch Brillengläser LXIX 455, 457.  
 — — durch die Cornea LXIX 454, 455, 462.  
 — — durch Euphosglas LXIX 69, 459.  
 — — durch den Glaskörper LXIX 455.  
 — — durch die Linse LXIX 61, 455, 462.  
 — — — Schutzbrillen, blaue LXIX 66.  
 — — — — Enixanthos LXIX 67.  
 — — — — Fieuzal LXIX 67.  
 — — — — gelbe LXIX 67.  
 — — — — rauchgraue LXIX 66.  
 — — durch Schwerflintglas LXIX 454.  
 — biologische Wirkung LXIX 71.  
 — Einwirkung auf Antitoxin LXVI 280.  
 — — auf Toxin LXVI 280.  
 — Fluoreszenz der Linse durch LXIX 61, 62, 453.  
 — des Kadmium-Zinkbogenlichtes. Absorption durch die Cornea LXVI 292.  
 — — — Absorption durch die Linse LXVI 292.  
 — — — baktericide Wirkung LXVI 292.  
 — in künstlichen Lichtquellen LXIX 50, 58, 461, LXX 404.  
 — — — — Einfluß der Temperatur LXIX 51.  
 — — — — elektr. Bogenlampen LXIX 56, LXX 404.  
 — — — — elektr. Glühlampen LXIX 56.  
 — — — — Gaslampen LXIX 54.  
 — — — — Öllampen LXIX 53.  
 — — — — Quecksilberdampf Lampe LXIX 57.  
 — des Magnesiumfunkens. Absorption durch die Cornea LXVI 287, 288.  
 — — — durch den Glaskörper LXVI 287.  
 — — — durch die Linse LXVI 287, 288.  
 — — — baktericide Wirkung LXVI 288.  
 — — — Einwirkung auf die lebende Netzhaut LXVI 288.  
 — — — Energie der LXVI 286.  
 — — — therapeutische Verwendung, Nachteile LXVI 289.  
 — — — Wellenlänge der LXVI 287.  
 — patholog. Wirkung aufs Auge LXIX 58, 72, 457, LXX 403.

**Ultraviolette Strahlen**, patholog.  
Wirkung auf die Conjunctiva LXIX 458.

- — — auf die Linse LXIX 458.
- physiolog. Wirkung aufs Auge LXIX 455.
- Rolle bei elektr. Ophthalmie LXIX 59.
- — bei Erythropsie LXIX 58, 60, 62, 457.
- — bei Farbenskotomen LXIX 458.
- — bei Katarakt LXIX 61, 63, 64, 453.
- — bei Schneeblindheit LXIX 59.
- Schutz der A. gegen LXIX 70.
- Schutzwirkung des Fensterglases LXIX 59.
- — der Linse LXIX 63.
- Sichtbarkeit LXIX 455.
- im Tageslicht LXIX 461, LXX 403.
- Veränderungen in der Retina durch LXIX 60.

**Unna-Pappenheim'sche Färbung**  
LXIII 59.

**Unterschiedsschwelle**, Prüfungs-  
methode LXV 366.

**Uvea**, Ektropium, s. d.

- Elektivität des Mikrobion der sym-  
path. Ophthalmie für die LXIX 573.
- — der Spirochäten für die LXIX 573.
- Tuberkulose der, Häufigkeit LXI 200.
- — bei Haustieren, Gefäßverände-  
rungen LXI 205.

**Uveitis chronica**, Ätiologie LXVI 7,  
47.

- Alttuberkulin zu diagnost. Zwecken  
LXVI 66.
- cas. LXVI 52.
- Häufigkeit und Verbreitung LXVI 99.
- Iridektomie bei LXVI 48.
- Krankheitsverlauf LXVI 48.
- patholog. Anatomie LXVI 51, 98.
- Tuberkulose bei LXVI 2, 6, 99.
- Überimpfen von Irisstückchen bei  
LXVI 49.
- — von Kammerwasser bei LXVI 50.

**Uveitis fibrinosa traumat.** und sym-  
pathisierende Entzündung LXV 140,  
141.

- Formen LXI 430.
- Krankheitsbild und Ätiologie LXII 219.

**Uveitis purulenta traumat.** und sym-  
pathisierende Entzündung LXV 141.

**Uveitis sympathica**, s. Sympathische  
Entzündung.

**Uveitis sympathica**, Therapie: Dia-  
phoresis LXVI 52.

- — Neutuberkulin LXVI 91, 99.
- — Punktion der vord. Kammer  
LXVI 51.
- Tuberkulinprobe bei LXVI 70.
- — lokale Reaktion LXVI 74, 75.

## V.

**Vakuolen** der Netzhautganglienzellen  
LXI 514, LXIII 89, 404.

- in Wucherungen und Geschwülsten  
des Ciliarepithels LXVIII 536, 546,  
564, 574.

**Variköse Nervenfasern** bei Gefäß-  
erkrankungen LXI 301.

- bei Morb. mac. Werlh. LXIV 180.
- Wesen LXIV 184, LXX 202.

**Vena centralis ret.**, abnormer Verlauf  
LXI 138, 317.

- Adventitia LXI 13.
- Altersveränderungen LXI 13.
- Durchmesser LXI 14.
- elastische Fasern LXI 13, 22.
- Endophlebitis LXI 2, 21, 28, 106,  
116, 128, 138, 272.
- — pathogenetische Bedeutung für  
den Arterienverschluß LXI 27.
- Endothelzellen LXI 13.
- Entwicklungsgesch. LXX 452, 463.
- Erkrankungen unter dem Bilde der  
Retinit. hämorrhag. LXI 77.
- Gefäßneubildung in der Wand der  
LXI 22.
- Histologie LXI 13.
- Intima LXI 13.
- Intimawucherung LXI 21, 81, 83,  
106, 115, 272, 315.
- kongenitale Enge in der Lamina  
LXI 138.
- marantische Thrombose LXI 90,  
103, 149, LXVIII 201.
- — — Sitz der LXVIII 205.
- Mesophlebitis LXI 21, 106, 116,  
128, 285.
- Mündung LXV 72.
- Muskularis LXI 13.
- Periphlebitis LXI 22, 285.
- posterior LXV 72.
- Sklerose LXI 280.
- — Arten LXI 323.
- Thrombose LXI 2.
- — Farbe der Mac. LXV 507.
- — Kanalisierung LXI 139, 143.
- — Krankheitsbild LXI 147.
- — ophthalmosk. Diagnose LXVIII 204, LXIX 442.



**Vena centralis ret., Verschuß LXI**

- 21, 28.
- und Arteriosklerose LXI 150, LXVIII 202.
- durch Endophlebitis LXI 104.
- — — anatom. Fälle LXI 96, 112.
- — — Glaskörperblutung bei LXI 110.
- — — Glaukom bei LXI 105.
- — — mikr. Befund LXI 106.
- — — Netzhautblutungen bei XI 110.
- — Reaktion der Venenwand bei LXI 28, 112, 139.
- durch Thrombose LXI 78.
- — — anatomische Fälle LXI 91.
- — — Entstehung LXI 89, 91, 102, 149.
- — — Glaukom bei LXI 79, 89, 149, LXIII 420.
- — — mikr. Befund LXI 82.
- — — Netzhautblutungen LXI 85, 88, 103, 148.
- — — bei Wanderkrankung LXI 113, 126, 136, 280, LXIII 513, 524.
- — — anatom. Fälle LXI 96, 144.
- — — Glaukom bei LXI 114, 126, 136.
- — — mikr. Befund LXI 115, 128, 137.
- — — Pathogenese LXI 145.
- Ursachen LXI 77, 150.

**Vena facialis ant., Thrombophlebitis der LXI 473.****Vena ophthalmica sup., Anastomosen LXIX 392.**

- Blutstrom der LXI 473, LXV 72.

**Vena optico-ciliaris LXIX 359.****Vena retino-ciliaris LXI 85, 88, 317.****Venae ethmoidales, Rolle bei Übertragung von Nasenentzündungen auf die Orbita LXI 477.**

- Verlauf LXI 477.

**Venae vorticosae, Druck in den LXIV 5.**

- Einfluß auf d. intraokul. Druck LXIII 541, LXVI 325.
- Verhalten bei Hydrophthalm. cong. LXIII 496, 541.

**Verband, lichtdichter LXIII 92.****Verblutung, Veränderungen der Netzhautganglienzellen nach LXIV 238, 250.****Verkalkung der Linse LXI 354.**

- im Sarkom d. Chorioidea LXIX 283.

**Verletzung d. A. durch: Blechstück LXI 223.****Verletzung d. A. durch: Dorn LXI 437.**

- Eisensplitter LXII 201, LXIV 290, 294, 302, 312, 316, 581, LXV 58, LXVI 124, 127, LXIX 2, LXX 482.
- Erde LXVI 305.
- Faustschlag LXII 241.
- Getreidekorn LXVI 303, 310.
- Glassplitter LXI 422.
- Holzsplitter LXII 243.
- Holzsplitter LXI 234, 441, 443, LXVI 301.
- Holzstiel LXII 220, 240.
- Kalk LXIV 580, 588, LXVI 300.
- Kapselsplitter LXII 527, LXIV 247.
- Kuhhorn LXVIII 497, 503.
- Messerstich LXII 208, LXX 475.
- Nadel LXI 436, LXVIII 496.
- Nagel LXVI 299, LXX 470.
- Patronenhülse LXIV 304.
- Pfeilschuß LXIV 308.
- Pfriemen LXVIII 502.
- Sand LXVI 299.
- Schere LXIV 291.
- Stein LXII 246, 528, LXIV 311, LXVI 306.
- Stocks Schlag LXI 231, LXX 469.
- Strohalm LXVI 298, 307, 308, 311.
- stumpfe Gewalt LXVIII 484.
- Zündhütchen LXII 528.
- Zweig LXVI 302, 307, 308.

**Verschmelzungsfrequenz b. Amblyop. cong. LXVIII 409.**

- bei Augenhintergrund-Erkrankungen LXIX 272, LXX 233.
- Begriff LXVIII 395.
- bei Chorioiditis LXIX 276.
- durch elektr. Reizung erzeugter Lichteindrücke LXVII 149.
- — — Abhängigkeit von der Reizstärke LXVII 154.
- — — Einfluß der Adaptation LXVII 156, LXVIII 404.
- — — der Druckblindheit LXVII 157.
- — — experimentelle Methode LXVII 151, LXVIII 401, LXX 233.
- zur Entdeckung der Simulation von Amblyopie LXVIII 410.
- bei Lichtreizung LXVII 158.
- lokale Unterschiede auf d. Netzhaut LXVIII 396.
- — Ursachen LXVIII 405.
- bei Netzhautablösung LXIX 275.
- — Netzhautblutungen LXIX 275.
- — Neuritis retrobulb. LXIX 273.
- — Neuroretinitis LXIX 275.
- — albumin. LXIX 274.
- — Schnervenatrophie LXIX 273, LXX 234.
- bei Tastreizen LXVII 161.

- Verschwindungsschwelle** LXI 538.  
**Vertikalablenkung**, Einfluß der Adduktion LXII 437.  
**Vertikaldivergenz**, absolute, bei Orthophorie LXII 412.  
 — — alternierende LXII 443.  
 — — Erklärung LXII 444.  
 — — Therapie LXII 448.  
 — atypische LXII 449.  
 — Entstehung LXII 419.  
 — Häufigkeit bei Asthenop. muscul. LXII 422.  
 — — — Epilepsie LXII 423.  
 — — — Neuropathikern LXII 422.  
 — — — Normalen LXII 422.  
 — Kasuistik LXII 450.  
 — paretische LXII 431.  
 — — Einfluß der Ab- und Adduktion LXII 437.  
 — — — der Kopfneigung LXII 435.  
 — — Merkmale LXII 432.  
 — positive und negative LXII 411.  
 — strabotische LXII 431.  
 — — Therapie LXII 440.  
 — Übergangsformen LXII 447.  
 — Ursache von Amblyopie LXII 418.  
 — — — Migräne LXII 418.  
 — — — nervösen Beschwerden LXII 419.  
**Vie d'Azyr'scher Streifen** LXII 338.  
**Vierhügel**, vordere, Beziehung d. Optikus zum LXVII 83.  
 — — — zum Pupillarreflex LXX 546, 561.  
**Viskosimeter** LXIV 70.  
**Viskosität** des destill. Wassers LXIV 70.  
 — — Kammerwassers, Einfluß der Temperatur LXIV 71.  
 — der physiolog. Kochsalzlösung, Einfluß d. Temperatur LXIV 71.  
**Volumsänderung** d. A. und intraokul. Druck LXIV 124.

## W.

- Wärmestrahlung**, Mydriasis auf LXV 113.  
**de Wecker's Nachstaroperation** LXIII 560.  
**Weigert's Elastinfärbung** LXI 229.  
**Weigert-van Gieson'sche Färbungsmethode** LXIV 248.  
**Weißer Flecke** der Retina, Entstehung LXIV 183.  
 — — — Vorkommen LXIV 184.  
**Weißes Licht**, Darstellung LXII 32.  
**Wicherkiewicz'sche Lösung** LXVI 416.

- Wilbrand'scher Prismenversuch** LXX 372.  
**Wimpern**, s. Cilien.  
**Wundinfektion**, endogene LXVIII 157.

## X.

- Xerosebakterien**, Pathogenität LXII 217.  
 — Wirkung auf d. Conjunct. LXVIII 108.  
**Xerosis conjunct.** bei Skorbut LXIV 175, LXVI 442.

## Z.

- Zahndurchbruch**, Glaukom bei LXIII 550.  
**Zahnextraktion**, Orbitalphlegmone nach LXI 476.  
**Zangenentbindung**, angeb. Hornhauttrübungen nach LXVI 255.  
**Zapfen**, s. Retina.  
**Zapfenschärfe** LXVI 464.  
**Zein**, Diffusion in die Linse LXII 111.  
**Zeiss'sche Drüsen** LXVI 534.  
 — Acini LXVI 535.  
 — Ausführungsgang LXVI 535.  
 — Bildung der Talgsubstanz in der LXVI 536.  
 — Entwicklungsgesch. LXVI 560, 567.  
 — Form LXVI 534.  
**Zenker'sche Lösung** LXIII 431, LXIV 244, LXVII 308.  
**Zentralgefäße**, abnormer Verlauf LXI 80, 314, 317.  
 — Altersveränderungen LXI 13.  
 — Eintrittsstelle in den Optikus LXI 14, 316, 317, LXV 463, 468.  
 — — — — bei anthropoid. Affen LXII 274.  
 — elastische Fasern LXI 13.  
 — Entwicklungsgesch. LXX 448, 464.  
 — Erkrankungen, Literatur LXI 324.  
 — — Prädisposition LXI 318.  
 — — Zirkulationsstörungen bei LXI 2.  
 — hämorrhagische Gefäßeinscheidung LXI 24, 264.  
 — Histologie LXI 12.  
 — der Katze LXIV 524.  
 — Lage bei Optikuskolobom LXV 207.  
 — Sklerose, Ätiologie LXI 322.  
 — — Alter LXI 322.  
 — — Arten LXI 321.  
 — Verhalten bei Chininvergiftung LXX 249, 251.  
 — — — chronischer Nephritis LXX 225.  
 — — — Druckwirkung auf das Sehnervenende LXIX 422.

- Digitized by Google

## II. Autorenregister.

### A.

- Asher, W.** Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. Marx (Straßburg) „Methodik der Gleichgewichtsstörungen für die Nähe LXIX 390.

### B.

- Balkaban, Th.** Intraokulares Sarkom LXIII 69—84.
- Baquis, E.** Über die angeborenen geschwulstähnlichen drüsigen Mißbildungen des vorderen Bulbusabschnittes LXIV 187—223.
- Über pathologische Anatomie und Pathogenese der Cyanosis retinae nebst Bemerkungen über die Pathogenese des Glaukoms LXVIII 177 bis 231.
- Bartels.** Erwiderung auf eine Bemerkung Dr. Ashers (Leipzig) zu dem Aufsatze von Dr. Marx (Straßburg): „Methodik der Gleichgewichtsprüfung für die Nähe“ LXIX 577—578.
- Behr, C.** Zur topischen Diagnose der Hemianopsie LXX 340—402.
- Behse, E.** Über den anatomischen Bau des Conus und der Aderhautveränderungen im myopischen Auge LXVII 379—438.
- Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Chinins LXX 239—253.
- v. Benedek, J.** Ein Beitrag zur Anatomie der präretinalen Hämorrhagie LXIII 418—429.
- Weitere Beiträge zur Anatomie der präretinalen Hämorrhagie nebst Bemerkungen über die Grenzmembran zwischen Netzhaut und Glaskörper LXX 274—298.
- Bergmeister, R.** Eine Theromorphie im Auge eines Kindes LXV 155 bis 171.

- Bernheimer, St.** Anophthalmus congenitus und die Sehbahn LXV 99 bis 105.

- Zur Kenntnis der Gudden'schen Kommissur LXVII 78—86.
- Weitere experimentelle Studien zur Kenntnis der Lage des Sphinkter- und Levatorkerns LXX 539—562.

- Bielschowsky, A.** Dr. W. Hausmanns Stereoskopbilder und ihre Verwendung LXI 564—569.

- und **Ludwig, A.** Das Wesen und die Bedeutung latenter Gleichgewichtsstörungen der Augen, insbesondere der Vertikalablenkungen LXII 400—463.

- Birch-Hirschfeld, A.** Der Einfluß der Helladaptation auf die Struktur der Nervenzellen der Netzhaut nach Untersuchungen an der Taube LXIII 85—111.

- Beitrag zur Kenntnis der Sehnerven-erkrankungen bei Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen der Nase LXV 440—485.

- Weiterer Beitrag zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf das menschliche Auge LXVI 104—119.

- und **Nobuo Inouye.** Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese der Thyreoidinamblyopie LXI 499—523.

- und **Tatsuji Inouye.** Experimentelle und histologische Untersuchungen über Netzhautabhebung LXX 486 bis 538.

- und **Ludwig, A.** Das Wesen und die Bedeutung latenter Gleichgewichtsstörungen der Augen, insbesondere der Vertikalablenkungen LXII 400—463.

- Bjerke, K.** Das Schielen LXIX 543 bis 558.

- Borschke, A.** Über die Theorie der skioskopischen Schattendrehung bei Astigmatismus LXIII 388—392.

**Borschke, A.** Ein experimenteller Beweis der Bedeutung des Spiegeloches für die skiaskopische Schattendrehung LXVI 195—200.

**Botteri, A.** Idiopathische Iridochorioiditis unter dem Bilde einer sympathisierenden Entzündung LXIX 172—183.

**Braunstein, E. P.** Erwiderung auf Dr. Heßbergs Mitteilung: Untersuchungen über die Verschmelzungsfrequenz bei Augenhintergrundserkrankungen LXX 233—235.

### C.

**Contino, A.** Über Bau und Entwicklung des Lidrandes beim Menschen LXVI 505—577.

**Cords, R.** Über die Verschmelzungsfrequenz bei periodischer Netzhautreizung durch Licht oder elektrische Ströme LXVII 149—161.

### D.

**Dauids, H.** Über den Nutzen des Neu-Tuberkulins (Bazillenemulsion) bei der Tuberkulose des Auges LXIX 231—253.

**Dimmer, F.** Die Macula lutea der menschlichen Netzhaut und die durch sie bedingten entoptischen Erscheinungen LXV 486—544.

— Lesen bei vertikaler Stellung der Zeilen LXVI 189—194.

**Dorfmann, R.** Über Pathogenese und Therapie des Turmschädels LXVIII 412—426.

### E.

**Edmund-Jensen.** Retino-chorioiditis juxtapapillaris LXIX 41—48.

**Elschnig, A.** Die elastischen Fasern in der Sklera myopischer Augen LXI 237—244.

— Über Keratitis parenchymatosa LXII 481—546.

— Bemerkungen über die „wahre Hypertrophie“ der äußeren Augenmuskeln LXIII 452—459.

— Die Topographie des Sehnerveneintritts bei einfacher Sehnerventröpfung LXVIII 126—154.

— und **Lauber.** Über die sogenannten Klumpenzellen der Iris LXV 428—439.

**Enslin.** Berichtigung zu meiner Arbeit: „Die Augenveränderungen beim Turmschädel, besonders die Sehnervenerkrankungen“ LXX 238.

**Erdmann, P.** Über experimentelles Glaukom nebst Untersuchungen am glaukomatösen Tierauge LXVI 325 bis 435.

**Eversheim, M.** Ein Beitrag zur Kenntnis des Pseudoglioms LXX 111 bis 122.

### F.

**Fleischer, Br.** Die Entwicklung der Tränenröhrchen bei den Säugetieren LXII 379—399.

— Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Mikrophthalmus und Colobomis LXVIII 427 bis 460.

**Franke, E.** Ein Beitrag zur Kenntnis der Irisgeschwülste LXX 332—339.

**Fuchs, E.** Über sympathisierende Entzündung (nebst Bemerkungen über seröse traumatische Iritis) LXI 365—456.

— Professor Wilhelm Czermak † LXV I—IV.

— Wucherungen und Geschwülste des Ciliarepithels LXVIII 534—587.

— Vordere Synechie und Hypertonie LXIX 254—271.

— Über Ophthalmia sympathica LXX 465—485.

**Fuerst, E.** Über eine durch Muskeldruck hervorgerufene Accommodation bei jugendlichen Aphakischen LXV 1—45.

### G.

**Garten, S.** Über die Veränderungen des Schpurs durch Licht LXIII 112—187.

**Gilbert, W.** Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der angeborenen Colobome des Augapfels mit besonderer Berücksichtigung des Sehnerven LXV 185—219.

— Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Kenntnis degenerativer Hornhauterkrankungen. I. Pannus degenerativus und Keratitis bullosa LXIX 1—40.

**Ginsberg.** Pigmentepithelien im Sehnervstamm bei Leucosarcoma chorioideae LXVIII 232—241.

**Goldzieher, M.** Über die Cyste der Tränendrüse — Dacryops LXI 339 bis 351.

— **W.** Ein Fall von hämorrhag. Adenie mit symmetrischen Lymphomen der Bindehaut LXVII 71—77.

— **W.** und **M.** Beitrag zur pathologischen Anatomie des Trachoms LXIII 287—318.

**Gullstrand, A.** Die Farbe der Macula centralis retinae LXII 1—72.

— Zusatz zu der Abhandlung über die Farbe der Macula centralis retinae LXII 378.

— Zur Maculafrage LXVI 141—188.

## H.

**Harms, A.** Anatomische Untersuchungen über Gefäßerkrankungen im Gebiete der Arteria und Vena centralis retinae und ihre Folgen für die Cirkulation mit besonderer Berücksichtigung des sog. hämorrhagischen Intarktes der Netzhaut LXI 1—151, 245—338.

**Heerfordt, C. F.** Einige Betrachtungen über das Wesen der sympathischen Uveitis anlässlich eines eigentümlichen Falles dieses Leidens LXIX 559—576.

— Über eine „Febris uveo-parotidea subchronica“, an der Glandula parotis und der Uvea des Auges lokalisiert und häufig mit Paresen cerebrospinaler Nerven kompliziert LXX 254—273.

**Heine, L.** Über Wahrnehmung und Vorstellung von Entfernung unterschieden LXI 484—498.

**Hertel, E.** Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Pupillenverengung auf Lichtreize LXV 106—134.

— Über einen neuen Apparat zur Bestimmung des Abstandes der Gläsermitten für die Fern- und Nahbrillen LXV 176—183.

— Experimentelles und Klinisches über die Anwendung lokaler Lichttherapie bei Erkrankungen des Bulbus, insbesondere beim Ulcus serpens LXVI 275—324.

— Untersuchungen über die elektrische Leitfähigkeit des Auges LXIX 126—144.

**Herzog, H.** Über die Erkrankung der Lidhaut des Menschen bei Invasion von Demodexmilben, nach Befunden an Augenlidern bei Trachomkranken LXIX 492—524.

**Hessberg, R.** Untersuchungen über die Verschmelzungsfrequenz bei Augenhintergrunderkrankungen LXIX 272—289.

**v. Hense, R.** Spontanruptur der hinteren Linsenkapsel nach doppelt perforierender Eisensplitterverletzung LXV 46—68.

**v. Hippel, E.** Ist das Zusammenvorkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? LXI 352—364.

— Weitere Beiträge zur Kenntnis seltener Mißbildungen LXIII 1—45.

— Pathologisch-anatomische Befunde bei seltenen Netzhauterkrankungen LXIV 157—171.

— Notiz über spontane Lochbildung in der Fovea centralis LXIV 172—174.

— Über experimentelle Erzeugung von angeborenem Star bei Kaninchen nebst Bemerkungen über gleichzeitig beobachteten Mikrophthalmus und Lidkolobom LXV 326—360.

— Über Netzhautablösung LXVIII 38 bis 76.

— Über Keratitis parenchymatosa und Ulcus internum corneae LXVIII 354—389.

— Nachtrag zu meiner Arbeit: „Über Netzhautablösung“ LXVIII 392 bis 394.

— Über die Palliativtrepanation bei Stauungspapille LXIX 290—354.

— Bemerkungen zu einigen Fragen aus der Lehre von den Mißbildungen des Auges LXX 314—331.

**Hoeg, N.** Über Drusen im Sehnervenkopf LXIX 355—389.

**Höpner.** Dauererfolge der vom 1. Okt. 1893 bis 30. Juni 1906 in der Leipziger Universitäts-Augenklinik operierten Myopen mit besonderer Berücksichtigung der postoperativen Netzhautabhebung LXX 1—64.

**Hosch, G.** Zur neuesten Theorie der progressiven Kurzsichtigkeit von Prof. Lange LXI 227—236.

**Hotta, G.** Das Auge der anthropoiden Affen. Beiträge zur vergleichenden Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung der Iris Muskulatur LXII 250—274.

## J.

**Jess, A.** Ein Fall von Sarkom der Chorioidea im frühen Kindesalter LXIX 281—289.

**Igersheimer, J.** Beitrag zur pathologischen Anatomie der Conjunctivodiphtherie LXVII 162—170.

**Isakowitz, J.** Messende Versuche über Mikropie durch Konkavgläser nebst Bemerkungen zur Theorie der Entfernungs- und Größenwahrnehmung LXVI 477—496.

## K.

**Kaiser, F.** Über einen Fall von Orbitalphlegmone mit Abszeßbildung in der Nasen-, Wangen- und Schläfengegend und mit Beteiligung der Nasenhöhle und des Rachens LXI 457—483.

**Klauber, E.** Einige histologische Besonderheiten der präretinalen Hämorrhagie LXX 299—313.

**Koster Gzn., W.** Über die Bestimmung der Sehschärfe nach den Methoden von Landolt und von Guillery LXIV 128—140.

-- Beitrag zur Kenntnis der Dauererfolge bei der operativen Behandlung des Glaukoms. Nach Untersuchungen von Dr. G. Z. van der Hilst Karweij an Patienten der Leidener Universitäts-Augenklinik LXIV 391—412.

— Die Röhren von Gratama zur Entdeckung der Simulation von Blindheit oder Schwachsichtigkeit eines Auges nebst einer Verbesserung dieses Apparates LXIV 502—510.

— Neue Sehproben LXIV 543—579.

— Ein Licht- und Farbensinnesmesser LXVI 497—504.

— Die permanente Drainage der Tränenabflußwege LXVII 87—118.

— Die permanente Drainage der Tränenabflußwege. Nachtrag LXVII 377.

**Krämer, R.** Beiträge zum Krankheitsbild der „Phakokele“ LXVII 41—57.

**v. Krüdener, H.** Zur Pathologie der Stauungspapille und ihrer Veränderung nach der Trepanation LXV 69—98.

**Kugel, L.** Ein Beitrag zu der v. Wecker'schen Tätowierung von Hornhautnarben LXII 376—377.

— Über eine neue Operationsmethode bei Nachstaren und Pupillensperre infolge von Staroperation LXIII 557—572.

## L.

**Landolt, E.** Die Reform der Bestimmung der Sehschärfe LXIV 598—611.

**Laqueur, L.** Die Schieloperation vor A. v. Graefe LXVIII 461—483.

**Lauber, H.** Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Iris und des Pigmentepithels der Netzhaut LXVIII 1—37.

**Leber, A. Th.** Zum Stoffwechsel der Krystalllinse LXII 85—125.

— Immunitätsverhältnisse der vorderen Augenkammer LXIV 413—444.

**Leber, Th.** Über die Entstehungsweise der nephritischen Netzhauterkrankung LXX 200—232.

-- **Pilzecker, A.** Neue Untersuchungen über den Flüssigkeitswechsel des Auges LXIV 1—127.

**Leonhardt, A.** Über subconjunctivale Pigmentierung nach Ruptura sclerae traumatica LXVIII 484—493.

**Levinsohn, G.** Über die hinteren Grenzsichten der Iris LXII 547—558.

-- Experimenteller Beitrag zur Pathogenese der Stauungspapille LXIV 511—542.

-- Kurze Bemerkungen zu der Aurel v. Szily'schen Arbeit: Über die hinteren Grenzsichten der Iris LXIV 594—597.

— Zur v. Szily'schen Kritik meiner kurzen Bemerkungen zu dessen Arbeit: Über die hinteren Grenzsichten der Iris LXV 362—363.

**Levy, M.** Über einen Fall von angeborener Tritanopie (Blaublintheit) LXII 464—480.

**Loeser, L.** Das Verhalten der Sehschärfe in farbigem Licht LXIX 479—491.

**Lohmann, W.** Über Commotio retinae und die Mechanik der indirekten Verletzungen nach Kontusion des Augapfels (Commotio retinae, Aderhaut- und Skleralruptur) LXII 227—249.

— Untersuchungen über Adaptation und ihre Bedeutung für Erkrankungen des Augenhintergrundes LXV 365—416.

— Über die lokalen Unterschiede der Verschmelzungsfrequenz auf der Retina und ihr abweichendes Verhalten bei der Amblyopia congenita LXVIII 395—411.

**Luedde, H.** Über Flächensarkom des Auges LXIII 468—480.

**Luedsgaard, K. K. K.** Lichtbehandlung von Conjunctivalleiden LXVI 578.

**M.**

- Manleiftner, C.** Zur Kenntnis der Augentuberkulose bei Rind und Schwein LXI 152—222.
- Marx, H.** Zur pathologischen Anatomie der Augenveränderungen bei Morbus maculosus Werlhofii LXIV 175—186.
- Methodik der Gleichgewichtsprüfung für die Nähe LXIX 184—191.
- Mauch, J.** Ein Fall von wahrer Hypertrophie der äußeren Augenmuskeln LXII 126—129.
- Meller, J.** Die lymphomatösen Geschwulstbildungen in der Orbita und im Auge LXII 130—192.
- Die Cyklodialyse und ihr Einfluß auf die intraokulare Drucksteigerung LXVII 476—536.
- Münch, K.** Über die Mechanik der Irisbewegung LXIV 339—379.

**N.**

- Natanson, S.** Über Mikrophthalmus und Anophthalmus congenitus mit serösen Orbitopalpebraleyst. LXVII 185—271.
- zur Nedden.** Bakteriologische Blutuntersuchungen bei sympathischer Ophthalmie und andern Formen von Iridochorioiditis LXII 193—226.
- Über Schädigung der Hornhaut durch Einwirkung von Kalk, sowie von löslichen Blei-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Alaun- und Quecksilberpräparaten, nebst therapeutischen Angaben auf Grund von experimentellen klinischen und chemischen Untersuchungen LXIII 319—387.
- Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen baktericider Substanzen im Auge nicht immunisierter Individuen LXV 267—301.

**O.**

- Oguchi, Ch.** Experimentelle Studien über Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität und der praktische Wert des Photometers von Hori LXVI 455—476.
- Beitrag zur Anatomie der Hornhautfistel nebst Bemerkungen über eine eigenartige Sehnervenexkavation bei sekundärem Glaukom (Glaskörperhernie) LXX 88—110.

- Ohm, J.** Ein Beitrag zur Kenntnis der verschiedenen Arten der absoluten Lokalisation beim konkomitierenden Schielen LXVI 120—140.
- Klinische Untersuchungen über das Verhalten der anomalen Sehrichtungsgemeinschaft der Netzhäute nach der Schieloperation LXVII 439—475.

**P.**

- Pagenstecher, H. E.** Über Pigmentstreifenbildung in der Netzhaut LXVII 298—306.
- Nachträgliche Bemerkungen zur „Pigmentstreifenbildung in der Netzhaut“ LXVIII 175.
- Pascheff, C.** Das Lymphangioma der Conjunctiva. Unter spezieller Berücksichtigung eines Falles von Lymphangioma cavernosum circumscriptum acquisitum limbi conjunctivae LXIII 188—199.
- Über einen Fall von subconjunctivalem Staphylokokkenabszeß LXVII 65—70.
- Plasmacellulare Bildungen (Plasmomen) der Bindehaut und der Hornhaut LXVIII 114—125.
- Pflüger, E.** Zur Lehre von der Bildung des Kammerwassers und seinen quantitativen Verhältnissen LXIV 445—480.
- v. Pflugk.** Der Einfluß des Jodkalium auf die Cataracta incipiens LXVII 272—297, 537—561.
- Pihl, A.** Über ein tumorähnliches Gebilde in einer leeren Augenhöhle. Pathologisch-anatomische Untersuchung LXI 223—226.
- Pilzecker, A., s. Leber, Th.**

**R.**

- Reis, W.** Über die Parinaudsche Conjunctivitis, zugleich ein Beitrag zur Plasmazellenfrage LXIII 46—68.
- Beiträge zur Histopathologie der parenchymatösen Erkrankungen der Cornea LXVI 201—262.
- Ein anatomisch untersuchter Fall von Evulsio nervi optici (Salzmann) bei Avulsio bulbi LXVII 360—369.
- v. Reuß, A.** Die Sehlleistung der Hypermetropen LXIX 106—125.
- Richter, H.** Der muskulöse Apparat der Iris des Schafes und seine Beziehungen zur Gestalt der Pupille LXX 407—447.



**Ruge, S.** Kritische Bemerkungen über die histologische Diagnose der sympathischen Augenentzündung nach Fuchs LXV 135—149.

## S.

**Salzmann, M.** Über die pathologische Anatomie und die Pathologie des Keratoconus LXVII 1—40.

**Schaff, E.** Der Zentralkanal des Glaskörpers LXVII 58—64.

**Schanz, F. und Stockhausen, K.** Wie schützen wir unsere Augen vor der Einwirkung der ultravioletten Strahlen unserer künstlichen Lichtquellen LXIX 49—74.

— Über die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Auge LXIX 452—462.

**Schieck, F.** Über die Hyalin- und Amyloiderkrankung der Conjunctiva. Ein Beitrag zur Lehre von dem lokalen Hyalin und Amyloid nebst Bemerkungen über die Beziehungen des lokalen Amyloids zur allgemeinen Amyloidose LXVII 119—148.

**Schirmer, O.** Nachtrag zu meiner Theorie der Tränenabfuhr LXIII 200—203.

**Schmandigel, O.** Die Durchlochung der Pupillenschwarten LXX 123 bis 129.

**Schreiber, L.** Neue Beobachtungen über Pupillenreflexe nach Sehnervendurchschneidung beim Kaninchen LXI 570—575.

— Über Degeneration der Netzhaut und des Sehnerven. Nach experimentellen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen LXIV 237—338.

— Über die atrophische Sehnervendekavation LXVIII 381—391.

**Seefelder, R.** Klinische und anatomische Untersuchungen zur Pathologie und Therapie des Hydrophthalmus congenitus, I. Teil. Klinisches LXIII 205—280.

— II. Teil. Anatomisches LXIII 481 bis 556.

— Beiträge zur Lehre von den fötalen Augenentzündungen LXIV 224 bis 236.

— Zur Kenntnis der pathologischen Anatomie und Pathogenese der Cyklopie LXVIII 242—274.

— Pathologisch-anatomische Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Colobome des Auges LXVIII 275—353.

**Seefelder, R.** Über Anomalien im Bereiche des Sehnerven und der Netzhaut normaler fötaler Augen, ein Beitrag zur Gliomfrage LXIX 463—478.

— Die Aniridie als eine Entwicklungshemmung der Retina LXX 65—87.

— Untersuchungen über die Entwicklung der Netzhautgefäße des Menschen LXX 448—464.

— und **Wolfrum.** Zur Entwicklung der vorderen Kammer und des Kammerwinkels beim Menschen, nebst Bemerkungen über ihre Entstehung bei Tieren LXIII 430 bis 451.

— Über eine eigenartige Linsenanomalie (Lentiglobus anterior) bei einem viermonatigen menschlichen Fötus LXV 320—325.

**Seydewitz, O. H.** Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen der Tränendrüse nach Durchschneidung der Ausführungsgänge LXII 78—84.

**Shiba, S.** Experimentelle Untersuchungen über die Embolie der Netzhaut und der Aderhaut LXIII 393—417.

**Speciale-Cirincione.** Über die Entwicklung der Tränendrüse beim Menschen LXIX 193—230.

**Stargardt, K.** Über Epithelzellveränderungen beim Trachom und andern Conjunctivalerkrankungen LXIX 525—542.

— Über katadioptrische Nebenbilder im Auge LXX 563—572.

**Stern, R.** Über Sehporpurfixation LXI 561—563.

**Stilling, J.** Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. Wolfrum: „Zur Frage nach der Existenz des Glaskörperkanals“ LXIX 192.

**Stock, W.** Tuberkulose als Ätiologie der chronischen Entzündungen des Auges und seiner Adnexe, besonders der chronischen Uveitis LXVI 1 bis 103.

**Stockhausen, K., s. Schanz, F.**

**Stölting.** Ist bei Hydrophthalmus die Iridektomie oder die Sklerotomie als Normaloperation anzusehen? LXVII 171—184.

**Straub, M.** Über die Ätiologie der Brechungsanomalien des Auges und den Ursprung der Emmetropie LXX 130—199.

**v. Szili, A.** Über die hinteren Grenzschichten der Iris LXIV 141—156.

- v. Szili, A.** Kritik der Georg Levinsohnschen Bemerkungen zu meiner Arbeit: Über die hinteren Grenzschichten der Iris LXV 172—175.

### T.

- Takayasu, M.** Zur Kasuistik der Retinitis punctata albescentis LXIII 281 bis 286.

- Tertsch, R.** Ein Beitrag zur Entwicklung der vorderen Polarkatarakt LXVI 436—454.

- Thorner, W.** Untersuchungen über die Entstehung der Stauungspapille LXIX 391—451.

- Tschirkowsky, W.** Beiträge zur Frage über die Wirkung von Toxinen auf die Conjunctiva des Auges LXVIII 77—113.

- Untersuchungen über den Einfluß von Toxinen auf die tierische Conjunctiva bei Einbringung auf endogenem Wege LXVIII 155—174.

- Türk, S.** Untersuchungen über eine Strömung in der vorderen Augenkammer LXIV 481—501.

### U.

- Urmetzer, J.** Über Epitheleinwanderung und Entwicklung von Epithelcysten im Auge LXVIII 494 bis 533.

### V.

- Voege.** Bemerkungen zu dem Aufsatz der Herren D. Dr. Schanz und Stockhausen: Über die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Auge LXX 403—405.

### W.

- Wagenmann, A.** Weitere Mitteilungen über Skleritis posterior LXIV 380 bis 390.

- Wehrli, E.** Über die anatomisch-histologische Grundlage der sog. Rindenblindheit und über die Lokalisation der corticalen Sehsphären, der Macula lutea und die Projektion der Retina auf die Rinde des Occipitalhappens LXII 286—375.

- Weinhold, M.** Zur Theorie der skioskopischen Schattendrehung bei Astigmatismus LXII 275—285.

- Über die Bedeutung einiger psychischer Momente für die Bilderbetrachtung bei Bewegung LXIII 460—467.

- Nochmals: Zur Theorie der skioskopischen Schattendrehung bei Astigmatismus LXV 150—154.

- Weiß, R.** Bemerkung zu Schirmers Aufsatz: „Nachtrag zu meiner Theorie der Tränenabfuhr“ LXV 361.

- Wie ist die vermehrte Purpurfärbung in der Sehleiste der Kaninchennethzhaut zu erklären? LXVI 263—269.

- Wintersteiner, H.** Über Irissarkom und Irisendotheliom LXIX 75—105.

- Wölflin, E.** Der Einfluß des Lebensalters auf den Lichtsinn bei dunkeladaptiertem Auge LXI 524—560.

- Über die Beeinflussung der Dunkeladaptation durch künstliche Mittel LXV 302—319.

- Wolfrum, M.** Zur Entwicklung und normalen Struktur des Glaskörpers LXV 220—266.

- Beiträge zur Anatomie und Histologie der Aderhaut beim Menschen und bei den höheren Wirbeltieren LXVII 307—359.

- Zur Frage nach der Existenz des Glaskörperkanals LXVII 370—376.

- Über Ursprung und Ansatz der Zonulafasern im menschlichen Auge LXIX 145—171.

- Zur Bemerkung Prof. Stillings betreffs: „Zur Frage nach der Existenz des Glaskörperkanals“ LXX 236 bis 237.

- s. Seefelder, R.

### Z.

- Zade, M.** Beitrag zur Kenntnis der Keratomycosis aspergillina LXV 417—427.

- Zimmermann, W.** Über einen Fall von atypischem Iriscolobom LXVI 270—274.

- Zirm, E.** Eine erfolgreiche totale Keratoplastik LXIV 580—593.











